

A MAGYAROKAT KIIRTJÁK UGYE?


T u d t á l r ó l a ?

KALISÓVAL (KCl) MÉRGEZETT sókat: REDI-só, VIVEGA, Nátriumszegény-só, árusítanak. Már 2-4 grammos kálisó adag is mindenkinél vese- és vér-mérgező. Nagyobb adagja szívmegállást idézhet elő. Kis adagjai - hosszabb távon - szívtágulást, fekélyt, rákot, allergiát, szaporodásképtelenséget okoznak.

Az **AGROANALIZIS TUDOMÁNYOS TARSASAG** Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja gk (1036 Bp., Lajos u. 115., 36-202181408) az orvosok részére felajánlja az állami kálium-hatásmérési dokumentációk megtekintésének lehetőségét, mert e mérések adatait az **ÁFTSZ** meghamisította. A gyógyszerárak, élelmiszerboltok és a bioboltok a a tengervíz kálium tartalmát sokszorososan meghaladó kálium tartalmú, 20-98%-ban kálisót tartalmazó természetellenes "intenzív ízű" sókat árusítanak. Már szinte csak a tengeri kóser-só maradt káliummentes.

Egy felnőttnek 24 óra alatt összesen csak 0,8 gramm a napi tényleges káliumigénye. De ennyi is vesemérgező, ha egyszerre (egy adagban) jut be. Lásd: "Ásványtani Kis-sótár" a **KEPES UJSAG** XXIV. fvf. 21. számában, 1993. máj. 22. A 0,8 gramm/24óra a **NEMZETKÖZI NORMA** A "Recommended Dietary Allowances 10th Edition" alapján! Hogy ennyire mérgező a túladagolt kálium, bárki önmagán is kikísérletezheti. Igyon meg fél liter tiszta vizet, majd 0,9 gramm és 1,8 gramm feloldott káliummal szennyezett fél literket is. Ennyi gramm kálium is, több órán át, felére csökkenti a vizeletkiválasztást! Láthatja, ha ábrázolja az ivása utáni órákban produkált vizeletmennyiségeit. Mézzük csak a klinikán egészséges embereken mért adatokat (tiz egészséges felnőttből tiznél!), az alábbi adatokat mérték :

0,5 liter víz ivás hatása káliummal és kálium nélkül a vese működésre a kiürülő vizelet mennyisége alapján:



0,5 liter vízben oldott 1,8 gramm kálium megítatása után a vérben, a vérsérumban mért káliumszint:



Az 1983/84-es, "ad.4111/84. OÉTI" iktatási számú klinikai mérések jegyzőkönyvi mérési adatai diagrammjai, a 0,88 és az 1,76 grammos kálium adagok tényleges hatásai (2 grammnyi "REDI-só" kálium tartalma volt 0,88 gramm). Fenti klinikai mérési adatokat MTA méréstani szakértői felüellenőrizték, publikálták (Napi Magyarország, 1998. V. 26. "Elsőzhatják az életünket").

Sejtjeiben mérgezik Magyarországot a káliummal, amit a fertőző és mérgező vezetőki-víz itatással kombinálnak. A "közszolgálati tv"-ben is szervezik a kálium evését. pl. a kórboncnok, dr. Kellermayer Miklós, "tízszerezre növeini javasolta a kálium-fogyasztást" (TV,1997.I.17. Háttér tudomány), holott az már 2-8 gramm/fő (átlagban: 3,5 gramm/fő), és ennek a tízszerezése: 20-80 gramm/fő. Dr. Surján László ezt szavaztatta meg a Parlamenttel a 8253. sz., 1992. dec. 8-i alapvetően hamis válaszával!

Budapest, 2000. január 10.
Ny í l t l e v é l !
(KCl.20W) Copy: INTERNET

Teffalussy András
/ elnök /