

Dr. Kellermayer Miklós és orvos társai szembehazudják az 1 vagy 2 grammnál több kálium 1 órán belül bejuttatásával kálium túladagolás vese- és vérmérgező hatását bizonyító hivatalos állami klinikai méréseket, és a tényleges káliumszükséglet tízszeresét hazudják egészségesnek

## A MAGYAROKAT KIIRTJÁK UGYE?


T u d t á l r ó l a ?

**KALISÓVAL (KCl) MÉRGEZETT sókat: REDI-só, VIVKA, Nátriumszegény-só, árusítanak. Már 2-4 grammos kálisó adag is mindenkinél vese- és vér-mérgező. Nagyobb adagja szív megállást idézhet elő. Kis adagjai - hosszabb távon - szívtagulást, fekélyt, rákot, allergiát, szaporodásképtelenséget okoznak.**

Az **AGROANALIZIS TUDOMÁNYOS TARSASAG** Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja gmk (1036 Bp., Lajos u. 115., 36-202181408) az orvosok részére felajánlja az állami kálium-hatásmérési dokumentációk megtekintésének lehetőségét, mert e mérések adatait az **ÁNTSZ** meghamisította. A gyógyszertárak, élelmiszerboltok és a bioboltok a a tengervíz kálium tartalmát sokszorosan meghaladó kálium tartalmú, 20-98%-ban kálisót tartalmazó természetellenes "intenzív ízű" sókat árusítanak. Már szinte csak a tengeri kóser-só maradt káliummentes.


Egy felnőttnek 24 óra alatt összesen csak 0,8 gramm a napi tényleges káliumigénye. De ennyi is vesemérgező, ha egyszerre ( egy adagban ) jut be. Lásd: "Ásványtani Kis-sótár" a **KÉPES ÚJSÁG** XXXIV. évf. 21. számában, 1993. máj. 22. A 0,8 gramm/24óra a **MÉRZETKOZI NORMA** A "Recommended Dietary Allowances 10th Edition" alapján! Hogy ennyire mérgező a túladagolt kálium, bárki önmagán is kikísérletezheti. Igyon meg fél liter tiszta vizet, majd 0,9 gramm és 1,8 gramm feloldott káliummal szennyezett fél litereket is. Ennyi gramm kálium is, több órán át, felére csökkenti a vizeletkiválasztást! Láthatja, ha ábrázolja az ivása utáni órákban produkált vizeletmennyiségeit. Hézzük csak a klinikán egészséges embereken mért adatokat ( tíz egészséges felnőttből tíznél! ), az alábbi adatokat mérték :

0,5 liter víz ivás hatása káliummal és kálium nélkül a vese működésre a kiürülő vizelet mennyisége alapján:  
liter



A méréstelenítést akadályozza az (oldott) kálium mérgező hatása!

0,5 liter vízben oldott 1,8 gramm kálium megittatása után a vérben, a vérsérumban mért káliumszint:



A vérben megnőtt káliumszintnél a sejt-reprodukción is kárt szenved!

Az 1983/84-as, "ad-4111/84. OBTI" iktatási számú klinikai mérések jegyzőkönyvi mérési adatai diagramjai, a 0,88 és az 1,76 grammos kálium adagok tényleges hatásai (2 grammnyi "REDI-só" kálium tartalma volt 0,88 gramm). Fenti klinikai mérési adatokat MTA méréstani szakértői felüellenőrizték, publikálták (Napi Magyarország, 1998. V. 26. "Elszohatják az életünket").

Sejtjeiben mérgezik Magyarországot a káliummal, amit a fertőző és mérgező vezetéki-víz itatással kombinálnak. A "közszolgálati tv"-ben is szervezik a kálium evését: pl. a körbencnek, dr. Kellermayer Miklós, "tízszerezre növelni javasolta a kálium-fogyasztást" (TV, 1997. I. 17. Háttértudomány), holott az már 2-8 gramm/fő (átlagban: 3,5 gramm/fő), és ennek a tízszerese: 20-80 gramm/fő. Dr. Surján László ezt szavaztatta meg a Parlamenttel a 8253. sz., 1992. dec. 8-i alapvetően hamis válaszával!

Budapest, 2000. január 10.  
Ny í l t l e v é l !  
(KCl.20W) Copy: INTERNET

Tejfalussy András  
/ elnök /

Code: KellermayerekCsalasa970117