

Fajirtás akadályozásaként, Orbán Viktor miniszterelnök valamint Dr. Kincses Gyula volt egészségügyi államtitkár és az ORFK részére is, a Magyar Orvosi Kamara (mindenkori) vezetőit érintő fő kérdések:

1. „Magyarországnak tisztességes jó egészségügyben érdekelt Orvosi Kamarára lenne szüksége” Dr. Kincses Gyula volt egészségügyi államtitkár szerint, aki (állítólag) a Magyar Orvosi Kamara új elnöke szeretne lenni?
2. Ha ő lesz az elnök, akkor is majd tovább titkolják (a Kamara és a hazai orvosok többsége), hogy 1950-ben Nobel díjat kapott három mellékvesekéreg kutató (lásd: Medicina, Technika a biológiában 8.), akik a patkányoknál és az embereknél, konkrét biológiai hatás kalibráló mérésekkel bebizonyították a csökkentett konyhasó- és vagy növelt kálium-dózis fajirtó hatását? Például azt is, hogy a csökkentett konyhasó-dózis vérbesűrítő hatása kórosra fokozza a vérnyomást, rontja a vese- és szív-, és ideg- és izom működést, bőrbetegségeket, rákbetegséget is előidéz, és a „pszeudohermafroditizmus” is okozó, nemzedékeken át halmozódó, genitália torzító, mérgező hatása végzetesen tönkreteszi az állatok és emberek nemzőképességét!
3. Ha ő lesz az elnök, tovább titkolják, hogy a konyhasó dózis csökkentés magas vérnyomást csökkentő hatását bebeszélés a patkányokon végzett mérés eredményei emberre hamis átszámolására és a konyhasó megvonás hatásai hamis statisztikai kiértékeléseire van alapozva? A Népszabadság is megírta! (2002.11.15.)
4. Miért reklámozhatták a Családorvosi Havilapban (99' március, VII. évf. 3 szám) a konyhasó helyett (patkányméreg) kálisót tartalmazó „VIVEGA”-t étkezési, gyógyhatású sóként? Miért árusíthatja a Béres cég is, miután a céget alapító Dr. Béres József, „Első kézből a Béres cseppekről” címmel azt publikálta, hogy emlőrákot okozott a kísérleti egereinél, amikor a káliumot túladagoló étkezésre kényszerítette őket!?
5. Miért engedi reklámozni a Dr. Éger István elnök által vezetett Magyar Orvosi Kamara (MOK), a népirtó „Nemzeti Stop Só programot”? Miért titkolja az életrovidítő és ivartalanító hatását bizonyító biológiai hatáskalibráló hazai- és nemzetközi mérési eredményeket, melyeket parlamenti szakértőként kinyomoztunk? Amelyeket az Országgyűlés Szociális- és egészségügyi Bizottsága néhai titkára, Dr. Kovács Pál orvos, aki később egészségügyi miniszter lett, interpellációként előterjesztett az Országgyűlésben, s amiket az akkori miniszterek (a minket antiszemita 8253 válaszukkal, 1992. dec. 8-án) szemérmetlenül szembehazudtak!
6. Nem mindegyik orvos és gyógyszerész tanulta, hogy a Ringer infúziós oldat dózisa a vérszérum szerinti optimális arányban pótolják a vizet, konyhasót és káliumot? Pl. napi 3 liter desztillált víz mellé 27 gramm az optimális konyhasó dózis és 0,36 gramm az optimális kálium dózis, amiket a Ringer oldattal a vérbe juttatnak. Tehát étkezéssel is ennyit lenne optimális vérbe juttatni, lásd: www.tejfalussy.com, 10. videó! Mégis, akármennyi vízhez, napi max. 5 gramm konyhasót, és 4,7-től 70 grammnyi káliumot engedélyeznek!!
7. Tovább fogja túrni a kamarai vezetés, hogy sokkal kevesebb konyhasó és sokkal több kálium legyen az ételünkben, mint a Ringer infúziós oldat dózisa szerinti? Miért nem hajlandók eljuttatni az orvosokhoz az étkezési nátriumdózis káliumra cseréje kártékonyágát bizonyító klinikai hatás mérési és tankönyvi adatokat?
8. Továbbra is titkolhatják, hogy a korábbi III. osztályos gimnáziumi kémia könyv szerint, de Prof. Dr. Papp Lajos akadémiai nagydoktor szívsebész szerint is, infúzióval is és étkezéssel is, a gyógyító Ringer-infúziós oldatnál alkalmazott víz-, konyhasó- és kálium dózisok vérbe juttatása a legegészségesebb, ez az optimális?
9. Továbbra is engedhetik a patkányméreg kálisót étkezési sóként kosher tanúsítvánnyal reklámozni (lásd az internetes BONSALT reklámot!), hogy a magyar cionista izraelitákat irtással is biztosítsák az olcsó „kiürült” ingatlanokat az Izraelből és Ukrajnából 2010-től vízum nélkül is itt tartózkodni engedett idegen izraelitáknak?
10. Meddig bünpártolhatja a Magyar Orvosi Kamara a hamis „Nemzeti Stop Só program” és „Chips-adó” megtűrésével a Ringer-infúzió szerinti optimálisnál ötször kevesebb konyhasó- és tízszeresnél több kálium mindennapi fogyasztását, miután 1 és 2 gramm kálium éhgyomorra elfogyasztása is mérgező volt a klinikai ellenőrző méréseknél?! A hatáskalibráló-mérési stb. bizonyítékokat lásd a www.tejfalussy.com honlapomon!

Magyarország, 2019. szeptember 27. Tejfalussy András (A Kormány helyett kárelhárító méréstani szakértő)



Kód: fajirtoorvosikamara-190927. Csatolmány: ENSZ főtitkárhoz benyújtott petíció (UN-WHO-190331-2)