

Tejfalussy András okl. mérnök (személyi szám: 1-420415-0215), Ptk. 484-487. § szerinti közérdekű bejelentésekkel és közérdekű javaslatokkal kárelhárító méréstani szakértő, AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk, Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos u. 115., www.tejfalussy.com, mobil: +36-202181408, e-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

MEHNAM-info / Tanítás (orvosképzés) / Gyerekeknek Kód: josozasi-program

JÓSÓZÁSI PROGRAM

Kedves Hölgyek, Urak és Gyerekek!

Ha egy közösség életben akar maradni és gyerekeket is szeretne, célszerű, ha mindegyik tagja tanulmányozza, megérti és alkalmazza a **mellékletekben** összefoglalt, az étkezési nátrium- kálium-, klorid- és vízdózisok élettani optimumára vonatkozó alapvető irányelveket. Ezek helyességét természeti tények és tudományos hatás kalibráló mérések minden oldalról igazolják. A bizonyítékok a www.tejfalussy.com és a www.tisztaso.hu honlapokon láthatók. (Célszerű, ha a bizonyítékokat mindenki átmásolja a számítógépére és DVD-kre, mielőtt a bűnöző közösséget védő „Médiafelügyelő” eltüntethetné a népirtás dokumentumait az internetről!)

1950-ben Nobel-díjat kapott tudományos kutatók nátrium és kálium dózis hatás kalibráló mérései is tanúsítják, hogy néhány nemzedék alatt ivartalanítja az állatokat és embereket is a túl kevés nátriumot és túl sok káliumot bejuttató étkezés, vagyis a hazai kormányok által „Stop Só, Nemzeti Sócsökkentési Program”-ként erőltetett sópótlás változtatás. Ugyanis a testnevekben és azoknak megfelelően a Ringer fiziológiás infúzióban és étkezésnél is az **Na/K=30** dózis arány az optimális élettanilag, nem pedig a Kormány sócsökkentési programja által előírt **Na/K=0,43** dózisarány, ami a testnevek egészséges természetes Na/K arányait mérgezőre torzítja. A Stop Só program hirdető orvosi- és természetgyógyászati „közszolgálati maffia média” tudatosan szervezi, hogy a magyarok „önmagukat irtsák” a Stop Só kormányprogrammal.

A ma megkapott "ELOKOZOSSEGEK.HU" <hirlevel@elokozossegek.hu> 2013. december 4-i hírlevel alapján is javasolom mindenkinek, hogy védekezzen a „Stop Só, Nemzeti Sócsökkentési Programmal” folytatott népirtás ellen. A védekezés módja a Ringer fiziológiás infúziós oldat étkezésnél is optimális víz/NaCl=110, Na/K=30 dózis arányai szerinti víz- és sópótlás, a mellékelt **EmailKonyv1-VEOP**-ban leírt „**Jósózási Program**”. Mindenkit kérek, hogy családi, baráti, ismeretségi körében minden lehetséges úton-módon terjessze a népirtás bizonyítékait, s hirdesse a Stop Só kormányprogram elleni védekezés feltétlen szükségességét és a „Jósózási Programot” is, az egyéni védekezéshez!

Verőce, 2013. december 3.


Tejfalussy András

MELLÉKLET-1.

Amit az étkezési sóról tudni kell



Mindenki számára nagyon fontos, hogy étkezési során tiszta NaCl konyhasót egyen. A kereskedelemben kapható sók egy része ismeretlen mennyiségű kálsót tartalmaz, pedig ez nagyon veszélyes. Az **MSZ-01-10007-82** (Magyar Szabvány) szerint minimum 97% NaCl konyhasót kell tartalmaznia mindegyik étkezésre szánt sónak, de KCl kálsó nem szerepel a fennmaradó maximum 3%-nyi egyéb komponensek között. Bővebb leírást a **www.tisztaso.hu** oldalon a dokumentumoknál találasz.



Ha tiszta, kétszeres minőségellenőrzési vizsgálatot felügyelt, minimum 99,5% NaCl tartalmú konyhasóra (nátrium-kloridra) van szükséged, akkor a **www.tisztaso.hu** weboldalon keresztül beszerezheted. Az 1kg-os NaCl konyhasót a patikák által használt gyógyszerkönyvi tisztaságú konyhasó 25kg-os zsákjaiból csomagoltuk át.

Megkérek mindenkit, hogy ezen írást továbbítsa minden ismerősének, és kérje meg őket is, hogy továbbítsák az alábbiak miatt:

EGÉSZSÉGVÉDELEM

Tejfalussy András mérési szakértő és Weixl Várhegyi László okl. természetgyógyász, ny. rendőrezredes állásfoglalása a **www.aquanet1.net76.net** honlapon dokumentált tudományos mérések és tantételek, és Prof. Dr. Papp Lajos ny. egyetemi tanár akadémiai doktor szakvéleménye alapján:

Mitől lett ennyire sok magyar ember beteg, rövid életű, és meddő? Miért csökken évi több tízezerrel a létszámunk? Három titkos főfelelősre mutattak rá az ok-okozat kalibráló élettani mérések:

1.: Túlterheli az immunrendszert, ha az ivóvíz mérgező vegyszereket és/vagy klórozásnak ellenálló vírusokat tartalmaz.

2.: Keringésrontó, ha a fiziológiás mérték alá csökkentik a konyhasó pótlást.

3.: Sejtműködés-gátló, keringésrontó és ivartalanító hatású, ha a fiziológiás szükségletnél sokkal több káliumot esznek, isznak.

Megbízható védekezés:

1.: Ivóvíz desztillálás,

2.: Gyógyszerkönyvi tisztaságú NaCl konyhasóval fiziológiás mértékben sózás,

3.: Kálium túladagolás mellőzés.

Ezen anyagok élettanilag optimális, fiziológiás napi dózisaira és beviteli sebességeire étkezésnél is irányadóak a magzatot tápláló vérszérum és a magzatvíz, és a csecsemők és felnőttek gyógyítására is alkalmazott fiziológiás infúziós Ringer oldat $H_2O/NaCl=110$ és $Na/K=30$ optimális arányai:

„NYILATKOZAT

A Ringer oldat a testnedvekhez hasonló ionösszetételű folyadék. A Ringer oldat (0,9% NaCl, 0,03% KCl, 0,025% CaCl₂, 0,02% NaHCO₃, 99% desztillált víz) szerinti nátrium, kálium, klór és víz pótlási arány megfelelő kóros veszteségek esetén, de ugyancsak optimális a napi étkezések során is.

Budapest 2010. január 6.

Dr. Papp Lajos ny. egyetemi tanár, akadémiai doktor s.k.”

MELLÉKLET-2.

2013 NOV 1 8



FIGYELEM!

Képtelenség túl sósan enni; mert olyankor ehetetlen az étel. Ha az étel csak kicsit van túlsózva, szomjasak leszünk. A víz segít eltávolítani a szervezetből a már feleslegessé vált anyagokat, túlsózás esetén a konyhasót is. Ha folyamatosan kevés sót eszünk, ez viszonylag lassan, de biztosan károsítja a szervezetünket, és az is, hogy ilyenkor emiatt kevesebb vizet iszunk. Iszik Ön legalább napi 2-3 liter TISZTA VÍZET? Mert ha nem, jobb lenne több konyhasót (NaCl) fogyasztania! Ne féljen a konyhasótól, sózzon bátran! Segít megszabadulni a betegségektől, véd a meddőséggel szemben, meghosszabbítja az életét.



Csak kétféle étkezési só létezik; a biztonságos és a többi. A gyógyszerkönyvi tisztaságú NaCl patikai konyhasó a lehető legbiztonságosabb étkezési só. A napi NaCl biztonságos konyhasó szükségletünk mai (2013-as) áron számolva kb. 10 Forint. Napi 10 Forintért nem érdemes kockáztatni egészségünket, szaporodóképességünket, nemzetünket!

A konyhasó tisztaságán kívül nagyon fontos a napi beviteli mennyisége is. A „STOP SÓ Nemzeti Sócsökkentő Program”-ban ajánlott napi 5 gramm NaCl napi mennyiség nem elegendő! Ha egy magatehetetlen beteg a kórházba kerül, napi kb. 2 liter sós infúziót (Ringer oldat) kap, 1 liter Ringer oldatban 9 gramm NaCl van, így napi 2 literrel 18 gramm NaCl jut be a szervezetünkbe. Normál körülmények között ez ajánlatos, élettanilag optimális napi mennyiség (kb. egy csapott evőkanál) egy egészséges felnőtt számára.



www.tisztaso.hu

70/235-1899

MELLÉKLET-3.

EmailKonyv1-VEOP[1].pdf

<http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/1.emailkonyv:helyesen%20sozas%20es%20tisztaz%20ivoviz.pdf>