



Tabuk, Titkok, Tények 2016.10.25. hatoscsatorna

hatoscsatorna műsorai

Feliratkozás 3 265

4 564 meglekintés

Hozzáadás Megosztás Továbbiak

Megosztás Beágyazás E-mail



https://youtu.be/3ttNGe9WkOc

Kezdőpont: 0:12

Következő Automatikusan lejátszás



Tabuk, Titkok, Tények
2016.12.06. hatoscsatorna
hatoscsatorna műsorai
1 938 meglekintés



karácsonyi üdvözetek | a
jelked szennyese | a három
király [ÖM #149]
Puzsér Róbert
Neked ajánlott ÚJ



Élet az élet után! 2016.12.13.
hatoscsatorna
hatoscsatorna műsorai
3 407 meglekintés



Tabuk, Titkok, Tények
2016.11.22. hatoscsatorna
hatoscsatorna műsorai
4 649 meglekintés



Tabuk, Titkok, Tények
2016.11.08. hatoscsatorna
hatoscsatorna műsorai
6 109 meglekintés



Tabuk, Titkok, Tények
2016.06.07. hatoscsatorna
hatoscsatorna műsorai
15 304 meglekintés

Hozzászólás:

NYÍLT LEVÉL, Egely Györgyhöz és az egészségüggyel foglalkozó Hatoscsatorna tv-s műsorvezető társaihoz és a Riportalanyaikhoz

Véleményem szerint valamennyi egészséggel, betegséggel foglalkozó műsorokban első helyen és mindig kellene foglalkozni az egészség alapfeltételét jelentő víz, konyhasó és kálium dózisaránnyal. Ma, Nemzeti Stop Só Program, Menzareform elnevezés alatt, a korábbi normális ötödére csökkentették a konyhasópótlást és legalább tízszeresre növelték a káliumpótlást. Az élettanilag optimális dózisarány étkezés esetében is a Ringer infúziós oldat dózisa szerinti. A Ringer infúziós oldatnak a testnedvekben, a vérelektrolitban lévő arányok szerinti, élettanilag optimális a dózisaránya. Például 3 liter desztillált vízhez 27 gramm konyhasó, de csak 0,36 gramm káliumot juttat be a vérbe. Nobel-díjat kaptak 1950-ben, akik dózis hatás mérésekkel, patkányoknál és embereknél is bebizonyították a csökkentett konyhasópótlás és túladagolt kálium mindenkinél betegítő, vérnyomásnövelő, ivartalanító, vagyis fajirtó hatását. Orvosi tankönyvi tantétel is, hogy az 1 óra alatt a vérbe juttatott 2 grammnál több (24 óra alatt 11 grammnál több) kálium életveszélyesen rontja a szív működést. Az OÉTI kísérletei során azt mérték, hogy miután 2 grammnyi kálium oldatát megitta, mindenkinek felére csökkent a vizeletkiválasztása és EKG torzító lett a vérszérum kálium tartalma! Jelenleg mindenkinek, gyerekeknek és felnőtteknek is, a „napi legfeljebb 5 gramm konyhasó és legalább 4,7 gramm kálium étkezési pótlását írják elő. Akármilyen ütemmel, akármennyi víz mellé. Ha a témával nem azért foglalkoztok túl ritkán, mert a figyelem elterelés a feladatokat, hívj fel, és beszéljünk meg, mivel tudnátok ti is hatékonyan akadályozni a kálisóval kevert, vagyis életveszélyes Redi só, Bonsalt, Bonosal, Vivega, Nyirtassi, Sara Lee, Bad Ichler, Parajdi, Himalája stb. elnevezésű életveszélyes sók „étkezési sóként” forgalmazását, fogyasztását. Volt már a témáról műsorok, de nem a gyógyszerkönyvi tisztaságú kálisómentes só, hanem a véletlenszerű káliumtartalmú, vagyis életveszélyes Himalája és Parajdi só ajánlottak, és azt, hogy mindenki saját magán kísérletezze ki a számára optimális nátrium és kálium pótlást, ami felelősség áthárítás, és jogsértő emberkísérletre felbuztatás. A hivatkozott hatás mérési bizonyítékokat lásd a honlapomon.

Tisztelettel: Tejfalussy András
oknyomozó kutató feltaláló
www.tejfalussy.com
+3620 2181408