


TERRORIZMUS ELHÁRÍTÁS

Büntetőbírósi vizsgálatot követelünk az alábbi „kérdzd meg orvosod vagy gyógyszerészed” ügyben:

Országos körlevélben előírta valamennyi hazai gyógyszerésznek az országos főgyógyszerész, hogy az őket kérdezőknek mondják azt, hogy (felnőtt részére, átlagosan) a napi 2 gramm nátriumot pótlás (2 gramm nátrium 5 gramm nátrium-kloridban van) és a napi 4,7 gramm káliumot pótlás szükséges, ennyi optimális élettanilag. Tudtommal egy gyógyszerész sem lépett fel ellene, pedig mindegyik azt tanulta, hogy a Ringer infúziós oldat szerinti nátrium- és kálium dózisarányok optimálisak a szív számára:



A Ringer-oldat, megfelel:

0,9% NaCl,
0,03% KCl,
0,025% CaCl₂ és
0,02% NaHCO₃-ből áll.


**melynek összetétele a szív igényeinek legjobban
AZ INFÚZÓS RINGER-OLDAT ALKOTÓELEMEI**

Dr. Kiszely György és dr. Hársing László: Gyógyszerész továbbképzés Biológiai és élettan alapismeretek, 90. oldal.
Iratkód: Ringer-oldat Medicina, 1958.

NYILATKOZAT

A Ringer oldat a testnedvekhez hasonló ionösszetételű folyadék. A Ringer oldat (0,9 % NaCl, 0,03% KCl, 0,025 % CaCl₂, 0,02 % NaHCO₃, 99 % desztillált víz) szerinti nátrium, kálium, klór és víz pótlási arány megfelelő kóros veszteségek esetén, de ugyancsak optimális a napi étkezések során is.

Budapest 2010. január 6.


Dr. Papp Lajos
ny.egyetemi tanár
akadémiai doktor

Miután 1950-ben Nobel-díjas kutatók mérésekkel bebizonyították, s ezt a MEDICINA orvosi könyvkiadó publikálta, lásd (Ügykód: nepirtonatriumhianyescaliumtuladagolas140606) melléklet, hogy életrövidítő és ivartalanító is, vagyis népirtó hatásúak a Stop Só program szerinti előírások, az azt elrendelők és nem feljelentők is tudatos tömeggyilkosok, pl. dr. Szócska Miklós államtitkár is.

Melléklet és függelékeként másolat a Nobel-díjas kutatók méréseit ismertető tudományos könyvből:
<http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/doksik/Nepirto%20natriumhiany%20es%20kaliumtuladagolas-TB8.MB.pdf>

Népirtó nátriumhiány és káliumtúladagolás

(Megbízás nélküli ügyvitel keretében közérdekű kárelhárítás, lásd Ptk.)

NOBEL-DÍJAS MELLÉKVESEKÉREG KUTATÓK ÉLETTANI KÍSÉRLETEI IS BIZONYÍTJÁK, HOGY A HAMIS ELMÉLETEKRE ÉS AZOKAT „IGAZOLÓ” HAMIS STATISZTIKÁKRA ALAPOZÓ „STOP SÓ NEMZETI CSÓCSÖKKENTÉSI PROGRAMMAL” TUDATOSAN SOKSZOROZZÁK A RÁK- ÉS EGYÉB ÉLETRÖVIDÍTŐ BETEGSÉGEK GYAKORISÁGÁT.

A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában, „A biológia aktuális problémái” főcím alatt található „A mellékvesekéreg biológiája” c. fejezet. Aki írta, az akadémiai nivódíjas Dr. Szabó Dezső azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek alapján **Kendall, Reichstein és Hench 1950-ben Nobel-díjban részesültek** „a mellékvesekéreg-hormonok és szerkezetük és biológiai hatásuk” felfedezéséért. Az összefoglalás jellegű leírás emellett további **61 tudományos publikáció** mérési eredményeire is hivatkozik (zárójelben jelzem, hogy a könyvből idézett megállapítások a könyv mely oldalain található).

EZEK A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK EGYBEHANGZÓAN BIZONYÍTJÁK AZT, HOGY A NÁTRIUMHIÁNYOS ÉS KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT EMBEREK ÉS PATKÁNYOK MELLÉKVESEKÉREG HORMONTERMELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A TUDOMÁNYOS KUTATÓK VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEKSEL RENDELKEZNEK (134), AMELYEK SZERINT A NÁTRIUMHIÁNYOS VAGY KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT ÁLLATOKBAN (PATKÁNYOKBAN) ÉS EMBEREKBN IS MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK BE, MIKÖZBEN A SZERVEZET ELETROLIT- HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)

A későbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrövidítő, ivartalanító stb. hatások, például konkrétan a következők:

- 1./ A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik. (140)
- 2./ A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás alakul ki. (167)
- 3./ **A különböző stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)**
- 4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsősorban a vesesejteknél, de a verejtéksejteknél és az emésztőrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez hosszabb ideig tart, törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet:
- 5./ Idővel nátrium-hiány jön létre. (168)
- 6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)
- 7./ Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168)
- 8./ Romlik a keringés. (168)
- 9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szűrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)
- 10./ Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168)
- 11./ A bőr és a nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)
- 12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)
- 13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)
- 14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)

A hiányos nátrium pótlás és vagy kálium túladagolás miatti egészségromlás leggyakoribb tünetei:

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)

20./ A vér besűrűsödése miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést, renintermelő vesedaganatok jönnek létre. (169)

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait, a nemi jelleg eltorzulást („pszeudohermafroditizmust”) is okoz, emiatt lett, lesz egyre több a homoszekszuális :

21./ Leánymagzatok nemi szerveinek a fejlődési zavarait, pl. szeméremajkak összenövését, klitorisz-megnagyobbodást. (169-170)

22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idő előtti mentstruációt. (170)

23./ Felnőtt nőknél: klitorisz-megnagyobbodás, test- és arcszőrösödés, kopaszodás, érdes hang, a menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)

24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erőteljes izomzat kifejlődést, a testnövekedés gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszőrzet idő előtti megjelenését, korai szakáll-növekedést, hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)

25./ Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermeknél és férfiaknál emlő-megnagyobbodást okoz. (170)

26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztatarak) növekedését serkenti. (170)

AZ ÜGGYEL FOGLALKOZÓ ÜGYÉSZEK ÉS (HAMIS) SZAKÉRTŐIK KÖZEL 20 ÉVE FOLYAMATOSAN „NEM BŰNCSELEKMÉNYNEK” MINŐSÍTIK EZT, A KONYHASÓHIÁNNYAL ÉS KÁLISÓVAL NÉPIRTÁST. A SÓKITERMELŐ CÉGEK ÉS AZ ÉLELMISZER BOLTOK TÖBBSÉGE, S AZ EZEKET „ELLENŐRZŐ” HAZAI HATÓSÁGOK SEM HAJLANDÓK ELÁRULNI A KÁLISÓVAL KEVERT SZABVÁNYSÉRTŐ ÉTKEZÉSI „SÓK” ÉS AZOKKAL KÉSZÍTETT ÉLELMISZEREK KONYHASÓ- ÉS KÁLIUMTARTALMÁT. EKÖZBEN AZ INTERNETEN IS ÉS EGYÉB PUBLIKÁÉCIÓKAL IS BÜNTETLENÜL RÁGALMAZZÁK AZ FENTI BŰNCSELEKMÉNYEK KIDERÍTŐIT, BIZONYÍTÓIT. SOKSZOR AZT IS TAGADJÁK, HOGY KÁLIUMTARTALMÚ ÉTKEZÉSI SÓK IS FORGALOMBAN VANNAK! ILYENEK PL. A BONSALT ÉS A (BIOKÓSER!) BONOSAL, MINDKETTŐ SZINTE TELJESEN KÁLISÓ. „KONYHASÓPÓTLÓ GYÓGYTÁPSZERKÉNT” A GYÓGYSZERTÁRAK KORÁBBAN KB 99%-OS KÁLISÓTARTALOMMAL REDI-SÓ-t ÁRUSÍTOTTAK. A LEGÚJABB NÉPIRTÓ TALÁLMA NYA VIVEGA, EZ 40% KÁLISÓT TARTALMAZ. AZ BENNE A TALÁLMA NY, HOGY A MÉRGEZŐ KÁLISÓ ROSSZ ÍZÉT FŰSZEREKKEL FEDIK EL. DE 20-50% KÁLISÓ VAN SZÁMOS EGYÉB HAZAI SZABVÁNYSÉRTŐ ÉTKEZÉSI SÓBAN IS. TÖBB OLYAN „SÓT” IS TALÁLTUNK, AMELYNÉL RÁTÖLTÖTTÉK A MÉRGEZŐ KÁLISÓT A KONYHASÓRA, ÉS A KÉTFÉLE „SÓT” ÖSSZE SEM KEVERTÉK!

A fenti módszerrel előidézett betegségeket mindenféle más okokra vezetik vissza, miközben ezt a két fő okot, a nátriumhiány okozást és káliummérgezősítést okozást elhallgatják, vagy ellenkező hatásúnak tüntetik fel. Miniszteri, államtitkári szintről „elavultnak” hazudják az élettani optimum szerinti (fiziológiás mértékű) sópótlást, a vér-elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelő étkezést. Pedig a fiziológiás sópótlás helyességét a tengervíz, a magzatvíz és a vérszérum és a fiziológiás infúziós Ringer-oldat ezekével azonos, optimális nátrium és kálium dózisarányai is igazolják. ISMERT ORVOSI TANKÖNYVEK SZERINT EKG TORZULÁS IS MUTATJA, HOGY EGÉSZSÉGES FELNŐTTNEK IS RONTJA A SZÍVMŰKÖDÉSÉT NAPI 3-4 GRAMMNÁL TÖBB KÁLIUM SZÁJON ÁT BEJUTTATÁSA, SÓT, 1 ÓRÁN BELÜL, PL. ITALLAL A VÉRBE JUTTATVA, MÁR 1-2 GRAMM KÁLIUM IS VESZÉLYESEN MÉRGEZHET!

Függelék: „Technika a biológiában 8”-ból, „A biológia aktuális problémái, A mellékvesekéreg biológiája”.
<http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/doksik/Nepirto%20natriumhiany%20es%20kaliumtuladagolas-TB8.MB.pdf>

Verőce, 2014. június 08. Tejfalussy András



A **mellékelt** (kaliumretardtablettavalelektrovidites I60120) semmibe vett feljelentés kiegészítve megismétlése:

Feljelentés a Kálium Retard tablettát sikerként elkönyvelő engedélyező és forgalmazó tömeggyilkosok ellen.

A hazai gyógyszerártásban a „káliumhiány” ellen KÁLIUM-RETARD tablettát árusítanak. Ezek, amikor a hatásellenőrző KLINIKAI KIPRÓBÁLÁSOKOR vizsgálták a hatásukat, és egyszerre 4 grammnyi káliumot juttattak be vele szájon át, hatból öt személynek sérült a gyomor nyálkahártyája. Egyikük akkut gyomorfalli erroziót (bevérzést) is szenvedett miatta. Nyilvánvaló, hogy a kálium tabletták termék elnevezésben a Retard (késleltetett jelentésű) szó nem erre hívja fel a figyelmet, vagyis erre semmi sem hívja fel a betegek figyelmét. Eredetileg azzal az ürüggyel fejlesztették ki a Kálium Retard tablettát, hogy ne egyszerre szívódjék fel a tablettában lévő kálium, mert tízszer-hússzor veszélyesebb ugyanannyi kálium 1 óra alatt a vérbe juttatva, mint lassanként 8 óra alatt. Egyébként olyan káliumtablettát is árusítanak, amiből azonnal felszívódik a kálium. Tudják, hogy 1 órán belül a vérbe juttatva már 1 grammnyi kálium is vesemérgező, a 2 grammnál több pedig torzíja az EKG-t, vagyis a szív működését is rontja. Ezek a rohadék tömeggyilkosok jelenleg több mint legalább 4,7 gramm kálium akár milyen gyorsan elfogyasztására biztatják fel a magyarokat, a minden gyógyszerártnak kiküldött körlevéllel, amiben megtiltották a gyógyszerártnak, hogy kálisómentes tiszta konyhasót árusítsanak. A népiértő felbuztatást máig sem vonták vissza. Újabban start kosher tanúsítvánnyal is patkánymérgek kálisót árusítanak a magyaroknak, „Bonsalt”, jósó hamis elnevezéssel. Méregdrágán, hogy ezzel is azt a hamis látszatot keltsék, hogy ez az egészségvédő csodasó (miközben patkánymérgek). Csatolom a csaló orvosszakértők rendőrséggel beszereztetett klinikai jelentését, amiben sikerként könyvelték el, hogy minden ember gyomor- és bélfalát észrevétlenül tönkre lehet tenni KÁLIUM RETARD tabletták szedésével. A tablettához mellékelt ismertetőben szó sincs a mellékhatások gyakoriságáról. (A boncolási jegyzőkönyvek azért nem tartalmazzák a boncoláskor talált, a gyomorfalla bemarkódott tablettákat, mert soha sem engedik beírni a boncolás vezető orvosok. Egy boncoló asszisztens mondta). A korábban induló nyomozást, amikor ez a bizonyíték is előkerült, azonnal leállították. A rendőrfőnök azt hazudta, hogy nincs bizonyíték. Ezt dr. Petőfi Attila néven szereplő rendőr bűnözőt feltehetően jutalmul nevezték ki a Nemzeti Nyomozóiroda vezetőjévé.

Magyarok! Saját magatokon kívül nincs kihez fordulnotok a kálium túladagoláson és konyhasóhoz jutás akadályozáson alapuló népiértés elleni védekezéshez. Egyrészt azért nincs, mert csupa korrupt hülye ül a parlamentben. Másrészt azért sincs, mert kell a népiértással kiűritett olcsó hagyatéki ingatlan a betelepülő izraeli és ukrán zsidók részére. Harmadrészt azért sincs, mert a a talmudista terrorista szemiták által így lerövidített életű magyarok nyugdíjbefizetéseit a hazai kormányok ellophatják az elpazarolt, sikkasztott külföldi hitelek kamataira.

Tudom, hogy feleslegesnek tűnik, de azért is megküldöm ezt az elemzést is, mint újabb közérdekű bejelentést, Orbán Viktor miniszterelnöknek, valamint az országgyűlési elnök Kövér Lászlónak, hátha megértik! Hátha betiltatják a gyomor- és bélnyálkahártya felmaró KÁLIUM-RETARD tabletták, a Start kosher tanúsítványos BONSALT és a többi patkánymérgek kálisó tartalmú sókeverék étkezési gyógyszereként forgalmazási engedélyét. Hátha visszavonják a népiértóra változtatott konyhasó és kálium dózisokra a magyar népet felbuztató aljas országos főgyógyszerészeti körlevelet. Ha ezeket mégsem teszik, a kormány magyar védő reklámjai, a SOROS GYÖRGY elleni kirohanások, csak a zsidók betelepítéséről való figyelem elterelési célra szolgálnak, s nem a magyar népet védik! Lehet, hogy valójában nem minket, hanem az itt szerveződő terrorista Új Izraelt védik!? A Magyarország elrablási 1910-es terrorista izraelita terv és valamennyi fajirtási hatásmérési bizonyíték is megtekinthető a www.tejfalussy.com honlapon, ill. a csak azon **belül** működő www.aquanet.fw.hu honlapon!

Verőce, 2017. 04. 27.

Jogos védelem, megbízás nélküli kárelhárító ügyvitel keretében: Tejfalussy András volt parlamenti szakértő

hellek, Csú 3/95 - kő 20! Hosszú
(2 oldal !)

A PESTI KÖZPONTI KERÜLET	
EGYSZÁM	KEZDŐIRATON:
ERK:	1996 -10- 29
PELDÁNY	FELZET
EGYSZÁM	KEZDŐIRATON:

hellek
Csú 3/95 - kő
95026.
A.B. 24 576/1996/2
2. jelzetű
9 20. k. 66. 068/1
1994/3 h. TB-
perrel is kezelt
ve!
96 XI. 01

B. ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS

- Megállapítottuk, hogy rendelkezésünkre került Kálium-R tablettával történő kezelés során arra, hogy el-
lensúlyozzuk vele a különböző gyógyszerek hipoka-
lémizáló mellékhatását.
- Kellő adagban adva normalizálja a szérum K^+ -szin-
tet bármely okból hipokalémiás egyéneknél.

A székletminták paszirozásával a bevett tabletták 13%-át nyertük vissza. A tablettá maradványok KCl tartalmának meghatározása alapján megállapítottuk, hogy a KCl in vivo jól kioldódik, a kiürített tab-
letták mindössze átlag 11,36 mg KCl-ot tartalmaz-
tak.

Ezekből a tényekből nyilvánvaló, hogy a KCl a jó
kioldódás után jól felszívódik.

- A készítmény valóban retard hatású, a maximális szé-
rumkoncentrációt a bevételtől számított 4-12 óra
között tapasztaltuk. 5000 mg feletti egyszeri adag-
nál 48 órával a bevétel után is magasabb volt a szé-
rum K^+ -szint a kiindulásinál.
- A normokalémiás szérumkoncentráció elérése után a
felesleg a vizelettel jól kiválasztódott.
- A radiológiai vizsgálatok során megállapítást nyert,
hogy a tablettá általában 12 óra hosszan követhető.

8 óra det

Code: Kalium-R-jel-PKKB961029a

a gyomor-bél rendszerben. Ezalatt alakját és nagyságát - ha csökkent intenzitással is -, tartja. Szedése még kevésbé gyakorlott radiológusnak sem jelent differenciál diagnosztikai problémát. 4 esetben néhány óráig "kitapadt" a gyomor-bél rendszerben.

10%!

A betegek a kezelést jól tűrték. A leggyakrabban észlelt mellékhatás a gyomorfájdalom volt. A tolerancia vizsgálat során 8000 mg, ill. a feletti egyszeri dózis során 6 egyén közül 5-nél lépett fel. A krónikus kezelés során 40 beteg közül 5-nél észleltük. Valószínű, hogy a gyomorfájdalom fellépte összefüggésben van az egyszerre alkalmazott dózis nagyságával. A tolerancia vizsgálat során 1 betegnél észleltünk akut gyomornyálkahártya érzéseket, mely véleményünk szerint a Kálium-R kezelésnek tulajdonítható. A krónikus kezelést 1 esetben megszakítottuk meléna miatt, de az utóbbiért az alapbetegség - Myeloma multiplex - tehető felelőssé.

! ? !

← (8000 mg) 83% !!

12,5%

← 16%!

Gyomor- és bélmergő

Pécs, 1983. nov. 1.

dr. Vezekényi Zsuzsanna dr. Jávor Tibor
tudományos mts. egyetemi tanár



dr. Past Tibor
tud. főmts.

dr. Tapsonyi Zsuzsa
szakmérnök


dr. Radnai Béla
klin. ts.

dr. Angyal Pál
rtg. oszt. vez. főorvos

dr. Vaskó Gabriella
adjunktus

dr. Nagy Lajos
tud. mts.

Code: Kalium-R-jel-PKKB961029 b



Kálium-R tabletta

A szervezet káliumhiányának a megelőzésére, ill. megszüntetésére, az orvos utasítása szerint.

Ha az orvos másképpen nem rendelkezik, szokásos adagja naponta 1-2 tablettát. A tablettát a reggeli étkezés után, szétrágás nélkül, egészben kell lenyelni.

Ha szapora szívdobogás, hányás, hasmenés, a has felpuffadás, szurokszínű vagy véres széklet jelentkezik, a tablettát szedését abba kell hagyni és orvoshoz kell fordulni.

Hasi röntgenvizsgálat esetén a tablettát szedéséről a vizsgáló orvost tájékoztatni kell.

A gyógyszert gyermekek elől gondosan el kell zárni.

OGYI-eng. szám: 1702/56/84

Code: Kalium-R-cedula



ALKALOIDA RT

AGY-0362

MÉRÉSTANI SZAKVÉLEMÉNY

1 db. tablettát kálium tartalma kb. 0,5 gramm, s kb. 8 óra alatt szívárog ki belőle. Pécsi klinikai ellenőrző mérések (összefoglaló jelentése) szerint, ez a tablettát sokszor órákra is odatapadt a gyomor-, ill. a bélfalra, ahol is lokális kálium-túladagolást, s emiatti gyomorfájdalmat, sőt "akut nyálkahártya eróziót" is előidézett! Vagyis közveszélyes!

A gyógyszertárak számítógépei e hatásai ellenkezőjét hazudják!

Budapest, 2008. 02. 04.


*Tejfalussy András dipl. mérnök méréstani szakértő
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG JT*



A kálisóval műtrágyázott növények (sejtjei) elvesztik a környezeti változashoz alkalmazkodási képességet aszálykor.



A Nobel díjas kutatók fent ismertetett mérései azt is bizonyítják, nem csak a növények sejtjei vesztik el a természetes alkalmazkodási, védekezési képességüket, hanem ugyanígy az emberi sejtek is!



A fenti közérdekű bejelentés az ORFK-hoz és a TEK-hez a parlamenti és kormány szintű terroristák elleni korábbi feljelentéseket kiegészítő feljelentésként is benyújtva! Verőce, 2017. 04. 27-én. Tejfalussy András

feladó:**András Tejfalussy**<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
Elnok@kuria.birosag.hu;
címezett:tek@tek.gov.hu;
Ügyelet ORFK <ugyelet.orfk@orfk.police.hu>
másolatot"orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>;
kap:"laszlo.kover" <laszlo.kover@parlament.hu>
titkos másolat: . . .
 dátum:2017. április 27. 12:09
 tárgy: TERRORIZMUS ELHÁRÍTÁS: Büntetőbíróvági vizsgálatot követelünk az alábbi „kérdézd meg
 orvosod vagy gyógyszerészed” ügyben
 küldő: gmail.com