

Kód: figyelemfelhivas-170729

NEMZETÜNKET FÉLTŐ NYUGDÍJASOK FIGYELMÉNEK FELHÍVÁSA

A mellékelt hatás mérési eredmények egyértelműen bizonyítják, hogy államilag tudatosan csökkentik a nemzeti lakosság szaporodóképességét. Elsősorban az étkezési káliumtúladagolással és konyhasó pótlás csökkentéssel, ami fokozza a többi hatás, pl. a sugárzások egészségkárosítását is. Az étkezéshez több mint ötször annyi káliumot és kevesebb mint ötödannyi konyhasót használnak mint amennyi optimális lenne. Az Európai Bizottság Jogi Osztályától nemrég kapott állásfoglalás szerint ez a WHO előírásai alapján is meg van engedve!

Az Európai Unió engedi a „nemzeti kormányoknak”, hogy kipusztítsák a nemzeti lakosságot, elrabolják a nemzeti lakosság nyugdíjbefizetéseit és kiárúsíthassák az „elárvelt” nemzeti ingatlanokat a letelepedési céllal beözönlő külföldieknek!


Alkotmányos jogállamban kevesebb hatásmérési bizonyíték is elegendő ahhoz, hogy a népirtó „menzareformerek ellen” büntetőeljárást folytasson a nemzeti rendőrség, ügyészség, bíróság. Nálunk viszont ezek (vezetői) a fő bűnpártolói!

Jogos védelemként (Btk.) és megbízás nélküli kárelhárításként (Ptk.) kapta: Dr. Darák Péter Kúria legfelsőbb bíróság elnök és a fogyasztóvédelmi jogkörrel is felruházott Pest Megyei Kormányhivatal (Szob), ahová a bűnöző ügyészségi vezetők átküldték a rendőrséghez és az ügyészséghez általam benyújtott feljelentéseket (ellenem felhasználásra, de belebuktak).

Verőce, 2017. 07. 28.

Tejfalussy András

oknyomozó mérnök feltaláló
www.tejfalussy.com



BIZONYÍTÉKOK:


1. AZ ÉLETTANILAG OPTIMÁLIS KORÁBBI VÍZ-, KÁLIUM- ÉS KONYHASÓ PÓTLÁS (DÓZISAI):

Napi 3 liter víz mellé is csak 0,36 gramm káliumot, de 27 gramm konyhasót optimális (fokozatosan) a vérbe juttatni, pótolni:

NYILATKOZAT

A Ringer oldat a testnedvekhez hasonló ionösszetételű folyadék. A Ringer oldat (0,9 % NaCl, 0,03% KCl, 0,025 % CaCl₂, 0,02 % NaHCO₃, 99 % desztillált víz) szerinti nátrium, kálium, klór és víz pótlási arány megfelelő kóros veszteségek esetén, de ugyancsak optimális a napi étkezések során is.

Budapest 2010. január 6.




Dr. Papp Lajos
ny.egyetemi tanár
akadémiai doktor

Lásd: www.tejfalussy.com „Dr. Papp Lajos szívsebész professzor beszél a kálisóról” (10. Videó)

(Vagyis hibás a Kormány „MENZAREFORM, Nemzeti Sócsökkentési Programja”, amit a tiszta konyhasóval normálisan sózókkal büntetést fizettető „Chips-adó” útján kényszerítenek rá a hazai élelmiszergyártókra. Akármennyi víz mellé napi legalább 4,7 gramm kálium és legfeljebb 5 gramm konyhasó, 2 gramm nátrium akármilyen gyors elfogyasztására kényszerítik a nemzeti lakosságot. Miközben 1 órán belül 1 gramm kálium bejuttatása is felére rontja a vizeletkiválasztást!)

Ez az 1950-ben Nobel díjat kapott biológus kutatók alább ismertetett hatás-mérései szerint is tudatos életrövidítés, nemi jelleg- és szaporodó képesség rontás. Az életrövidítő és ivartalanító hatása az egymás utáni nemzedékeknel fokozódik, és fokozza a többi veszélyes hatás miatti egészségkárosodást is:

2.



konkrétan mit tehetünk

Megköszönöm, hogy Weixl Várhegyi László népszerűsíti a honlapom "nem hinni kell, hanem mérni" alapelvét. Ez természetesen úgy értendő, hogy nem csupán az egyes "hatásokat" kell mérni, tehát pl. az elektromos és mágneses vagy radioaktív sugárzás mértékét, hanem az azok és az egyéb hatások kombinációi élettani következményeit is! Tehát az ok-okozati összefüggések tisztázásához a "mi mennyi" mellett azt is mérni kell, hogy az adott „mi és mennyi” kombinációk milyen távolságból, mennyi idő alatt, hogyan hatnak a vizsgált élő szervezetekre! Ezekre a hatás mérésekre csak a nemzetközi szabadalmaim szerinti sokváltozós GTS-ANTIRANDOM hatásmérési módszer alkalmas. Az ún. „RANDOMIZÁLT” "véletlenszerű" mintavételezések és azok adatait értékelő statisztikai módszeres „epidemiológiai” felmérések akármi és akármi ellenkezője "valószínűsítésére" is alkalmasak! Konkrét hatásmérési bizonyítékokat is közzétettem arra, hogy a jelenleg is egyre fokozó hazai ivartalanodásnak elsősorban az 1960 óta ételekkel és italokkal sokszorosán túladagolt kálium az oka. Lásd az izraeli Potash-reklámokat, a konyhasó helyett kálisót tartalmazó BONSALT „étkezési só”. Továbbá a konyhasópótlás korlátozás. Lásd: Nemzeti Stop Só Program, Menzareform, Chips-adó! Nobel díjat is kaptak 1950-ben a kutató biológusok, akik a konkrét hatás-méréseikkel patkányokon és embereken is bebizonyították az étkezésnél ennyire túladagolt kálium és az NaCl konyhasó pótlását csökkentés életrovidítő, nemi jelleg torzító és fajirtó hatását! Ezek a hatásmérési bizonyítékok és az említett nemzetközi méréstudományi szabadalmaim is megtekinthetők a www.tejfalussy.com honlapomon.

Tejfalussy András oknyomozó mérnök feltaláló (+36 20 218 1408)

(Kód: WVL-Elektrosokk-youtube-170723)

3.

Népiprtó nátriumhiány és káliumtúladagolás

(Megbízás nélküli ügyvitel keretében közérdekű kárelhárítás, lásd Ptk.)

NOBEL-DÍJAS MELLÉKVESEKÉREG KUTATÓK ÉLETTANI KÍSÉRLETEI IS BIZONYÍTJÁK, HOGY A „STOP SÓ NEMZETI SÓCSÖKKENTÉSI PROGRAM”, AMI HAMIS ELMÉLETEKET HAMISAN IGAZOLÓ „EPIDEMIOLOGIAI STATISZTIKÁKRA” HIVATKOZIK, TUDATOSAN MEGSOKSZOROZZA A NEMI TORZULÁSOK, A NEMZŐKÉPTELENSÉG, DE A RÁK- ÉS A TÖBBI ÉLETRÖVIDÍTŐ BETEGSÉG GYAKORISÁGÁT IS.

A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában, „A biológia aktuális problémái” főcím alatt található **„A mellékvesekéreg biológiája”** c. fejezet. Aki írta, az akadémiai nívódíjas Dr. Szabó Dezső azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek alapján **Kendall, Reichstein és Hench 1950-ben Nobel-díjban részesültek** „a mellékvesekéreg-hormonok és szerkezetük és biológiai hatásuk” felfedezéséért. Az összefoglalás jellegű leírás emellett további [61 tudományos publikáció](#) mérési eredményeire is hivatkozik (zárójelben jelzem, hogy a könyvből idézett megállapítások a könyv mely oldalain találhatók).

EZEK A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK EGYBEHANGZÓAN BIZONYÍTJÁK AZT, HOGY A NÁTRIUMHIÁNYOS ÉS KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT EMBEREK ÉS PATKÁNYOK MELLÉKVESEKÉREG HORMONTERMELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A TUDOMÁNYOS KUTATÓK VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEKSEL RENDELKEZNEK (134), AMELYEK SZERINT A NÁTRIUMHIÁNYOS VAGY KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT ÁLLATOKBAN (PATKÁNYOKBAN) ÉS EMBEREKBN IS MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK BE, MIKÖZBEN A SZERVEZET ELEKTROLIT-HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)

A későbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrövidítő, ivartalanító stb. hatások, például konkrétan a következők:

1./ A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik. (140)

2./ A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás alakul ki. (167)

3./ **A különböző stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)**

4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsősorban a vesesejteknél, de a verejtéksejteknél és az emésztőrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez hosszabb ideig tart, törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet:

5./ Idővel nátrium-hiány jön létre. (168)

6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)

7./ Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168)

8./ Romlik a keringés. (168)

9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szűrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)

10./ Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168)

11./ A bőr és a nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)

12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)

13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)

14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)

A hiányos nátrium pótlás és vagy kálium túladagolás miatti egészségromlás leggyakoribb tünetei:

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)

20./ A vér besűrűsödése miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést, renintermelő vesedaganatok jönnek létre. (169)

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait, a nemi jelleg eltorzulást („pszeudohermafroditizmust”) is okoz, emiatt lett, lesz egyre több a homoszexuális :

21./ Leánymagzatok nemi szerveinek a fejlődési zavarait, pl. szeméremajkak összenövését, klitoris-megnagyobbodást. (169-170)

22./ Lánygyermeknél klitoris-megnagyobbodást, idő előtti menstruációt. (170)

23./ Felnőtt nőknél: klitorisz-megnagyobbodás, test- és arcszőrösödés, kopaszodás, érdes hang, a menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)

24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erőteljes izomzat kifejlődést, a testnövekedés gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszőrzet idő előtti megjelenését, korai szakáll- növekedést, hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)

25./ Pseudohermafroditizmus tünetként fiúgyermeknél és férfiaknál emlő-megnagyobbodást okoz. (170)

26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztatarák) növekedését serkenti. (170)

ÉS KONKRÉTAN MIT TEHETÜNK

AZ ÜGGYEL FOGLALKOZÓ ÜGYÉSZEK ÉS EZEK (HAMIS) SZAKÉRTŐI TÖBB MINT 20 ÉV ÓTA, ISMÉTLŐDŐEN „NEM BŰNCSELEKMÉNYNEK” MINŐSÍTIK A KONYHASÓHIÁNNYAL ÉS KÁLISÓVAL NÉPIRTÁST. A SÓKITERMELŐ CÉGEK ÉS ÉLELMISZER BOLTOK TÖBBSÉGE, DE AZ EZEKET „ELLENŐRZŐ” HAZAI HATÓSÁGOK SEM HAJLANDÓK ELÁRULNI A KÁLISÓVAL KEVERT SZABVÁNYSÉRTŐ ÉTKEZÉSI „SÓK” ÉS AZOKKAL KÉSZÍTETT ÉLELMISZEREK KONYHASÓ- ÉS KÁLIUMTARTALMÁT. A MÉRGEZÉS OKOZÓI AZ INTERNETEN ÉS EGYÉB PUBLIKÁCIÓKKAL BÜNTETLENÜL RÁGALMAZHATJÁK A FENTI BŰNCSELEKMÉNYEK KIDERÍTŐIT, BIZONYÍTÓIT. SOKSZOR AZT IS TAGADJÁK, HOGY KÁLIUMTARTALMÚ ÉTKEZÉSI SÓK IS FORGALOMBAN VANNAK! PL. TISZTA KÁLISÓ A „KOSHER TANÚSÍTVÁNYOS BONSAIT”. KÁLISÓT TARTALMAZ. A HOLOKAUSZT ÁLDOZAT „SARA LEE”-RŐL (BOSSZÚBÓL?) ELNEVEZETT HASONNEVŰ CÉG „CSÖKKENTETT NÁTRIUMTARTALMÚ” SÓ IS. A BONOSAL ÉS A VIVEGA STB. A „VIVEGA” „TALÁLMÁNY”. AZ BENNE A TALÁLMÁNY, HOGY A BELEKEVERT ERŐS ÍZŰ FŰSZEREK ELFEDIK A 40%-NYI KÁLISÓ MÉRGEZŐSÉGÉT JELZŐ CSÍPÓS, KESERNYÉS ROSSZ ÍZT! EGYÉBKÉNT A HAZAI GYÓGYSZERTÁRAK „KONYHASÓ PÓTLÓ GYÓGYTÁPSZERKÉNT” IS ÁRUSÍTOTTÁK A 99% KÁLISÓT TARTALMAZÓ, VAGYIS PATKÁNYMÉREG „REDI-SÓ”-T IS! SOK EGYÉB HAZAI SZABVÁNYSÉRTŐ ÉTKEZÉSI SÓBAN IS 20-50% KÁLISÓ VAN! SŐT OLYAN „CSÖKKENTETT NÁTRIUMTARTALMÚ ÉTKEZÉSI SÓT” IS ÁRULNAK, AHOL A MÉRGEZŐ KÁLISÓT CSAK RÁTÖLTIK A KONYHASÓRA, HOZZÁ SEM KEVERIK! PÉLDÁUL EGY NYÍRTASSI CÉG IS ILYENEKET FORGALMAZOTT!

A fenti módszerrel előidézett betegségeket mindenféle más okokra vezetik vissza, miközben ezt a két fő okot, a nátriumhiány okozást és káliummérgezés okozást elhallgatják, vagy ellenkező hatásúnak tüntetik fel. Miniszteri, államtitkári szintről „elavultnak” hazudják az élettani optimum szerinti (fiziológiás mértékű) sópótlást, a vér-elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelő étkezést. Pedig a fiziológiás sópótlás helyességét a tengervíz, a magzatvíz és a vérszérum és a GYÓGYÍTÁSRA TÖBB SZÁZ ÉV ÓTA ALKALMAZOTT fiziológiás infúziós Ringer-oldat ezekével azonos, optimális nátrium és kálium dózisarányai is KÉTSÉG KIZÁRÓAN igazolják!

ISMERT ORVOSI TANKÖNYVEK SZERINT EKG TORZULÁS IS MUTATJA, HOGY A NAPI 3-4 GRAMMNÁL TÖBB KÁLIMUMNAK A SZÁJON ÁT BEJUTTATÁSA AZ EGÉSZSÉGES FELNÖTTNEK IS RONTJA A SZÍVMŰKÖDÉSÉT, SŐT, 1 ÓRÁN BELÜL, PL. ITALLAL VÉRBE JUTTATVA, MÁR 1 VAGY 2 GRAMM KÁLIUM IS VESZÉLYESEN MEGMÉRGEZHETI!

Verőce, 2017. 07. 29.

Tisztelettel:

Tejfalussy András
oknyomozó kutatómérnök feltaláló
www.tejfalussy.com

