

Tisztelt Miniszter Úr!

Mint a 2010. ápr. 6-án Önnek címzett petíció egyik aláírója, nem tudom elfogadni a beadványra írt válaszát.

A magas vérnyomás csökkentéséhez szinte semmi köze sincs a NaCl csökkentésének illetve a KCl emelésének. A hypertensio elsősorban stressz betegség. Ezt Dr. Selye János kísérletei is igazolták. Miért nem volt régen ilyen sok hypertoniás beteg? Nem érte őket ennyi kellemetlen stressz, nem manipulált konyhasót használtak a háztartásban, betartották az előírásokat, a trópusokon mit isznak az emberek? Vagy forralt vizet, vagy esővizet, és nem mesterségesen manipulált élelmiszereket fogyasztanak.

A Ringer oldat 0,9% NaCl, 0,03% KCl, 0,025% CaCl, 0,02% NaHCO<sub>3</sub>, 99% desztillált víz. Tehát a Na:K = 30:1 arány, és nem 1:1, amit a dilettáns "tudósok" javasolnak. Egyék meg ők az ilyen sókat! A Ringer oldatot már nagyon-nagyon régen alkalmazzák súlyos betegeknél infúzió formájában. A természetes arányoktól eltérni nem szabad. Ami jó, azt nem szabad megváltoztatni. Különbözik ez minden dolognál így van.

Súlyos folyadékvesztett, kiszáradt betegeknél/hásmenés, vérvesztés, stb./is Ringer oldatot kell infundálni. A legnagyobb ritkaság, hogy emelt mennyiségű KCl-ot is kelljen adni. Minden idők egyik legnagyobb magyar gyermekgyógyásza -Dr. Kerpel-Fronius Ödön-klinikáján csak előzetes vér szérum ionográfia vizsgálat után volt szabad bekötni az infúziót.

Az egészséges vese naponta csak 2,5 g KCl-ot tud kiválasztani, a többi felhalmozódik a szervezetben, és előbb-utóbb diastolés szívmegállást okoz. Az utóbbi időben fiatal sportolóknál és nem sportolóknál tapasztalható hirtelen halál-szív megállás szívinfarktus nélkül. -/

Nem érdekel, hogy mit mondanak a hazai és külföldi Európai Bizottság "okos tudósai", én a régi dolgokat követem és alkalmazom saját családom és ismerőseim, rokonaim körében. Én az 1950-ben Nobel díjjal kitüntetett három mellékvese kutató eredményeit (eredményeit) fogadom el, és nem a Miniszter Úr / Dr. Székely Tamás/ és ismerőseivel véleményét.

Az említett "nagy tudósok" csak egyék az általuk ajánlott KCl-os sót. Garantált, hogy nem érik meg az átlag életkort. Biztos vagyok benne, hogy ők nem ilyen sót fogyasztanak.

Sokat járva a világot: Spanyolország, Ausztria, Portugália, Németország, Thaiföld, Irán, Japán, Tunézia, Izrael, stb. 250-500 g-os sót vásárolva, hazahozva, megvizsgálva azt tapasztaltam, hogy ezekben a sókban csak igen kevés a KCl. Ha olyan jó lenne a KCl-al dúsított só, akkor a perzsák, kínaiak, zsidók is azt használnák.

Most már csak az a kérdés, hogy tájékozatlanságból, vagy tudatosan zajlik a népiirtás Magyarországon?

Tisztelettel:

Dr. Marosi Pál Ny. gyermekgyógyász főorvos.

*Magas vérnyomást is fokozó csőd-főök: a stressz elleni védekezőképességet is lecsökkenti a folyamatos konyhasó megvonás és a káliumot túladagolás!  
Verőce, 2010. 08. 05. Tejsalussy András dipl. mérnök, mérési szakértő*