

AZ MTA-VAL SZEMBEN KÖZZÉTETT MAGYARORSZÁGI ÉS NEMZETKÖZI FELJELENTŐIRAT
Derítse ki rendőrségi nyomozás az MTA-nak általam sokszor feltett, de általuk csak rágalmakkal álságosan „megválaszolt” kérdéseket, mert bizonyítottan **közveszélyes** a tiszta ivóvíz hiány és a konyhasó hiány és a kálium túladagolás, amit az MTA-ra alapozva egészségjavításként reklámoz a kormány.

1. Az MTA miért veszi semmibe, hogy az MTA-s nagydoktor Prof. Papp Lajos szívsebész egyetemi tanár szerint 110-szer több vizet kell pótolni, mint amennyi konyhasót, és 30-szor több nátriumot, mint amennyi káliumot, mert az ettől eltérés ártalmas? (1)
2. Az MTA miért veszi semmibe, hogy a vérbe a napi 3 liter Ringer infúziós oldattal közel 3 liter desztillált vizet juttatnak be, ill. a SALSOL és SALSOLA infúziókkal is, amelyekben a desztillált víz mellett csak tiszta NaCl konyhasó van? (2)
3. Az MTA miért veszi semmibe az 1950-ben Nobel díjat elnyert biológusok konkrét hatáskalibráló hiteles méréseit, amelyek szerint a csökkentett nátrium- és a növelt kálium pótlás a patkányok és az emberek életét is lerövidíti, mert vese-, ideg és szívműködés rontó, keringésrontó, vérnyomásnövelő és daganat előidéző hatású és nemi torzulásokat okoz, aminek a következtében, néhány nemzedéken át alkalmazva, annyira leromlik a férfiak spermája, hogy már nem tudnak egészséges utódot nemzeni!? (3)
4. Az MTA milyen konkrét biológiai hatáskalibráló hiteles mérésekkel tudja bizonyítani, hogy a WHO-ra és az Európai Unióra hivatkozással folytatott, konyhasó helyett kálisóval ételízesítés és az átlagosan napi 4,7 gramm étkezési káliumpótlásra felbuztatás egészségjavító, ártalmatlan hatású? (4)
5. Az MTA milyen konkrét biológiai hatáskalibráló hiteles mérésekkel tudja bizonyítani, hogy hamisan híreszteli a Szlovák Tudományos Akadémia Növénykórtani és Rovartani Intézete a „Túl sok a kálium”, „Gond a tejjel”, „Hiányzó Mikroelemek”, „Deformálja a sejtet”, Csökkenteni kell” címekekkel ellátott cikkben, hogy kárt okoz a kálium műtrágya a 90mg/kg vízben oldódó káliumnál többet tartalmazó talajoknál, és az e fölé növelt káliumtartalom rákbetegséget és szaporodóképesség romlást is okoz? (5)
6. Az MTA-hoz benyújtott Bp. Kertészeti Egyetemi jelentésben a káliumműtrágya aszálykár fokozó hatását megjelölő Antrirandom hatásvizsgálat eredménye (6) miért van ellenkezőjére hamisítva?
7. Az MTA milyen konkrét biológiai hatáskalibráló hiteles mérésekkel tudja bizonyítani, hogy az átpárlással mindentől tisztított desztillált víz mérgező hatású a fenti (a Ringer infúzió szerinti) víz : konyhasó=110 és nátrium : kálium=30 dózisarány esetén? (7)
8. Az MTA milyen konkrét biológiai hatáskalibráló hiteles mérésekkel tudja bizonyítani, hogy a gyermekétkeztetésnél veszélytelen az ételízesítő konyhasó kálisóval helyettesítése? (8).
9. Az MTA milyen konkrét biológiai hatáskalibráló mérésekkel tudja bizonyítani, hogy a Star kosher tanúsítvánnyal a konyhasó helyett, ételízesítésre árusított BONSALT kálisó nem mérgező? (9)

A fenti kérdések és az 1-9. bizonyíték semmibe vevői a Dr. Dénes Veronika PKKB bíró által a 13.B.24.211/1993/2. végzésben felsorolt súlyos népirtási stb. bűncselekményeket követik el! (10)

A fenti feljelentést jogos védelem (BTK) és megbízás nélküli kárelhárítás (Ptk.) keretében, közérdekű bejelentőként, Orbán Viktor miniszterelnökhöz nyújtom be, miután nemrég bukott bele a fenti bűnözőket bűnpártoló rendőrségi és ügyészégi vezetés az ellenem megkísérelt (6.) bolonddá nyilvánítási retorziójába.

Verőce, 2017. szeptember 28.

(Iratjel: 13.B.24.211-93-2-OV-170928)

Tejfalussy András oknyomozó mérnök korábban minisztériumi, országgyűlési, önkormányzati és tudományos akadémiai hatásmérés tudományi szakértő 2621 Verőce, Lugosi u. 71.,
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, HIHETŐMGAZIN, www.tejfalussy.com

20/1. 2017-09-29, Iratjel: 13.B.24.211-93-2-OV-170928

1.

NYILATKOZAT

A Ringer oldat a testnedvekhez hasonló ionösszetételű folyadék. A Ringer oldat (0,9 % NaCl, 0,03% KCl, 0,025 % CaCl₂, 0,02 % NaHCO₃, 99 % desztillált víz) szerinti nátrium, kálium, klór és víz pótlási arány megfelelő kóros veszteségek esetén, de ugyancsak optimális a napi étkezések során is.

Budapest 2010. január 6.


Dr. Papp Lajos
ny.egyetemi tanár
akadémiai doktor

Professzor úr szóbeli magyarázatait lásd a HIHETŐMAGAZIN www.tejfalussy.com honlapon (10. Videó)!

A következő anyagok vannak a Ringer infúzióban desztillált vízben feloldva:

A Ringer-oldat, melynek összetétele a szív igényeinek legjobban megfelel:

AZ INFÚZÓS RINGER-OLDAT ALKOTÓELEMEI

0,9% NaCl,
0,03% KCl,
0,025% CaCl₂ és
0,02% NaHCO₃-ból áll.

Dr. Kiszely György és dr. Hársing László: Gyógyszerész továbbképzés Biológiai és élettan alapismeretek, 90. oldal.
Medicina, 1958.

Iratkód: Ringer-oldat

Tilos lett kiírni, hogy "desztillált víz"? Korábban kiírhatták, lásd SALSOLA!

SALSOL Oldatos 250

nátrium-klorid

Hatóanyag:
9,00 mg nátrium-klorid milliliterenként. *

Elektrolitkoncentráció:

Na ⁺	154 mmol/l
Cl ⁻	154 mmol/l
Ozmolaritás:	308 mOsm/l
pH:	4,5-7,0

Segédanyag:
Injekcióhoz való víz

Parenterális alkalmazás esetén kizárólag intravénásan alkalmazható!

Az orvos kezéhez.

Lásd a mellékelt tájékoztatót is.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

A forgalombahozatali engedély jogosultja:
TEVA Gyógyszergyár Zrt., 4042 Debrecen
Pallagi út 13.

TEVA

Kizárólag infúziós oldat használható!
A megborított oldatot félretenni és később felhasználni tilos!
A zsák épségét annak összeszorításával ellenőrizze!
Szivárgás esetén nem alkalmazható!
Sorba kötve nem alkalmazható!
Inkompatibilitás veszélye miatt egyéb gyógyszerrel történő elegyítése, melynek alkalmazási előírásában az izotóniás Na mint kompatibilis oldat nem szerepel, kerülendő!
Egyéb gyógyszer az oldatba csak olyan esetben tehető, ha annak gyógyszeralkalmazási előírása izotóniás konyhasóoldattal való hígítást javasol.
Legfeljebb 25 °C-on tárolandó.
Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer!
OGYI-T-3514/04

1-889121

*** 3 liter desztillált vízzel 27 gramm/nap konyhasót juttat be, kálium nélkül!**

Gy.sz.: 3150611

Talmud (Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap):

(10 a. lap.) Legelőször Izrael országa teremtetett, azután az egész világ. Izrael országát maga az Ur öntözi, az egész világot pedig egy követe. Izrael országa esővizet iszik, az egész világ pedig a maradékot. Izrael országa iszik először és azután az egész világ, hasonlóképpen egy olyan emberhez, aki sajtot készít s az élvezhető részt kiválasztja, a hasznavehetetlent meg ott hagyja.

Code: Talmud Dvíz + NaCl

93 b. lap. Betegség alatt az epét kell érteni, még pedig azért, mert az 83 betegségnek van kitéve; a „betegség” szó ugyanis ezt a számot adja. De mindent előzi egy askenyér s rá egy korsó víz. (Ugyanez áll a Baba m. 107 b. alatt is.)

Népiértó nátriumhiány és káliumtúladagolás

NOBEL-DÍJAS MELLÉKVESEKÉREG KUTATÓK ÉLETTANI KÍSÉRLETEI IS BIZONYÍTJÁK, HOGY A „STOP SÓ NEMZETI SÓCSÖKKENTÉSI PROGRAM”, AMI HAMIS ELMÉLETEKET HAMISAN IGAZOLÓ „EPIDEMIOLOGIAI STATISZTIKÁKRA” HIVATKOZIK, TUDATOSAN MEGSOKSZOROZZA A NEMI TORZULÁSOK, A NEMZŐKÉPTELENSÉG, DE A RÁK- ÉS A TÖBBI ÉLETRÖVIDÍTŐ BETEGSÉG GYAKORISÁGÁT IS.

A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában, „A biológia aktuális problémái” főcím alatt található „**A mellékvesekéreg biológiája**” c. fejezet. Aki írta, az akadémiai nivódíjas Dr. Szabó Dezső azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek alapján **Kendall, Reichstein és Hensch 1950-ben Nobel-díjban részesültek** „a mellékvesekéreg-hormonok és szerkezetük és biológiai hatásuk” felfedezéséért. Az összefoglalás jellegű leírás emellett további **61 tudományos publikáció** mérési eredményeire is hivatkozik (zárójelben jelzem, hogy a könyvből idézett megállapítások a könyv mely oldalain találhatók).

EZEK A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK EGYBEHANGZÓAN BIZONYÍTJÁK AZT, HOGY A NÁTRIUMHIÁNYOS ÉS KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT EMBEREK ÉS PATKÁNYOK MELLÉKVESEKÉREG HORMONTERMELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A TUDOMÁNYOS KUTATÓK VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEKEL RENDELKEZNEK (134), AMELYEK SZERINT A NÁTRIUMHIÁNYOS VAGY KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT ÁLLATOKBAN (PATKÁNYOKBAN) ÉS EMBEREKBN IS MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK BE, MIKÖZBEN A SZERVEZET ELEKTROLIT-HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)

A későbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrövidítő, ivartalanító stb. hatások, például konkrétan a következők:

1./ A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik. (140)

2./ A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás alakul ki. (167)

3./ **A különböző stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)**

4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsősorban a vesesejteknel, de a verejtéksejteknel és az emésztőrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez hosszabb ideig tart, törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet:

5./ Idővel nátrium-hiány jön létre. (168)

6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)

7./ Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168)

8./ Romlik a keringés. (168)

9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szűrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)

10./ Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168)

11./ A bőr és a nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)

12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)

13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)

14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)

A hiányos nátrium pótlás és vagy kálium túladagolás miatti egészségromlás leggyakoribb tünetei:

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)

20./ A vér besűrűsödése miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést, renintermelő vesedaganatok jönnek létre. (169)

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait, a nemi jelleg eltorzulást („pseudohermafroditizmust”) is okoz, emiatt lett, lesz egyre több a homoszexuális :

21./ Leánymagzatok nemi szerveinek a fejlődési zavarait, pl. szeméremajkak összenövését, klitorisz-megnagyobbodást. (169-170)

22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idő előtti menstruációt. (170)

23./ Felnőtt nőknél: klitorisz-megnagyobbodás, test- és arcszőrösödés, kopaszodás, érdes hang, a menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)

24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erőteljes izomzat kifejlődést, a testnövekedés gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszőrzet idő előtti megjelenését, korai szakáll- növekedést, hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)

25./ Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermekeknél és férfiaknál emlő-megnagyobbodást okoz. (170)

26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztatarák) növekedését serkenti. (170)

ÉS KONKRÉTAN MIT TEHETÜNK

AZ ÜGGYEL FOGLALKOZÓ ÜGYÉSZEK ÉS EZEK (HAMIS) SZAKÉRTŐI TÖBB MINT 20 ÉV ÓTA, ISMÉTLŐDŐEN „NEM BŰNCSELEKMÉNYNEK” MINŐSÍTIK A KONYHASÓHIÁNNYAL ÉS KÁLISÓVAL NÉPIRTÁST. A SÓKITERMELŐ CÉGEK ÉS ÉLELMISZER BOLTOK TÖBBSÉGE, DE AZ EZEKET „ELLENŐRZŐ” HAZAI HATÓSÁGOK SEM HAJLANDÓK ELÁRULNI A KÁLISÓVAL KEVERT SZABVÁNYSÉRTŐ ÉTKEZÉSI „SÓK” ÉS AZOKKAL KÉSZÍTETT ÉLELMISZEREK KONYHASÓ- ÉS KÁLIUMTARTALMÁT. A MÉRGEZÉS OKOZÓI AZ INTERNETEN ÉS EGYÉB PUBLIKÁCIÓKKAL BÜNTETLENÜL RÁGALMAZHATJÁK A FENTI BŰNCSELEKMÉNYEK KIDERÍTŐIT, BIZONYÍTÓIT. SOKSZOR AZT IS TAGADJÁK, HOGY KÁLIUMTARTALMÚ ÉTKEZÉSI SÓK IS FORGALOMBAN VANNAK! PL. TISZTA KÁLISÓ A „KOSHER TANÚSÍTVÁNYOS BONSALT”. KÁLISÓT TARTALMAZ. A HOLOKAUSZT ÁLDOZAT „SARA LEE”-RŐL (BOSSZÚBÓL?) ELNEVEZETT HASONNEVŰ CÉG „CSÖKKENTETT NÁTRIUMTARTALMÚ” SÓ IS. A BONOSAL ÉS A VIVEGA STB. A „VIVEGA” „TALÁLMÁNY”. AZ BENNE A TALÁLMÁNY, HOGY A BELEKEVERT ERŐS ÍZŰ FŰSZEREK ELFEDIK A 40%-NYI KÁLISÓ MÉRGEZŐSÉGÉT JELZŐ CSÍPÓS, KESERNYÉS ROSSZ ÍZT! EGYÉBKÉNT A HAZAI GYÓGYSZERTÁRAK „KONYHASÓ PÓTLÓ GYÓGYTÁPSZERKÉNT” IS ÁRUSÍTOTTÁK A 99% KÁLISÓT TARTALMAZÓ, VAGYIS PATKÁNYMÉREG „REDI-SÓ”-T IS! SOK EGYÉB HAZAI SZABVÁNYSÉRTŐ ÉTKEZÉSI SÓBAN IS 20-50% KÁLISÓ VAN! SŐT OLYAN „CSÖKKENTETT NÁTRIUMTARTALMÚ ÉTKEZÉSI SÓT” IS ÁRULNAK, AHOL A MÉRGEZŐ KÁLISÓT CSAK RÁTÖLTIK A KONYHASÓRA, HOZZÁ SEM KEVERIK! PÉLDÁUL EGY NYÍRTASSI CÉG IS ILYENEKET FORGALMAZOTT!

A fenti módszerrel előidézett betegségeket mindenféle más okokra vezetik vissza, miközben ezt a két fő okot, a nátriumhiány okozást és káliummérgezés okozást elhallgatják, vagy ellenkező hatásúnak tüntetik fel. Miniszteri, államtitkári szintről „elavultnak” hazudják az élettani optimum szerinti (fiziológiás mértékű) sópótlást, a vér-elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelő étkezést. Pedig a fiziológiás sópótlás helyességét a tengervíz, a magzatvíz és a vérsérum és a GYÓGYÍTÁSRA TÖBB SZÁZ ÉV ÓTA ALKALMAZOTT fiziológiás infúziós Ringer-oldat ezekével azonos, optimális nátrium és kálium dózisarányai is KÉTSÉG KIZÁRÓAN igazolják!

ISMERT ORVOSI TANKÖNYVEK SZERINT EKG TORZULÁS IS MUTATJA, HOGY A NAPI 3-4 GRAMMNÁL TÖBB KÁLIMUMNAK A SZÁJON ÁT BEJUTTATÁSA AZ EGÉSZSÉGES FELNŐTTEK IS RONTJA A SZÍVMŰKÖDÉSÉT, SŐT, 1 ÓRÁN BELÜL, PL. ITALLAL VÉRBE JUTTATVA, MÁR 1 VAGY 2 GRAMM KÁLIMUM IS VESZÉLYESEN MEGMÉRGEZHETI!

http://www.hazipatika.com/gyogyszerkereso/termek/kalium-r_tabletta/874

KÁLIUM-R tabletta



Hatóanyag:

potassium
chloride

ATC:

Kalium
chloride

Vényköteles

- Normatív TB támogatás: **igen**
- Közgyógyellátásra adható: **igen**
- EÜ támogatásra adható: **nem**
- EÜ 100 támogatásra adható:
nem

Stop só, Menzareform

<http://www.stopso.eu/>

FROM : AGROINVEST KFT. Mosonmagyaróvár PHONE NO. : 00 36 96 579752 Feb. 10 2011 10:56AM P2

Iratjel: Tisztífoorvosi-kozokirat-hamisitas-110210m3a

Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet



Alapítva: 1949

Intézetvezető: Dr. med. habil. Martos Éva főigazgató főorvos

FŐIGAZGATÓSÁG

Konyhasó és nátrium

A nátrium ugyan az egyik legfontosabb makroelem a szervezet számára, de napi 1,5-2 gramm nátrium elegendő a szervezet napi nátriumigényének fedezéséhez. A nátrium csaknem teljes egészében a konyhasóból származik, 2 gramm nátrium 5 gramm konyhasónak (NaCl) felel meg. A WHO által ajánlott maximális bevétel napi 5 gramm só, ami egy teáskanálnyi mennyiség. Az európai országokban a tényleges sóbevitel ennél jóval magasabb (9-12 gramm/nap), míg hazánkban az OÉTI által végzett legújabb reprezentatív lakossági táplálkozási felmérés (OTÁP2009) adatai szerint a sóbevitel férfiaknál 17,5, míg nőknél 12,1 gramm, azaz az ajánlott érték több, mint háromszorosa. Sajnos gyermekek esetében is hasonló a helyzet, mint azt az óvodások körében végzett országos felmérés is igazolja (Országos helyzetkép az óvodai közétkeztetésről).

A kálium, nátrium és a vérnyomás

4.

Számos bizonyíték támasztja alá a káliumbevitel és a vérnyomás közötti fordított összefüggést, a magasabb kálium-bevitel endotél-funkciót javító és szív- és érrendszer védő hatását, a bőséges zöldséget, gyümölcsöt tartalmazó, így káliumban gazdag étrend vérnyomáscsökkentő hatása bizonyított.

A nátriumbevitel csökkentése és a káliumbevitel növelése egyaránt vérnyomáscsökkentő hatású, mind normális, mind magas vérnyomásos egyéneknél. Bizonyítottnak tekinthető, hogy minden olyan diétás módosítás, amely a Na-bevitel csökkentésére, illetve a K-bevitel növelésére irányul, jelentősen hozzájárul a lakosság egészségi állapotának javulásához, a szív és érrendszeri betegségekből eredő halálozás csökkentéséhez.

Az Amerikai Hypertonia Társaság 2009-ben megjelent állásfoglalása a vérnyomáscsökkentő eredményező táplálkozási ajánlásokról egyebek mellett javasolja, hogy a nátrium-fogyasztás ne haladja meg a 2,3 grammot naponta, a káliumbevitel érje el a 4,7 gramm/nap szintet. Megállapítja, hogy egészséges egyéneknél, normál vese-funkció mellett a napi 4,7 gramm káliumbevitelt meghaladó étrend sem jelent semmilyen kockázatot, mivel a felesleg a vizelettel kiválasztódik.

Amerikai hivatalos kiadvány arról, hogy a vérérumban mindössze napi 0,2 – 0,4 grammnyi káliumot szükséges pótolni ahhoz, hogy kálium hiány ne lehessen:

Recommended Dietary Allowances

10th Edition

Subcommittee on the Tenth Edition of the RDAs
Food and Nutrition Board
Commission on Life Sciences
National Research Council



NATIONAL ACADEMY PRESS
Washington, D.C. 1989

Estimate of Requirements

Adults Potassium requirements have been evaluated in only a few studies. Although losses on a low or "minimum" potassium diet are small, potassium is less well conserved than sodium (see Table 11-1). Fecal losses are less than 400 mg (10 mEq) per day, and renal losses may approach 200 to 400 mg (5 to 10 mEq) per day (Squires and Huth, 1959). Other losses (e.g., in sweat) are negligible. On intakes of about 20 mEq/day, metabolic balance is achieved at the expense of reduced body potassium stores (up to 250 mEq) and in some cases with reduced plasma levels (<4 mEq/liter). To maintain normal body stores and a normal concentration in plasma and interstitial fluid, an intake of about 40 mEq/day may be needed (Sebastian et al., 1971). Therefore, it would appear that the minimum requirement is approximately 1,600 to 2,000 mg (40 to 50 mEq) per day. There is considerable evidence that dietary potassium exerts a beneficial effect in hypertension, and recommendations for increased intake of fruits and vegetables (NRC, 1980) would raise potassium intake of adults to about 3,500 mg (90 mEq) per day.

Izzadsággal elhanyagolható, a széklettel és vizelettel pedig mindössze 0,4-0,8 gramm a napi káliumvesztése egy felnőttnek. Ennél többnek a pótlása nem csak felesleges, de veszélyes is lehet.
(Code: USA-Dietary256b)

0.1 17

~~23~~

20/9. 2017-09-29, Iratjel: 13.B.24.211-93-2-OV-170928

Kutatási beszámoló részlet a "A HAZÁNKBAN SZAMOTTEVŐ TERÜLETEN TERMESZTETT ZÖLDSEGFAJOK HŐMÉRSÉKLETI IGÉNYEINEK VIZSGÁLATA; KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KORAI FAJTÁKRA" című MTA 458/82/4.1. sz. pályázat zárójelentéséből.

A hőmérséklet, a fajta és az alapvető tápanyagellátottság /N, P, K/ hatását az AGROANAL PJT által "antirandom" néven szabadalmazott módszerrel, 5 tényező kísérletben vizsgáltuk. A talaj tápanyagellátottsága, a hőmérséklet és a fajták között kölcsönhatás mutatható ki. Azt tapasztaltuk, hogy a hőmérséklet emelkedésével csökken a paprika palánták tápanyag-koncentrációval szembeni tűrőképessége, azonban nagyobb K ellátottság mellett a növények magasabb hőmérsékleten is jobban elviselték a nagy N adagokat.

Az N, P, K ellátottság és a hőmérséklet tűrőképesség szempontjából vizsgált fajták palántái az alábbi sorrendbe állíthatók: Rekord, Soroksári hajtató, Javitott Cecei, Fehérszűz.

A Soroksári hajtató és a Fehérszűz fajták számára rövidebb, de magasabb hőmérsékleten történő palántanevelés kedvez, a Javitott Cecei és a Rekord fajták fejlődése a palántanevelési idő hosszával arányos.

Coda: kristofnéjelent

Kristóf Lászlóné dr.
tudományos munkatárs
Kertészeti Egyetem
Zöldégetertechnológiai Intézet

Hamis a kiértékelés, mert a kálisó műtrágya tényleges hatása a Kertészeti Egyetem által leírt hatások ellenkezője volt!
Bp., 1990. febr. 4. Tejfalussy András

A tényleges eredmény:



A Budapesti Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Zöldségtermesztési Kutató Intézetében, szabadföldi ANTIRANDOM MÉRŐTÉR.

A paprika a magas környezeti hőmérsékleten egy fóliaházban ritkult ki előzőleg. Ott pusztult ki fokozottabban, ahol a talaj kálisó-műtrágyát is kapott. (1983) ANTIRANDOM Software All Rights Reserved by inventor dipl. ing. A. Tejfalussy, Budapest. (Code: paprikasoroksar)



A megismételt mérés eredménye:

J e g y z ő k ö n y v

Felvéve ATT Verőcsebarosi kísérleti állomásán, 1992. szeptember 9-én, az izraeli káliumnitrát élővilágvédelmi ellenőrző mérésének az együttes értékelése alkalmával.

Az értékelésen jelen vannak:

Tejfalussy /Sydo/ András ATT elnök

Böröcz Zsuzsanna Antirandom gmk vezető

Pelczéder Tibor növényvédelmi szakértő

Dr. Bicsók Gyula KTM-OTVH főosztályvezető

Dr. Vajna Tamásné a KTM-OTVH ^{max. gazdasági felügyelő} ~~elővilágvédelmi szakértője~~

Rosta László, mint a KTM-OTVH ~~talajtani és növényvédelmi szak-~~
~~értője.~~ ^{Élővilágvédelmi Főosztály főmunkatársa}

A mérőtér elrendezésének és az értékelési módszernek ^{külföldön} /lisd. hátoldali segédlet/, a jelenlévők mindegyike közvetlenül ki tudja olvasni a növényzet látható jellemzőiből /termésmennyiség, levél-elészineződés, megdőlés/ annak interferencia képei alapján /Interaction Interference Test: IIT/ a következő kalibrálási eredményeket:

Kettő növény-/paprika-/fajtánál is mutatja a mérőtér növényzetének a strukturálódása, hogy az izraeli káliumnitrát csak abban az egy esetben károsítja kevésbé /kevésbé, mint a káliumklorid/ a növényeket, ha erősen áztatott talajban használják. Egyébként, a korábban nem trágyázott, ill. még nem műtrágyázott talajon is, a kálium mindkét formában történt adagolása erőteljesen csökkentette már kis, 25-60 kg/hektár dózisainál is, a növényzet alkalmazkodó és különösen a stressz-tűrő képességét. Ez mind a foszfát, mind a nitrogén, mind a fajta paraméterek perturbáló hatása esetén jól láthatóan megmutatkozott. Erőteljesen csökkenti a káliumos műtrágyázás a növényzet asszilyelviselését. Növeli a nitrátfelvételi veszteségeit, több káliumnál ugyanolyan termés és zöld levél szín nagyobb nitrogén műtrágya adagokhoz kapcsolódott /vismérgező hatás/. A foszfát műtrágyakomponens 25-80 kg/hektár dózisok között növelte a növényzet alkalmazkodó és tűrőképességét és produktíváját, száraz körülmények között a nitrogén már 75-125 kg/hektár dózis között is preztitotta a növényzetet, növelte az asszilykárt. Kálium nélkül a növények mindenhol - a vízmennyiségtől függően - kevés műtrágyával is egészségesek, jól produkáltak.

K.m.f.

.....		
Tejfalussy /Sydo/ András	Böröcz Zsuzsanna	Pelczéder Tibor
.....		
Dr. Bicsók Gyula	Dr. Vajna Tamásné	Rosta László



EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI
MINISZTERIUM
Intézményi Főosztály

V. Budapest, Arany János u. 6-8.
Telefon: 301-7832
Telefax: 301-7833
E-mail: john.anna@eszesm.hu

Előadó:
Hiv.szám:
Melléklet: 3 lap
Tárgy: ivóvíz-probléma
Valasz esetén kérjük levelünk számára és ügyintézőnkre hivatkozni.

Szám: 38261-3/2003-0007SIF

*Dr. Szenté Kálmán úrnak
alpolgármester*

*Verőce Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal*

Verőce
Arpád út 40.
2621

Tisztelt Polgármester Úr!

Dr. Csehák Judit miniszter asszonynak júliusban felvetett veszélytelen ivóvízzel kapcsolatos számos kérdését megvizsgáltuk. Elnézését kérem a hosszúra nyúlt ügyintézésért, de a téma közérdekű jellegére tekintettel az Országos Közegészségügyi Központ, az Országos Környezetegészségügyi Intézet, és az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet szakértőitől szakmai állásfoglalást kértünk.

Kérem, fogadja el részletes véleményüket, melyet mellékelten megküldök.

Budapest, 2003. november 13.

Üdvözlettel:

Dr. John Anna
főosztályvezető



Code: csehakverocela

Pótolhatóak. Számos táplálék kiegészítő készítmény áll rendelkezésre, azonban ez nem mentesíti az államot és az ivóvíz szolgáltatót az egészséges ivóvíz biztosításának kötelezettsége alól. Az ivóvíz minőségéről szóló 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet 3. § (5) alatti – európai uniós előíráson alapuló – rendelkezés szerint az „...intézkedések következtében az ivóvíz minősége nem romolhat az emberi egészség védelme szempontjából lényeges tényezők tekintetében...”. Egyes esetekben (pl. jód- vas-, vagy fluoridpótlás céljából) így is szükség lehet táplálék kiegészítő készítmények használatára, azonban szociális szempontból nem lenne elfogadható, hogy az ásványi anyagok pótlásának további költségeivel is a fogyasztókat terheljük.

4. Lehet-e veszélyes a desztillált víz fogyasztása?

Lehet, sőt akár az életveszélyes állapotot jelentő ún. vízmérgezés is előfordulhat. Nagyfokú izzadás esetén a szervezet a kiválasztott vízzel együtt jelentős mennyiségű ásványi sót is veszít. A desztillált vízzel történő folyadékpótlás ilyenkor – egyéb úton történő sóbevitel hiányában – a szervezet ionegyensúlyának gyors felborulásához, gyengeséghez, fáradtsághoz, fejfájáshoz, majd izomgörcsökhöz, szívritmus zavarokhoz, sőt szívmegálláshoz és halálhoz is vezethet. Kevésbé drámai módon, de ugyancsak az ionegyensúly felborulásával károsítja a szervezetet az ún. desztillált vizes böjt. Természetesen a desztillált víz akár évekig tartó fogyasztása sem jelenthet egészségügyi kockázatot, ha az ásványi anyagoknak a táplálékkal történő beviteléről gondoskodunk. Azonban ilyenkor figyelembe kell venni azt is, hogy a különböző ásványok felszívódása a folyékony és a szilárd halmazállapotú táplálékból, valamint a tablettákból és drázsékból nem azonos módon, időben és mennyiségben játszódik le. A felszívódással kapcsolatos ismeretek hiányában a vízből hiányzó anyagok pótlása nem mindig oldható meg optimális módon.

5. Milyen egyéb egészségügyi problémákat okozhat a desztillált, ill. az egyes ásványi anyagokban szegény víz tartós fogyasztása?

Számos népegészségügyi tanulmány alapján nagy valószínűséggel igazoltnak tekinthető, hogy a kis keménységű (azaz kalciumban és magnéziumban szegény) ivóvíz fogyasztása esetén nő a szív- és érrendszeri megbetegedések előfordulási valószínűsége. Ezen felül, élvezeti érték szempontjából sem elhanyagolható a megfelelő ásványi anyag tartalmú ivóvíz előnye a desztillált vízhez képest.

3.1.1 The addition of salt substitutes conforming to Sub Section 3.2 to a special dietary food with low sodium content is permitted and shall be limited by

3.2. Salt substitutes as such

3.2.1 The composition of salt substitutes shall be as follows: **A WHO ITT SZERVEZI, FEDEZI AZ ANTIFIZIOLÓGIÁS "SÓCSERÉVEL BETEGÍTŐKET:**

- | | |
|--|---|
| (a) <u>Potassium sulphate; potas-</u>
sium, calcium or ammonium
salts of adipic, glutamic,
carbonic, succinic, lactic,
tartaric, citric, acetic,
hydrochloric or orthophos-
phoric acids, and/or | } Not limited, except
that P not to exceed
4% m/m and NH_4^+ 3%
m/m of the salt sub-
stitute mixture |
| (b) Magnesium salts of adipic,
glutamic, carbonic, citric,
succinic, acetic, tartaric,
lactic, hydrochloric or
orthophosphoric acids,
mixed with other Mg-free
salt substitutes as listed
in 3.2.1(a), 3.2.1(c) and
3.2.1(d), and/or | } Mg^{++} to be not more
than 20% m/m of the
total of the cations
K^+ , Ca^{++} and NH_4^+
present in the salt
substitute mixture and
P not to exceed 4% m/m
of the salt substitute
mixture |
| (c) Choline salts of acetic,
carbonic, lactic, tartaric,
citric or hydrochloric
acids, mixed with other
choline-free salt substitu-
tes as listed in 3.2.1(a),
3.2.1(b) and 3.2.1(d), and/
or | } The choline content,
not to exceed 3%
m/m of the salt
substitute mixture |
| (d) Free adipic, glutamic,
citric, lactic or malic
acids | } Not limited |

3.2.2 Salt substitutes may contain:

- | | |
|--|--|
| (a) Colloidal silica or calcium
silicate | } Not more than 1% m/m
of the salt substitute
mixture, individually
or in combination |
| (b) Diluents: safe and suitable nutritive foods as
normally consumed (e.g. sugars, cereal flour). | |

3.2.3 The addition of iodine-containing compounds to salt substitutes shall be in conformity with the national legislation of the country where the product is sold.

Joint FAO /WHO Food Standards Programme
CODEX ALIMENTARIUS VOLUME IX.

Codex Standards for Foods for Special Dietary Uses Including Foods for
Infants and Children and Related Code of Hygienic Practice

WHO 1982. Rome

Témakód: WHO (Támakód: hamis kódex 82b)

Naponta kb. 500 mg. vagyis 1/10 teáskanálnyi nátriumra van szüksége a szervezetünknek, ami természetes módon fordul elő táplálékunkban. Hagyományos asztali só fogyasztásával átlagosan 2400-6900 mg nátrium kerül be a szervezetbe, amely raktározódik, megköti a vizet, **ízületi és szívproblémákat, izomgyengeséget, magas vérnyomást okoz**, hozzájárul a csontritkulás és a veseproblémák kialakulásához.

Ehhez nagy segítséget nyújt a **BONSALT NÁTRIUM MENTES SÓ**, amely természetes anyagokat tartalmazó ásványi só. ...

Normális testi funkcióinkhoz, testünk folyadék egyensúlyának szabályozásához szükségünk van sókra.

A Bonsalt minden egyes összetevője természetes eredetű és fogyasztásra alkalmas. **Kálium-klorid**, L-lizin mono-hidroklorid, **tisztított borkő**, **Cream of Tartar**, glutaminsav és szilikon-dioxid. Ezek mindegyike természetes, **jótékony hatást gyakorol a szívre**, a só nátriumtartalmát 100 grammonként 44,8 gramm káliummal helyettesítve.

A Bonsalt korszerű technológia alkalmazásával, a legszigorúbb minőségellenőrzési előírások betartásával készül ...

A **kálium-klorid** a termék sópótló összetevője.

A **szívbarát BONSALT** sós ízek szabadságát nyújtja.

Speciálisan alacsony kalóriatartalmával **bármely diétához** használható !!

A családok asztalainál a legjobb ízeket nyújtja az **EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD FELÉ A BONSALT**.

A termék rendelkezik a **Star-K Kosher** tanúsítvánnyal is.

BONSALT NÁTRIUM MENTES SÓ

A szívbarát BONSALT sós ízek szabadságát nyújtja.

A termék rendelkezik a Star-K Kosher tanúsítvánnyal is.

BONSALT nátrium mentes só 0,85 gr 3 db

1800 Ft „



Bonsalt Salt Without Sodium 0% 85g | Vitamins Outlet Express

www.vitaminsoutletexpress.com/unit/9114761/

Bonsalt is the result of years of research in nutrition and conforms to the strictest quality control standards. **Bonsalt** also certified **Star-K Kosher**. Ingredients: ...

Pesti Központi Kerületi Bíróság
13.B.24.211/1993/2.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság Budapest, 1993. április 23-án, tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

V É G Z É S T

A "népirtás büntető" és más bűncselekmények miatt ismeretlen tettesek ellen indult ügy iratát a bíróság a Budapesti V-VIII-XIII. kerületi ügyészségnek küldi meg.

E végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.

I n d o k o l á s

Tejfalussy András a bírósághoz április 7-én érkezett feljelentésében ismeretlen tettesek megbüntetését kérte az alábbiak miatt:

Mint az AGRONALIZIS Tudományos Társaság Környezetvédelmi -és Önellátósság Központjának Elnöke, évek óta foglalkozik a kálium különböző felhasználási módjai során az emberi szervezetre veszélyeztető hatásaival. Vizsgálódásai során tudomására jutott, hogy egyes klinikákon "napi 1,5-2 gramm káliummal beteg embereket mérgezték meg, majd ennek adta az ellenkezőjére hamisították az engedélyezés intézői (MIA, MIM, EU, OETI, KÜJAL, stb.)" Feljelentésében megemlíti még, hogy hasonlóan veszélyes, mérgező jellegű tüneteket okozhat az ún. REDI só is, melyre az esetleges mérgezési tüneteket nem írják rá, napi 6-10 grammig ajánlják.

Fentiek alapján Tejfalussy András "népirtás büntető" valószínűsítve a bíróságnak tetto meg feljelentését mindazok ellen, akiket évek óta terhel a "káliumozott étkezési só és a káliumos műtrágyázás" alapján büntető jogi felelősség.

A feljelentésben írtak - bizonyítottságuk és valószínűségük esetén - olyan bűncselekmények lehetnek, pl.: foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, terrorizmus, stb., amely miatt a vádat az ügyész képviseli, ezért a bíróság a Bc.313.§./3/.bekezdés a./pontja alapján az iratok megállapításáról rendelkezett.

A fellebbezést a Bc.321.§.d./pontja zárja ki.

Budapest, 1993. április 23.



Dr. Dénes Veronika ok.
bíró

Code: 13B24211-1993

Code: KovacsPalMegbiz

Szám: ATT-22091992

Felkérés szakvélemény készítésére

Az OrTI-től már beszerzett REDI-Só engedélyezési anyagból mérési és engedélyezési eljárás tisztázási szakvélemény készítésére, Tótfalussy Andrást, mint az AGROANALIZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi és Gazdaságtudományi Ellenőrzési Központja elnökét szívesen megkírem, figyelemmel a kálium káros hatásainak felismerésével kapcsolatos előző eredményeire.

Budapest, 1992. április 20.



Dr. Kovács Pál

országgyűlési képviselő

Szociális és Egészségügyi Bizottság titkára

feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetvedelmi.pjt@gmail.com>
címzett:miniszterelnok@me.gov.hu;
erkeztetok@me.gov.hu
másolatot:miniszter@hm.gov.hu;
kap:"ME - Érkeztetők (noreply)" <erkeztetok.noreply@me.gov.hu>;
ferenc.kalmar@mfa.gov.hu

titkos
másolat:

dátum:2017. szeptember 28. 16:49

AZ MTA-VAL SZEMBEN KÖZZÉTETT MAGYARORSZÁGI ÉS NEMZETKÖZI
FELJELENTŐIRAT. Ezt a feljelentést jogos védelem (BTK) és megbízás nélküli
kárelhárítás (Ptk.) keretében, közérdekű bejelentőként, Orbán Viktor
tárgy:miniszterelnökhöz nyújtom be, miután nemrég bukott bele a fenti bűnözőket
bűnpártoló rendőrségi és ügyészségi vezetés az ellenem megkísérelt (6.)
bolonddá nyilvánítási retorziójába. (Iratjel: 13.B.24.211-93-2-OV-170928)
küldő:gmail.com

Tisztelt Levélíró!

Elektronikus levele megérkezett a Miniszterelnökségre.

Üdvözlettel:

Miniszterelnökség

feladó:Érkeztetők (ME) <erkeztetok@me.gov.hu>
címzett:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy <magyar.nemzetvedelmi.pjt@gmail.com>
dátum:2017. szeptember 28. 16:49
tárgy:Válasz
küldő:me.gov.hu
biztonság: A(z) gov.hu nem titkosította az üzenetetTovábbi információ

Tisztelt Levélíró!

Elektronikus levele megérkezett a Miniszterelnökségre.

Üdvözlettel:

Miniszterelnökség

feladó:ME - Érkeztetők (noreply)<erkeztetok.noreply@me.gov.hu>
címzett:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy <magyar.nemzetvedelmi.pjt@gmail.com>
dátum:2017. szeptember 28. 16:49
tárgy:Válasz
küldő:me.gov.hu
biztonság: A(z) gov.hu nem titkosította az üzenetetTovábbi információ