


Világméretű csalás a túladagolt mérgező kálium életmentőnek hazudásával vegyi fegyverként országhódítás

A Szendi Gábor (lásd feljelentés-szendig-ellen-170217) és a **terrorista bűntársai elleni feljelentés kiegészítése:** Világszerte kálissóval mérgeztik, irtják azokat a népeket, akikről el akarják tulajdonítani az országaikat. Nem csak az embereket mérgezik vele. A gazdasági állataikat és növényeiket is. Figyelem elterelésre szolgál, hogy a kálium túladagolás mérgező hatásait egyéb károsító hatásokra fogják rá. Hazánkban például a kálissóval kevert konyhasóra foghatják rá a kálium műtrágyával felfokozott aszálykárt. Ha valaki észrevette, hogy a kálissóva műtrágyázott földjén sokkal erősebben pusztít az aszály, mint a környező termőföldeken a „szakértők” valószínűsíthetik: ő biztosan a konyhasóval kevert kálissóval műtrágyázott, figyelmen kívül hagyva, hogy a konyhasóval bevitt nátrium (Stefanovits Pál talajtan professzor nyilatkozata szerint) „az ördög a talajban”. Ezért is árusítanak olyan kálium műtrágyákat, amelyekre nincs ráírva, hogy konyhasót is tartalmaznak. Például a hazai „40%-os kálisó elnevezésű” műtrágyában a 60% (!) kálisó mellett 26% nátrium-klorid konyhasó van! Kiderült, hogy a mérgezési csalás elfedésére olyan „műtrágyázási tartamkísérletekkel” állellenőrzik a műtrágya hatásokat, amelyek „egybeomossák” a növényeket befolyásoló hatásokat. Ezek évtizedek óta elfedik a kálissóval országosan előidézett gazdasági és egészségi károkat. A világméretű kálium túladagolási csalás akadémikus és egyetemi tanár pozíciókkal is jutalmazott szakértői a (valószínűtlen!) kálium hiány vélelmezett veszélyeivel riogatják a népeket. Lekicsinylik, elhallgatják a kálium túladagolás mérgezőségét. Gátolják a kálium túladagolás mérgező hatásait bizonyító mérési eredmények közzétételét. Azt hazudják, hogy a vese eltávolítja a mérgező káliumtöbbletet, miközben tudják, ismerik a cáfolatát, azt, hogy egy óra alatt az 1,6 grammnál, de egy nap alatt a 11 grammnál több kálium ami biztosan életveszélyes. Haa károsultak előtt nem sikerül eltitkolniuk a kálium túladagolás mérgező hatását leleplező hatásméréseket, kórusban szembehazudják azokat, mindenhol becsmérlik, rágalmazzák a mérgező hatást hatás mérésekkel bizonyító publikációk szerzőit, a valaha létezésük nyomait is eltüntetni próbálva. Velem szemben is ezt teszik a kálium túladagolás mérgezőségét kimutató Antirandom hatásmérés szabadalmaztatása, kb. 40 év óta. Kik lehetnek ezek a terroristák? Valószínűsíti a „hová tartozásukat”, hogy az olyan országok egyáltalán nem vagy csak alig használnak kálium műtrágyát, lásd Kínát és az iszlám országokat, ahol nem terrorizálhatják az államigazgatást a Talmud és Tóra által rablógyilkosságra felbízott, az Izraeli Tudományos Titkosszolgálat által koordinált minisztériumi, akadémiai, egyetemi vezetők, ill. hamis tudományos szakértők.

A kálissóval rablógyilkoló maffiát a nemzetközi szabadalmaim szerinti ANTIRANDOM biomonitor software-es hatásmérés buktatta le. A software szerinti **hatásmérő létesítmény terv** meg „fóliaházi aszály” kell hozzá.



A konyhasóval kevert mérgező kálisó betiltatásáért benyújtott Petíciókra a mezőgazdasági miniszerek nem válaszoltak. Állítólag Ángyán József államtitkárnál „tűnt el”. A hazai tudományos akadémiai elnök Pálinkás József a petíciót közzétevő honlap betiltásával fenyegetéssel reagált. Az általuk elszabotált petíció(in)kat lásd a www.tejfalussy.com honlapomon az „52. E-mail könyv: Az 1. és 2. petíció dokumentációja” cím alatt.

Jogos védelem (Btk.), és mint korábbi országgyűlési szakértő, megbízás nélküli kárelhárítás (Ptk.) keretében is, Orbán Viktor miniszterelnökhöz a korábbi nyilvános közérdekű bejelentései kiegészítéseként is benyújtja:

Tejfalussy András oknyomozó mérnök feltaláló
www.tejfalussy.com



Feljelentem Szendi Gábort **Az életmentő kálium** című publikáció szerzőjét, a népírtó vegyi fegyver kálium túladagolásra felbízgatásával **terroristáknak** bűnsegédkezési váddal.

Indokolás:

Megbízhatatlanok a kálium túladagolás „vérnyomás csökkentő gyógyhatásának” bizonygatásához a az alábbi publikációjában hivatkozott „vérnyomás csökkenési statisztikák”. Szendi Gábor tudatosan vezeti félre az olvasókat, miután maga is megállapította korábban, hogy az ilyen csekély vérnyomás változások kisebbek a vérnyomás mérések pontatlanságnál, s emiatt az ezekre alapozott statisztikák alkalmatlanok a vérnyomásra gyakorolt tényleges hatások bizonyításra. Lásd: „Paleolit táplálkozás” (JAFFA Budapest, 2009., 162-170. oldal.)


Azért is tudatos a Szendi Gábor részéről folytatott hamis felbízgatás, mert az általa „életmentőnek” hirdetett „sokszoros kálium túladagolás vérnyomásmnövelő, életrövidítő és ivartalanító, fajirtó hatását 1950-ben Nobel díjat kapott kutatók mérései is bizonyítják, hazánkban is közzétették a nátrium és kálium dózis variációs publikált hatásméréseik ezen eredményeit. Lásd „Technika a biológiában 8., A mellékvesekéreg biológiája”, Medicina Orvosi könyvkiadó 1976.). Ezenkívül Szendi Gábornak hivatalból is tudni kell, hogy a szív számára legjobb nátrium : kálium dózisarány a Ringer infúziós oldat szerinti, s hogy ez étkezés esetén sem lehet más. Tudja, hogy a Ringer infúzióval **24** óra alatt (lassanként) **3** liter desztillált vizet és **27** gramm konyhasót, de csak **0,36** gramm káliumot juttatnak be a vérbe. Nem pedig **4,7** grammnál több káliumot, amire Szendi Gábor felbízgat! Ő is fedezi, hogy „Star kosher tanúsítványos Bonsalt egészségvédő étkezési sóként” árulják a patkányméreg kálisót. A túladagolt kálium vegyi fegyver, a Fekete Angyalként elhíresült ápolónő is azzal sorozatgyilkolt!!

Jogos védelemként (Btk.), megbízás nélküli kárelhárítás keretében (Ptk.) indítványozom Szendi Gábor büntetőbírószágon elítélését **a magyarok mérgező kálium túladagolásra felbízgatásában tudatosan bűnsegédkezése alapján**. A hazai terroristák több magyar embert gyilkolnak le a kálium túladagolással havonta, mint ahány keresztényt az iszlám állam terroristái a világon eddig összesen!

Verőce, 2017. 02. 17.

Tejfalussy András

oknyomozó mérnök feltaláló
(1-420415-0215, an.: Bartha Edit)
2621 Verőce, Lugosi u. 71.
www.tejfalussy.com



Csatol melléklet: az internetről bűnügyi bizonyítékként kimásolt Szendi Gábor publikáció:



http://www.tenyek-tevhitek.hu/az_eletmento_kalium.htm



„Szendi G: Az életmentő kálium

A genetikai mismatch, azaz össze nem illés számos területen ássa alá a modern ember egészségét. A nyugati étrend rejtett hiányai alattomban ássák alá az egészséget, úgy, hogy a végeredményben kialakuló betegségeket "korral járónak" és sorszerűnek tekintik. Ilyen a magas vérnyomás, a szívbetegség, a sztrók és még sok "apróság", amit az évtizedeken át fennálló káliumhiány eredményez.

A paleót ismerők számára közhely már, hogy az Európában kb. 5000 éve elterjedt földművelés alaposan megváltoztatta táplálékunk összetételét. A magnéziumhiányról már korábban írtam, most egy másik fontos elem szerepére szeretném a figyelmet felhívni.

A természeti népek és a paleolit kor embere még napi 6-10 gramm káliumot fogyasztott (He és MacGregor, 2008), míg a mai átlag amerikai felnőttek kevesebb, mint 2%-a fogyaszt naponta 4.7 g-nál többet (Cogswell és mtsi., 2012). A nátrium-kálium arány rendkívül fontos a szervezet normál működése szempontjából, a fokozott nátriumfogyasztás csökkent kálium bevitel mellett szív- és érrendszeri betegségeket és egyéb működési zavarokat okoz a szervezetben. Míg a paleolit kor embere 16:1 arányban fogyasztott káliumot és nátriumot, ma a fejlett országokban ez az arány körülbelül 0.6:1. azaz a káliumfogyasztás több mint a huszadára csökkent (Rodrigues és mtsi., 2014). Valójában -szemben a közegészségügyi tanácsokkal - nem a sófogyasztást (azaz a nátriumbevitelt) kéne csökkenteni, hanem a káliumfogyasztást növelni. A közegészségügy által elvárt mértékű sófogyasztás csökkentés tényleges előnyt nem jelent a vérnyomáscsökkentésben (Adler és mtsi., 2014), ugyanakkor jelentősen megnöveli a kardiovaszkuláris halálozás kockázatát (Stolarz-Skrzypek és mtsi., 2012).

Ha azt kérdezzük, hova tűnt az étrendünkből a kálium, akkor a válasz kettős. Egyrészt káliumot leginkább zöld növények és gyümölcsök fogyasztásával lehet komolyabb mennyiséget bevinni. A sok gyümölcs azonban előnytelen a magas fruktóz és cukortartalom miatt, maradnának hát az alacsony energiatartalmú zöldségek, amiből viszont igen keveset fogyaszt a nyugati ember. Ráadásul 1940 és 1991 között az élelmiszerekben átlagosan 15%-kal, gyümölcsökben 19%-kal csökkent a káliumtartalom (Watts, 2008). Az alacsony szintű zöldségfogyasztás és a káliumbevitel drámai csökkenése közti kapcsolat erősen megkérdőjelezi azt a magyar paleósok közt terjedő divatot, hogy egyesek a ketogént kezdik "igazi" paleóként hirdetni, azt állítva, hogy a ketózis (zsírégetés) volna az ember természetes üzemmódja. Az emberi szervezet fokozott káliumigénye is közvetetten bizonyítja, hogy az ember mindig is sok növényt fogyasztott. A ketogén ásványianyag pótlás nélkül komoly ion kiegyensúlyozatlansághoz vezet.


A sok káliumfogyasztás egészséges embereknél baj nem okozhat, mert a vese a fölösleget kiválasztja. Baj csak akkor lehet a káliumpótlásból, ha valakinek a veséje károsodott és nem képes a megfelelő kálium-nátrium arányt fenntartani. A nyugati népesség kevés káliumot fogyaszt, s mivel a vese maximális kálium visszatartás esetén is folyamatosan káliumot ürít, ezért alacsony kálium és magas nátrium fogyasztás esetén óhatatlanul relatív káliumhiány lép fel, mert a só ürítés fokozza a káliumvesztést (Schaefer és Wolford, 2005).

Kórosan alacsony káliumszintet (hypokalémiát) okozhat pl. a vízhajtók szedése, de a bétablokkolók, penicillin származékok, kortizonkezelés is. Az intenzív osztályra kerülők 20%-a közepes-súlyos hypokalémiában szenved, a baleseti sérülteknél egy az arány 40-70% is lehet (Schaefer és Wolford, 2005). A magnéziumhiány általában káliumhiánnyal is jár, s jól ismert a nyugati népesség nagy része magnéziumhiányban szenved (Galan és mtsi., 1997). A káliumhiány tünetei a fáradtság, izomgyengeség, szívritmus zavarok (különösen szívbetegéknél), székrekedés, és olykor az állandó szomjúság.

Kálium és vérnyomás

Harminckét placebo kontrolllos vizsgálat összevont elemzése szerint minden 2 gramm növekmény a káliumfogyasztásban magas vérnyomásban szenvedő betegek esetén átlagosan 4.4/1.8 (szisztolés/diasztolés) vérnyomáscsökkenést eredményez. A káliumpótlásban elsősorban a káliumcitrát és a kálium bikarbonát bizonyult hatásosnak, de a kálium klorid is megfelelőnek tűnt. Egy vizsgálat találta gyengébb hatásúnak a kálium kloridot (Whelton és mtsi., 1997). Természetesen egészségesebb (volna) zöldségek fogyasztásával növelni a káliumbevitelt. Valódi vegetáriánusoknak (azaz nem kenyéren, hanem zöldségeken élőknek) általában alacsony a vérnyomása, akárcsak a természeti népeknek (Lindeberg, 2009). Azonban a reális megoldás a tablettás, vagy a káliummal dúsított só.

Amikor a nyugati étrendet összehasonlították a vegetáriánus és a DASH (gyümölcs, zöldség, teljes kiőrlésű gabona, zsírszegény fehérjék), akkor a DASH étrend bizonyult a leghatásosabb vérnyomás csökkentőnek.



(forrás: Appel és mtsi., 1997)

Ugyanakkor az ideális vérnyomás 115/75, azaz még a legjobb étrenddel is - legalábbis a fenti vizsgálatban - az ideálisnál magasabb vérnyomást lehetett csak elérni. Ez is a kálium mesterséges pótlása mellett érv. A DASH étrend tipikusan a nyugati táplálkozási mítoszoktól fertőzött, ezért ajánlják a só és zsírszegény étrendet az embereknek. Vajon mitől jobb a DASH étrend még a vegetáriánus étrendtől is? Ha megvizsgáljuk azonban a DASH étrend összetevőit és összevetjük más vizsgálatokkal, akkor megállapíthatjuk, hogy a zsírszegény étrend nem jobb, hanem rosszabb hatású a vérnyomásra. Egy vizsgálatban a zsírok hatását vizsgálták a vérnyomásra, és úgy találták, hogy a telített (állati) zsírok nem befolyásolják a vérnyomást, az egyszerűen telítetlen zsírok (mint pl. a kókuszszír, olívaolaj) kifejezetten csökkenti a vérnyomást (Rasmussen és mtsi., 2006). A különbséget még eredményezheti a fehérjebevitel. A DASH étrendben viszonylag magas a fehérjearány. A húgysavszint erős kapcsolatot mutat a vérnyomással (Feig, 2012;


Johnson és mtsi., 2003). A húgysavszintet a fruktóz fogyasztás (Nakagawa és mtsi., 2006) jelentősen emeli, s ismeretes, hogy a 20. század során a fruktóz fogyasztás drámaian megnőtt (ezzel édesít manapság mindent az élelmiszeripar). A fehérjefogyasztás ezzel szemben csökkenti a húgysavszintet és a vérnyomást is (Hodgson és mtsi., 2006). Kínában ott a legalacsonyabb a vérnyomás, ahol a legtöbb fehérjét fogyasztják (Lindeberg, 2009).

Paleo étrendre általában rendeződik a magas vérnyomás, ennek több okát láthatjuk. (Bővebben a Paleolit Életmód Magazin 2015/1 számában, ami március 13-án jelenik meg.)

A kálium és a szív

A káliumhiány egyik jellemző hatása a szívkamrai aritmiák és fibriláció (kamraremegés). Ennek különösen nagy a kockázata szívbetegeknél (Weiner és Wingo, 1997).

Minél magasabb a vérben a kálium szintje (a normál érték felső határáig), annál kisebb a kockázata a kamrai tachykardiának (Macdonald és mtsi., 2004).



(Forrás:
Macdonald és mtsi., 2004)


A szívelégtelenségben szenvedők 50%-a hirtelen szívhalált hal, melynek hátterében általában az alacsony káliumszintből fakadó szívritmiák állnak (Macdonald és mtsi., 2004). A hypokalémiás betegek tízszer gyakrabban halnak meg más kórházi betegekhez képest (Paltiel és mtsi., 2001). Magas vérnyomásban szenvedő betegeknek gyakran adnak vízhajtót, amelynek némely típusa hypokalémiát okoz, ha nem pótolják folyamatosan az elvesztett káliumot. Szívinfarktus után életveszélyes aritmiák alakulhatnak ki alacsony káliumszint esetén. A hypokalémiás infarktusos betegeknél 5-ször valószínűbben alakul ki aritmia, míg 4.6 mmol/l szint felett nem figyeltek meg aritmiát (Kjeldsen, 2010). Még a normál intervallumon belül is, az

alacsonyabb értéket mutatóknak háromszor nagyobb a kockázata az aritmiára, mint a felső értéket mutatóknak. 7800 beteg adatait feldolgozva kiderült, hogy a 4 mmol/l alatti értéket mutatók a 4 mmol/l és a 4.9 mmol/l közé eső értéket mutatókhoz képest 56%-kal valószínűbben haltak meg általános okokból, 65%-kal nagyobb eséllyel szívbetegségben, és 86%-kal valószínűbben szívelégtelenségben (Kjeldsen, 2010).

30 ezer ember vizsgálatából az derült ki, hogy akik mindennap fogyasztottak zöldséget és gyümölcsöt, azoknak 30%-kal kisebb kockázatuk volt a szívinfarktusra (Yusuf és mtsi., 2004).

Elemzések szerint napi 600 gramm zöldség és gyümölcs fogyasztása 31%-kal csökkentené a koronária megbetegedések számát (McKee és mtsi., 2006).

Egy idős emberek otthonában végzett vizsgálatban 1800 idős ember egy részénél bevezették a káliummal dúsított só használatát, s ezáltal 76%-kal nőtt a káliumfogyasztás. A vizsgálat 31 hónapja alatt a káliummal dúsított só fogyasztók körében 60%-kal csökkent a szív eredetű halálozás, és az idős emberek 0.3-0.9 évvel éltek tovább (Chang és mtsi., 2006). Ez egyben üzenet azoknak, akik bedőltek annak a hisztériának, hogy "népirtás" folyik a kálium kloriddal "mérgezett" sóval. Akik felvásárolták a tiszta konyhasót, és azt hiszik, ezzel védik az egészségüket, azok valójában tovább rontották az amúgyis rossz kálium-nátrium arányukat.



(Forrás: Chang és mtsi., 2006)

A grafikonról leolvasható, hogy a vizsgálat 1200. napján a tiszta só fogyasztók közül már 20%-kal többen haltak meg.

Kálium és sztrók

859 ötven és hetvenkilenc év közötti ember 12 éves követéses vizsgálatából az derült ki, hogy a legtöbb káliumot fogyasztókhoz képest a legkevesebbet fogyasztóknak 2.6-szer volt nagyobb a sztrókkockázata. Minden 400 mg növekmény a káliumfogyasztásban 40%-kal csökkentette a sztrók kockázatot (Khaw és Barrett-Connor, 1987). A káliumfogyasztás a magas vérnyomástól, testsúlytól, életkortól függetlenül védett a sztrókkal szemben.

44 000 ezer ember követéses vizsgálata szerint a napi 2.4 gramm káliumot fogyasztókhoz képest a legalább 4.4 grammot fogyasztóknak 40%-kal kisebb volt a sztrókkockázata. A sztrók kockázat dózisfüggő volt, azaz minél több káliumot fogyasztott valaki, annál kisebb volt a kockázata (Ascherio és mtsi., 1998). Hasonló eredményt kaptak 86 000 nő 14 éves követéses vizsgálatában. Itt a legtöbb káliumot fogyasztóknak 38%-kal csökkent a sztrókkockázata a legkevesebb káliumot fogyasztókhoz képest (Iso és mtsi., 1999).

Elemzések szerint napi 600 gramm zöldség és gyümölcs fogyasztása 19%-kal csökkentené a sztrókok számát (McKee és mtsi., 2006). A banán az egyik legnagyobb káliumtartalmú növény, 10 dkg banán 400 mg káliumot tartalmaz. Elvileg, ha banánból fedoznánk a napi zöldség és gyümölcsbevitelt, akkor napi 60 dkg banán még mindig csak 2.4 gramm káliumot jelentene, ami még a manapság javasolt napi bevitelt sem fedezi. Ezzel ismét azt szeretném sugallni, hogy ésszerűbb megoldás a káliumot tablettákból pótolni. A vizsgálatok azt igazolják, hogy az elfogyasztott zöldség-gyümölcs káliumtartalma és a mesterségesen pótolta kálium azonos hatású, azaz a kardiovaszkuláris kockázatok csökkentése szempontjából a természetes és vegyület formájában bevitt kálium azonos hatású (He és MacGregor, 2008).

Kálium és izomzat


A káliumhiány, különösen, ha nagy erőfeszítés igénylő sportot űz valaki, izomsejt széteséshez vezethet, továbbá a káliumhiány izomgyengeséget, fáradékonyságot, izomgörcsöket eredményezhet (Weiner és Wingo, 1997).

Kálium és cukoranyagcsere

A káliumhiány rontja az inzulintermelést és a sejteken az inzulinhatást, azaz ront a vércukorszinten (Weiner és Wingo, 1997). A thiazid hatóanyagú vízhajtók jelentős káliumvesztést okoznak. Ötvenkilenc thiazid hatását elemző vizsgálat összevont elemzése azt igazolta, hogy a káliumvesztés jelentősen rontja a inzulinérzékenységet és megnöveli a cukorbetegség kockázatát (Zillich et al. 2006). Ugyanakkor cukorbetegknél a káliumpótlást óvatosan kell végezni, ha a betegnek már károsodott a veséje. A paleo étrend amúgy javíthatja a károsodott vese funkcióját. Két vizsgálat is megerősítette, hogy a ketogén étrend visszaállítja a vese működését - legalábbis egereknél.

Kálium és vese

A veseciszták egy részét az alacsony káliumszint okozza, és a káliumszint rendezése visszafejlesztheti a cisztákat (Weiner és Wingo, 1997). A fokozott káliumfogyasztás csökkenti a kalciumürítést, s ezáltal egyfelől csökken a vesekő kialakulásának kockázata, másrészt a nagy káliumfogyasztás csökkenti idős korban a csontvesztést (He és MacGregor, 2001).



(Forrás: He és MacGregor, 2001)

A legtöbb vesekő kalciumtartalmú, s mivel a fokozott káliumfogyasztás csökkenti a vesében a kalcium kiválasztást, azáltal jelentősen csökken a vesekő kockázat (Curhan és mtsi., 1993). Ez különösen fontos ketogén étrenden. A magas vérnyomás vesekárosító hatása ismert, így nem meglepő, hogy állatkísérletek szerint a fokozott káliumbevitel kivédi a vesefunkciók romlását. Ráadásul az állatkísérletek szerint ez a védőhatás túlmutat a vérnyomáscsökkentő hatáson is. Embereknél esettanulmányok igazolják a kálium vesevédő hatását (He és MacGregor, 2008).

Összefoglalás

A kálium észrevétlenül lecsökkent táplálékunkban, s a rossz irányba eltolódott kálium-nátrium arány jelentősen hozzájárult a szív- és érrendszeri betegségek elterjedéséhez, s a káliumhiány egyéb következményei rontják a cukoranyagcserét, károsítják a vesét, fokozzák a vesekőkockázatot és a veseciszták kialakulását. A kálium fontos szerepet játszik a szívizom, a vázizomzat, és az erek izomzatának normál működésében. Fontos mindenkinek mesterségesen pótolni a káliumot, azonban károsodott vesefunkció mellett folyamatosan ellenőrizni kell a vérben a káliumszintet, mert a túladagolás sem veszélytelen. Egészséges embernél a vese a fölös káliumot gond nélkül eltávolítja.” * ???????

*** A Szendi Gábor elleni bizonyítás kiegészítése:** Az OÉTI által végeztetett klinikai kísérletekben a vízben oldott 1 vagy 2 grammnyi kálium szájon át éhgyomorra 1 órán belül bejuttatása is 50%-kal csökkentette az előtte egészséges felnőttek veséi vizeletkiválasztását, meghaladta a vese kálium eltávolítási sebességét, s ez mérgezőre növelte a vészsérumuk káliumtartalmát,. Lásd a ” **A MAGYARORSZÁGI TERRORISTÁK SZEMÉTRE DOBTÁK AZ EGÉSZSÉGVÉDŐ VÍZ- ÉS SÓPÓTLÁSRA VONATKOZÓ TÖBB EZER ÉVE JÓL BEVÁLT ELŐÍRÁSOKAT?**” című további mellékletet!

Iratjele: szemetbedobtakazegeszsegvedeloeloirasokat170215

A MAGYARORSZÁGI TERRORISTÁK SZEMÉTRE DOBTÁK AZ EGÉSZSÉGVÉDŐ VÍZ- ÉS SÓPÓTLÁSRA VONATKOZÓ TÖBB EZER ÉVE JÓL BEVÁLT ELŐÍRÁSOKAT?

Miért dobták szemétkébe a több ezer éve bevált alábbi víz- és sópótlási egészségvédő előírásokat a hazai egészségügyi vezetők, akik jelenleg „Nemzeti Stop Só Programként”, „Menzareformként” és Chips adóval arra kényszerítik a magyarokat, felnőtteket és kisgyerekeket is, hogy egy napon belül akármennyi víz mellé, akármilyen ütemezéssel 5 grammnál kevesebb konyhasót, de **4,7 grammnál több káliumot** pótoljunk? Elfelejtették a sejteket körülvevő testnedvek, a vérszérum **víz : konyhasó = 110, nátrium : kálium = 30** természetes (elektrolit) arányai ilyen mértékű változtatása állatnál és embernél életrövidítő és ivartalanító hatását? Miért terjesztik a desztillált ivóvízről, hogy mérgező??

1./ A gyógyításra több száz év óta sikerrel alkalmazott fiziológiás infúziós **Ringer** oldat, desztillált vízben oldva, literenként **9 gramm konyhasó** mellett, **0,12 gramm káliumot** juttat be lassú ütemben a vérbe. Azért ennyit, mert ez felel meg a testnedvek, a vérelektrolit természetes víz:konyhasó=**110** és nátrium:kálium=**30** arányainak. Például **24 óra alatt 3 liter Ringer infúzió**, desztillált vízben oldva, **27 gramm NaCl konyhasót**, de csak **0,36 gramm káliumot** juttat be a vérbe. Ezekből étkezéssel is ennyit optimális a vérbe juttatni. Lásd: Gyógyszerész továbbképzés, biológiai és élettani alapismeretek, Medicina 1958, 90. oldal.

2./ **1950-ben Nobel díjat** kapott három kutató, akik patkányoknál és embereknél konkrét nátrium és kálium dózis variációs hatás mérésekkel bebizonyították a túl sok káliumot és túl kevés konyhasót bejuttató étkezés életrövidítő és ivartalanító, fajirtó hatását. Lásd: Technika a biológiában 8., A mellékvesekéreg biológiája. Medicina 1976.

3./A „Belgyógyászat Alapvonalai 2” című könyv szerint, lásd Hyperkalaemia, szájon át 24 óra alatt bejuttatva, **8 gramm kálisó**, amiben **3,5 gramm a kálium**, egészséges ember **EKG-jét** is eltorzítja, rontva a szív működést. Lásd: Medicina, 1969.

4./ „Az intenzív betegellátás elmélete és gyakorlata” című tankönyv szerint, lásd Hyperkalaemia, a **24 óra alatt 280 mval**, azaz **11 gramm káliumnál több** akárhonnán, akárhogy vérbejutása veszélyes mérge, s **1 órán belül** a vérbe juttatva sokkal kevesebb is az, a **0,8 ill. 1,6 mval-nál**, azaz **0,8 gramm ill. 1,6 grammnál több kálium** is már veszélyesen mérgező lehet. Lásd: Medicina, 1977., 192. oldal.

5./ Megfelelő étkezési konyhasó pótlás mellett mellett a lehető legjobb ivóvíz a tiszta desztillált víz. Egy felnőtt kb. **12 gramm konyhasót** veszít naponta. Növényekkel nem tud ennyi nátriumot pótolni, csak konyhasóval. Lásd: Gimnázium Kémiakönyv III. osztály, Tankönyvkiadó 1990., 150. oldal.)

Vallási háttér:

Izraeliták tiszta desztillált víz esővizet isznak, mások szennyezett (Talmud, Taanith 10 a. lap). Az izraeliták egészségét és szaporodóképességét a desztillált tiszta ivóvíz és tiszta konyhasóval kellően sózott kenyér védi, ettől gyógyulnak, mások nem juthatnak hozzá. (Talmud, Baba kamma 93 b. lap). Lásd (A Talmud magyarul, Gede Testvérek RT., 2002, 62., 119. oldal.), és Tóra, 2 Mózes 23. 25-26.

Az állami tisztségviselők vagy nem is válaszolnak, vagy pimasz hazugságokkal érvelnek az ügyben. Ezekben az ügyekben miért nem csinálnak rendet a magyar lakosságot „terrorfenyegetéstől védők”? Alliance Israélite terv végrehajtás a magyarok helyének elfoglalására, lásd **HÍDFŐ Baráti Köre Országhódítók** c. kiadvány? (Fabó László, 22 Hancock Street, San Francisco, CA 94114, U.S.A.) Attól tartanak, hogy megharagudnak rájuk az interneten konyhasó pótlóként patkánymérge kálisó, „**Star kosher tanúsítványos Bonsalt**” reklámozói? Vagy az ilyeneket védő Izraeli Titkosszolgálat?

Verőce, 2017. 02. 15.

Tejfalussy András
oknyomozó mérnök feltaláló
www.tejfalussy.com

**Tüntetésre felhívó
terjeszthető röpirat!**



feladó: András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>

címzett: "hmugyfelszolgalat@hm.gov.hu" <hmugyfelszolgalat@hm.gov.hu>

dátum: 2017. Február 16. 16:14

tárgy: Dr. Bakondi György nemzetbiztonsági tanácsadó részére a mellékletben dokumentált terrorveszélyről közérdekű bejelentés, jogos védelemként és kárelhárító megbízás nélküli ügyvitelként

küldő: gmail.com

A fenti feljelentések kiegészítéseként az Európai Unió hazai Állampolgári Jogok Biztosához és a hazai Miniszterelnökhöz is címzett kárelhárítási intézkedés kérések:

A fenti feljelentést, az Európai Unió illetékes hatóságához továbbítására kérve, mint közérdekű bejelentést az Európai Unió magyarországi állampolgári jogok biztosának küldöm meg, aki előzőleg segített belebuktatni a nyirtassi sócsomagoló céget abba, hogy konyhasó helyett a patkányméreg kálisót csomagolták egészségvédő étkezési sóként. Egyúttal kérem a kálisó konyhasó helyett árusítását megengedő hazai **Élelmiszer Törvény** és **Magyar Szabvány** elleni eljárás megindítására. És a patkányméreg Star kosher tanúsítványos BONSALT kálisó egészségvédő étkezési sóként (lásd internet) ajánlásának és árusításának a betiltatására, és az árusítói és az árusítását megengedők elleni nemzetközi büntetőeljárás azonnali megindítására,

Az itt kiegészített feljelentést megküldöm **Orbán Viktor miniszterelnök** kezéhez is, miután megbízás nélküli ügyvitel keretében (lásd Ptk.) **több évtizede** végezzük helyette is, a Kormánya helyett is a kálisóval népiirtás kárai elhárítását, a kálisóval folytatott országos mérgezés konkrét megcáfolhatatlan hatásmérések alapján való leleplezését és károkozás betiltásának szorgalmazását. **Egyúttal felkérem, hogy ajánljon meg a helyette is végzett kárelhárításunk fontosságával arányos kárelhárítási díjat az általam képviselt szakértő csoport részére!**

Verőce, 2017. 02. 21.

Tisztelettel:

Tejfalussy András
oknyomozó mérnök feltaláló
www.tejfalussy.com



Utóirat:

Az USA elnökének, Trump úrnak mi a véleménye az USA lakossága elleni, nyíltan terjesztett népiirtási tervről, miután náluk is folytatják a népiirtó „Stop Só Programot”!

Amikor országgyűlési szakértőként 1991-ben kiderítettük a patkányméreg kálisó REDI SÓ gyógytápszerként árusítását engedélyezési csalásukat, az engedélyező OÉTI csalói a WHO mellékelt kiadványával védekeztek, amely szerint a gyermekétkeztetésben a konyhasó korlátlanul helyettesíthető kálisóval. Az Európai Unióban tiltják az élelmiszerekre annak ráírását, hogy a kálium túladagolás és túl kevés konyhasó veszélyes! Az USA-ban is ezzel irtják a népeket „Az igazság a mi fegyverünk” című, 1984-es Emissary Publications kiadványuk mellékelt szövege szerinti népesség csökkentő **illuminátus** terv keretében? Tilos nyomozni ezen ügyekben?

Joint FAO/WHO Food Standards Programme
CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION
CAC/VOL. IX 1:1d.1

CODEX ALIMENTARIUS
VOLUME IX

CODEX STANDARDS FOR
FOODS FOR SPECIAL DIETARY USES
INCLUDING
FOODS FOR INFANTS AND CHILDREN
AND
RELATED CODE OF HYGIENIC PRACTICE

FIRST EDITION



FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION
OF THE UNITED NATIONS
WORLD HEALTH ORGANIZATION
Rome, 1982



Témakód: WHO hamis kódex 82a

1.1.1 The addition of salt substitutes containing to Sub Section 3.2 to a special dietary food with low sodium content is permitted and shall be limited by

1.2. Salt substitutes as such

1.2.1 The composition of salt substitutes shall be as follows: **A WHO ITT SZERVEZI, FEDEZI AZ ANTIFIZIOLÓGIÁS "SÓCSERÉVEL BETEGÍTŐKET"**

- | | |
|--|--|
| (a) Potassium sulphate; potassium, calcium or ammonium salts of adipic, glutamic, carbonic, succinic, lactic, tartaric, citric, acetic, hydrochloric or orthophosphoric acids, and/or | Not limited, except that P not to exceed 4% m/m and NH ₄ 1% m/m of the salt substitute mixture |
| (b) Magnesium salts of adipic, glutamic, carbonic, citric, succinic, acetic, tartaric, lactic, hydrochloric or orthophosphoric acids, mixed with other Mg-free salt substitutes as listed in 3.2.1(a), 3.2.1(c) and 3.2.1(d), and/or | Mg ⁺⁺ to be not more than 20% m/m of the total of the cations K ⁺ , Ca ⁺⁺ and NH ₄ ⁺ present in the salt substitute mixture and P not to exceed 4% m/m of the salt substitute mixture |
| (c) Choline salts of acetic, carbonic, lactic, tartaric, citric or hydrochloric acids, mixed with other choline-free salt substitutes as listed in 3.2.1(a), 3.2.1(b) and 3.2.1(d), and/or | The choline content not to exceed 3% m/m of the salt substitute mixture |
| (d) Free adipic, glutamic, citric, lactic or malic acids | Not limited |

3.2.2 Salt substitutes may contain:

- | | |
|--|---|
| (a) Colloidal silica or calcium silicate | Not more than 1% m/m of the salt substitute mixture, individually or in combination |
| (b) Diluents: safe and suitable nutritive foods as normally consumed (e.g. sugars, cereal flour) | |

1.2.2 The addition of iodine-containing compounds to salt substitutes shall be in conformity with the national legislation of the country where the product is sold.

Joint FAO/WHO Food Standards Programme
CODEX ALIMENTARIUS VOLUME IX.
Codex Standards for Foods for Special Dietary Uses Including Foods for Infants and Children and Related Code of Hygienic Practice
WHO 1982. Rome

Témakód: WHO (Témakód: hamis kódex 82b)

Részletek az 1980-ban megjelent, „Az igazság a mi fegyverünk” című először 1980-ban megjelent könyvből, az Emissary Publications 1984 évi kiadása alapján. (Fordította: Bérczy Márton, Hunnia, 1992. június 25., 25, 37, 55. oldal.)

„AZ ILLUMINÁTUSOK RABSZOLGASÁGUNKAT TERVEZIK

A Római Klub egyik tagja, Howard Odum, 1980. augusztusában így nyilatkozott a Fusion magazinnak: „Az Egyesült Államoknak új és izgalmas vezetőszerkepe van a világban. A világot le fogjuk vezérelni alacsonyabb energiafelhasználási szintre. Az Egyesült Államoknak lakosságát a következő ötven év alatt kétharmaddal kell csökkentenie.” Az illuminátus Odum nem mondja el nekünk, hogyan fogják eliminálni hozzávetőlegesen 150 millió honfitársunkat, de abban nyugodtak lehetünk, hogy „szorgalmasan ügyködnek rajta”.

A Scientologia alapító L. Ron Hubbard „Tiszta test tiszta elme, a hatékony méregtelenítő program” c. könyve is felbíztat az izzadáskor elvesző konyhasó kálisóval pótlására! Lásd: Só- és káliumhiány, New-Era, Hubbard kiadvány, Hungarian Edition, 36-37. oldal. Ez is nemzetközi összeesküvés bizonyítéka.

Kód: K170221-Trump

Tisztelt Elnök Úr!

Önnek Trump elnök úr mi a véleménye az USA lakossága elleni, nyíltan terjesztett népiértési tervről? Azért is érdekel, mert náluk USA példára is hivatkozva folytatják a népiértési „Stop Só Programot”!

Amikor országgyűlési szakértőként 1991-ben kiderítettük a patkányméreg kálsó REDI SÓ gyógytápszerként árusítását engedélyezési csalásukat, az engedélyező OÉTI csalogi a WHO mellékelt kiadványával védekeztek, amely szerint a gyermekétkeztetésben a konyhasó korlátlanul helyettesíthető kálsóval. Az Európai Unióban tiltják az élelmiszerekre annak ráírását, hogy a kálium túladagolás és túl kevés konyhasó veszélyes! Az USA-ban is ezzel irtják a népeket „Az igazság a mi fegyverünk” című, 1984-es Emissary Publications kiadványuk mellékelt szövege szerinti népesség csökkentő illuminátus terv keretében? Tilos nyomozni ezen ügyekben?

A hatás-mérési stb. bizonyítékokat lásd a honlapomon: www.tejfalussy.com (Videók, Email-könyvek, MEHNAM, On-line mérnökképzés).

Budapest, 2017. 02. 21.

Munkájához sok sikert kívánva, várva válaszát, tisztelettel:

Dipl. Ing. Inventor A. Tejfalussy

