


Tudatos népiirtás gyomor- és bélflat kisebesítő, felmaró Kálium Retard tablettával „kálium pótlás” és a mérgező kálisóval „sózás” is. (A Magyar Orvosi Kamarához intézett korábbi közérdekű bejelentések kiegészítése). Nem tudományos publikációknak, hanem konkrét klinikai hatás méréseknek kell hinni!

Hamis „tudományos publikációk”, amelyekkel az Interneten a KÁLIUM RETARD tablettát ajánlják:



Nagyjából 756 találat (0,51 másodperc)

KÁLIUM-R tableta - HáziPatika.com

<https://www.hazipatika.com> > Gyógyszerkereső > Tápcsatorna és anyagcsere ▼
MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A KÁLIUM-R TABLETTA ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ? A készítmény alkalmazható alacsony vér ... Leírás: **Retard tableta**: fehér színű, márványos, szagtalan, kerek, mindkét oldalán domború felületű tableta. Törési felülete fehér színű. Csomagolás: 30 db vagy 50 ...

KALDYUM 600 mg retard kemény kapszula - HáziPatika.com

<https://www.hazipatika.com> > Gyógyszerkereső > Tápcsatorna és anyagcsere ▼
Milyen típusú **gyógyszer** a Kaldyum 600 mg **retard** kemény **kapszula** és milyen betegségek esetén alkalmazható? A készítmény hatóanyaga a **kálium-klorid**, az a.

Orális káliumpótlás a háziorvosi gyakorlatban - Dr.Barna István

drbarnaistvan.hu/kalium-oralis-kaliumpotlas-a-haziorvosi-gyakorlatban/ ▼
2015. ápr. 7. - Különösen a relatíve gyors hatóanyag-leadású **kálium** tabletták okozhatnak gyakran nemkívánatos mellékhatást. A szövődmények kockázata a per os, módosított hatóanyag-leadású (**retard**) **gyógyszer**-formulációk alkalmazásával csökkenthető, amely megelőzi a magas helyi sókoncentrációk kialakulását.

Képtalálatok - Kálium Retard tableta előnyei



→ További képek a következő kifejezésre: Kálium Retard tableta előnyei Sértő képek bejelentése

KÁLIUM-R tableta | Egészségkalauz

www.egeszsegkalauz.hu/termek/k-lium-r-tabletta-874.html ▼
KÁLIUM-R tableta 30x. Kiszárazás: 30x. Törzskönyvi szám: OGYI-T-3580/01. Rendelhetőség: csak vényre kapható. 2468. Fogyasztói ár: 711 Ft. TB támogatás. Normatív támogatás: 178 Ft NOMIN 25%. Térítési díj: 533 Ft ...
Hiányzó: előnyei

Az engedélyezési kísérletek eredményeit összefoglaló klinikai jelentés szerint kb. minden 10. tableta kitapadt. A kitapadás helyén, a kis területen kiszivárgó kálium sebesre marja a gyomor vagy bélflat. A sebből fekély és rákos daganat is lehet. A tartósabb vérplazma kálium növeléshez 8-10 tablettával is megetethetnek. Ennyitől a 6-ból 5 embernek fáj a gyomra. Egyikük gyomorfala láthatóan bevérzett.

Egy másik engedélyezési kísérlet során a kálisó „Redi Só” fél liter vízben feloldott 2 grammja 10-ből 10 személynél 50%-osra csökkentette a vizeletkiválasztást, a kétszerese pedig mind a 10-üknél kálium-mérgezést (hyperkalaemiát) okozott, a vérszermuk káliumszintjének az 5 mmol/liter fölé növelésével.



MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
ELNÖKI TITKÁRSÁG

1051 BUDAPEST, ROOSEVELT TÉR 9.
TELEFON: 332-7176 FAX: 332-3043

Budapest, 1998. május 14.
E-285/98.

E

Balázs


Dr. Baraczka Pál Főigazgató úrnak
Igazságügyi Orvosszakértői Intézet
Budapest
Gyorskocsi u. 25.
1027

Tisztelt Főigazgató Úr!

Tejfalussy András úr kezdeményezésére 1998. április 1-jén megbeszélést hívtam össze a káliumleadási határértékekre rendelkezésre álló hivatalos mérési adatok és az ezen alapuló kálisó tabletták alkalmazásával járó kockázatok megvitatására. Az eszmecsere — véleményem szerint — fontos megfigyelésekre derült fény.

Mellékelten küldöm a megbeszélésről készült emlékeztetőt, szíves figyelmébe ajánlva az abban foglaltakat.

Tisztelettel:


Pannonhalmi Kálmán

EMLEKEZTETÉS a káliumleadással kapcsolatos (államigazgatási mérési adatok MTA-nál való közös megtekintésén alapuló) tanácskozásról .

Résztvevők:

- Dr. Karádi István methabil, egyetemi docens, a Kút-Ölgyi Klinikai Tömb igazgatója, SOTE III. sz. Belklinika;
- Dr. Nagy Elemér akadémikus, fizika professzor;
- Dr. Pannonhalmi Kálmán, az MTA Elnöki Titkárság vezetője;
- Tejfalussy András okl. mérnök, az AGROANALIZIS TUDOMÁNYOS TARSASAG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja SMK elnöke;
- Varjas András okl. fizikus, a GRADIENS INNOVACIÓS LABOR Tudományos Szolgáltató SMK igazgatója.

1. Az államigazgatás által elvéggeztetett , ad.4111/84. DéTI számú mérések adatai a következő egyszerű kálium-hatásokat mutatják :

A szájon át bevitt 0,88 gramm oldott kálió egészséges felnőtt ember esetén a bevitel utáni 1-4 órában, jól láthatóan a felére csökkentette a vesék vizelet-kiválasztását. Emiatt az ivott 500 milliliter víznek (a kálió ebben volt feloldva) kb. a fele , a klinikai kísérletnél az emberek szervezetében maradt.

A szájon át ugyanennyi vízzel bevitt 1,76 gramm oldott kálium még fokozottabb mértékben korlátozta a veseműködést. Láthatóan, emiatt nőtt meg kb. 3/4 óra múltán és kb. 1 teljes órában tartóan a vérérum-kálium-koncentráció az 5 mmol/liter (hyperkalaemiát okozó) szint fölé . A mérési adatok ezt mind a 10 felnőtt egészséges emberről igazolták. A mérési ismétlések közötti egyéni eltérések (jól láthatóan) sokkal kisebbek a mért kálium-hatásoknál.

2. Az államigazgatás által elvéggeztetett (a Pécsi Orvostudományi Egyetem Belgyógyászati Klinikán 1983. nov. 1-án aláírt hivatalos jelentés összefoglaló értékelése szerinti) mérés adatai a következőt mutatják:

A szájon át bevitt tablettázott kálió (a gyomor-bélrendszerben kb. 8 óra alatt oldódó, káliumchlorátum hatóanyagú) tablettái kb. 0,32 gramm káliumot tartalmaztak. A 8 vagy több db. tablettától 6-ból 5 embernek fájt a gyomra és egyikük gyomrának nyálkahártyáján "akut gyomornyálkahártya erózió" keletkezett . Krónikus kezelés során 40 beteg közül 5 jelzett gyomorfájást . Valószínűsítették , hogy a gyomorfájdalom fellepte összefüggésben van az egyszerre alkalmazott dózis nagyságával . A radiológiai vizsgálatok során megállapították , hogy a tabletták útját általában 12 órában tudták követni a gyomor-bél rendszerben és ezalatt 4 esetben néhány óráig "kitapadtak" a tabletták a gyomor-bélrendszerben.

A kétféle mérés adatainak összevetéséből, mérlegelés nélkül is, megállapíthatók a következők:

a./ oldatban , szájon át egy adagban bevitt 0,88-1,76 gramm káliumnál vagy többnél , veseműködés korlátozással és emiatti hyperkalaemizálódással kell számolni .

b./ Ha a lassabban oldódó anyag (KALIUM-R tabletták) vitte be szájon át a káliumot , a tabletták felületén jelentkező koncent-

Jel: Bal.ICI
ICI ikt.szám:

Balékeztető

A kálium leadó ételek és italok után a fogvasztókba bekerülő mérgező kálium-koncentráció határértékezésének ellenőrzéséről, a Magyar Tudományos Akadémia Elnöki Titkárságáról, E-285/1998. ikt.szám alatt, az Igazságügyi Orvosszakértői Intézet vezetője részére megküldött mérési megállapítások alapján tartott vélemény-cseréről.

1. A megbeszélésre előre egyeztetett időpontban, 1998. szeptember 7-én, 11 órakor került sor, az Igazságügyi Orvosszakértői Intézetben, annak vezetője, dr. Baraczka Balázs igazgató, és az E-285/1998. ikt.számú irathoz tartozó tanácskozási balékeztetőt /Bal.mta, 1998.IV.1./ aláíró egyik szakértő, Tejfalussy András, az AGROANALIZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja gk elnöke között.
2. Résztvevők egyetértének abban, hogy az MTA-tól megküldött E-285/1998. ikt.számú irat mellékletében leírt mérések alapján szükséges a javasolt kálium-leadó ellenőrzés, mivel a jelenleg optimálisnak vélt napi 2-8 gramm /átlagosan: 3,5 gramm/ káliumleadás mellett nincs meg a mérgezési veszély kontrollálásának a lehetősége.
3. Résztvevők abban is megállapodnak, hogy a kálium-leadó határértékezéséhez először figyelembe venni az Országos Mérésügyi Hivatal főosztályvezetői szintű, a határértékezés alapkövetelményeit rögzítő állásfoglalását, a 4783/94. Országos Mérésügyi Hivatali ikt.számú, 1994. október 4-i iratban, és ehhez tartozó, abban hivatkozott, az 1994. szeptember 29-én, az Országos Mérésügyi Hivatalnál tartott megbeszélést rögzítő, OMHkál4.cél jelű Balékeztetőben leírtakat.
4. Tejfalussy András átadja, dr. Baraczka Balázs átveszi a 3. pontban hivatkozott 4784/94. ikt.számú iratot, valamint az OMHkál4.cél jelű Balékeztetőt.
5. Tejfalussy András tájékoztatást ad arról, hogy szeretne pénzügyi háttérrel teremteni, de ehhez tudnia kell, hogy ki kérheti fel az Igazságügyi Orvosszakértői Intézetet. Dr. Baraczka Balázs tájékoztatja, hogy "Bárki" i.d. orvosszakértői véleményt kérhet az adott ügyben /lásd fent/, mint "magánfél".
6. Tejfalussy András vállalja, hogy jelen irat alapján tájékoztatja a Magyar Tudományos Akadémia Elnöki Titkárságának vezetőjét, dr. Pannenhalmi Kálmán urat ezen megoldási lehetőségről.

.....
Tejfalussy András/



.....
/dr. Baraczka Balázs /

EMLÉKEZTETŐ

a BME Műszer- és Méréstechnika Tanszéken 1994. november 21.-én tartott méréstani egyeztető megbeszélésről.

Tárgya: az Egészségügyi Tudományos Tanács Igazságügyi Bizottsága 1994. március 2.-ai, I-908/1993 hivatkozási szám alatti 10-175/ETT/IB/1993. iktatási számú szakvéleményének kiértékelése méréstani szempontból.

Jelen vannak: Tejfalussy András, az AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja gmk elnöke
dr. Péceli Gábor egyetemi tanár, a BME Műszer- és Méréstechnika Tanszék vezetője

I.

Előzmények: Jelenlévők a Méréstügyi Törvény módosítására vonatkozó javaslataik kidolgozása során példaként hozták fel a kálium-használati ellenőrzési határértékek ellentmondásait, és ennek alapján a Parlament több ponton módosításokat szavazott meg.

A szakvéleményt, valamint annak hivatkozásait áttekintve megállapíthatók a következő szakértői önellentmondások:

1. Az ún. REDI só, amely kálium klorid (55%), és kálium citrát (43%) kompozíció, a szakvélemény szerint grammonként 1,443 gramm káliumot tartalmaz. Ez lehetetlen, mert a só tömege nem lehet kevesebb, mint egyik komponenséé.
2. A szakvélemény a kálium közismert magasvérnyomás csökkentő hatására hivatkozik. Elemezve a Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézetben elvégzett mérésekről szóló, az OÉTI-nek készült jelentést, amelyre a Dr. Kovács Pál és Pap János interpellációjára a Parlamentben elhangzott 8253. számú miniszteri válasz is hivatkozott, a következőket állapítjuk meg:

A kísérletet végző orvosok megállapítása szerint a kálium etetésnek semmiféle mérhető vérnyomáscsökkentő hatása nem volt, de nem is volt várható. A jelentés 12. ábráján bemutatott, REDI só etetés előtti, ill. utáni vérnyomás értékek különbsége (a vérnyomás csökkenése) a hagyományos vérnyomáscsökkentő gyógyszerek egyidejű alkalmazására vezethető vissza.

3. Az, hogy csak az egyszerre bevitt 18 gramm káliumnak lehet mérgező hatása ellentmond a szakvéleményben idézett Magyar-Petrányi belgyógyászati tankönyv azon állításának, hogy nem csak a 18 gramm egyszerre bevitt kálium (40,6 gramm REDI só) okozhat hyperkalémiát, hanem 24 óra alatt, a szájon át beadagolt, (napi) 5-8 gramm szedése is. A T-hullám magasodik egészséges emberen is, különösképpen azonban myxoedemában és familiaris periódusos paralysis esetében. A hyperkalémia fokozódására az R-lengés

alacsonyodik, a QRS kiszélesedik és a pitvarok megállnak, ill. idegrendszeri tünetek is támadnak. Vagyis ha gyors, pl. egy óra alatt történt kálium felszívódást értünk "egyszerre, hirtelen bevitt káliumon", ilyen esetben már a szív pitvarai megállhatnak (halál).


4. A 10-175/ETT/IB/1993. szakvélemény elfogadja, hogy **0,88 gramm/óra az egészségügyi határértéknek tekintendő kálium-dózis**, és egyben megjegyzi, hogy a Varga P. és tsi szakirodalom megadott 0,8 gramm/óra (20 mval) toxikus kálium határérték az intravénás káliumbevitelre vonatkozik. Mindezeket összevetve azzal, hogy a kálium-felszívódási ráta 0,9, a korrigált határérték **0,88 gramm/óra**.
5. A Varga P. és munkatársai által közölt mérések szerint a napi dózis, mely már veszélyes hyperkalémiát okozhat, intravénás infúzió esetén 11 gramm (280 mval). Ennek szájon át bevitelre korrigált értéke nagyobb, de még ez sem 18 gramm, hanem csupán 12,22 gramm/24 óra. Ebből az a következtetés vonható le, hogy egymás utáni káliumbevitelnél nem 0,88 gramm/óra a toxikus kálium dózis határértéke, hanem 0,51 gramm/óra.
6. Mivel a kálium toxikus dózis az összes kálium bevitellel, és nem egyenként, az egyes komponensekkel bevitt káliummal kapcsolatos, az élelmiszerek káliumtartalmát összegezve kell a bevihető (együtt ehető és iható) élelmiszerek mennyiségét a kálium szempontjából korlátozni.

A fenti határértékek egészséges, felnőtt (70 kg-os) személyekre vonatkoznak, ezért fel kell hívni a lakosság figyelmét arra, hogy kisebb súlyú személyek (és betegek!) esetében kevesebb kálium is toxikus lehet!

II.

A jelen emlékeztetőt a megfelelő kálium-korlátozó egészségügyi, és tisztiorvosi intézkedések megtételéhez Tejfalussy András megküldi az időközben népjóléti miniszterre választott Dr. Kovács Pál úr szakértőjének, Dr. Szentgyörgyi Istvának az előzményiratokkal, ill. a hivatkozott dokumentumokkal, az Országos Mérésügyi Hivatallal felvett emlékeztetővel, és annak kiegészítésével.

k.m.f.



(Dr. Péceli Gábor)
egyetemi tanár




(Tejfalussy András)
elnök

Felkérjük Dr. Éger István urat, a Magyar Orvosi Kamara elnökét, hogy azért, mert esetleg az 1%-a a magyaroknak (pl. a jelenleg akármilyen gyors ütemben, naponta legalább 4,7 gramm káliumbevitelre kényszerítő Nemzeti Astop Só Program, Menzareform eredményeként állandósult kálium túladagolás miatt kialakult káliumvesztő veséjük következtében) hypokalaemiás, ne beszéljék rá a magyarokat a konyhasó helyett kálisóval sózásra és nagy %-ban a gyomor- és bélfalmaró Kálium Retard tablettára!

Ehhez esetleg az is elegendő lenne, ha a Kamara közzétette a klinikai mérési eredmény értékeléseket.

Budapest, 2018. március 14.

Tejfalussy András okl. vill. mérnök, számos nemzetköz méréstudományi szabadalom szerzője, mint az ügyet minisztériumi, országgyűlési és önkormányzati megbízásból is kivizsgáló méréstudományi szakértő.



Melléklet: Az előző közérdekű bejelentés: NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS AZ ORVOSI KAMARÁHOZ (Kód:MOK180223)

feladó: **András Tejfalussy** <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címezett: Éger István MOK-elnök <mok@mok.hu>
Twitter <info@twitter.com>;
"Dr. Horváth István" <drhorist@freemail.hu>;
"Dr. Marosi Pál gyermekgyógyász főorvos" <drmarosip@gmail.com>;
János Horkovics-Kováts <janoshorkovicskovats@gmail.com>;
Balog Zoltán <zoltan.balog@parlament.hu>;
"P. Kozma Imre OH" <kozma.imre@irgalmass.hu>;
MVSZ Patrubiányi Miklós <elnok@mvsz.hu>;
Nemzeti Hírhaló <hirhalo@nemzetihirhalo.hu>;
Bene Gábor <drbenegabor@gmail.com>;
másolatot: info <info@atv.hu>;
kap: info@hirtv.net;
JOBBIK <info@jobbik.hu>;
Ügyelet ORFK <ugyelet.orfk@ork.police.hu>;
Balog Béla <apokrif@vipmail.hu>;
"Prof. Dr. Papp Lajos" <szivvel.lelekkel.pl@gmail.com>;
"Dr. Eva Maria Barki" <barki@lawvie.at>;
pannonhalmi@invitel.hu;
ferenc.kalmar@mfa.gov.hu;
miniszterelnok <miniszterelnok@me.gov.hu>
 dátum: 2018. március 14. 14:21
Tisztelt Magyar Orvosi Kamara, Dr. Éger István elnök úr! (Nyílt levél) Kód: MOK-180314: Tudatos népiptás
a káliumot a gyomor- és bélal szétmaró Kálium Retard tablettával és/vagy kálisóval szózással „kálium
tárgy: pótoltatás” (a Magyar Orvosi Kamarához intézett korábbi közérdekű bejelentések kiegészítése). Nem
tudományos publikációknak, hanem konkrét klinikai hatás méréseknek kell hinni!
küldő: gmail.com

feladó: info <info@atv.hu>
címezett: András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
 dátum: 2018. március 14. 14:21
Automatikus válasz: Tisztelt Magyar Orvosi Kamara, Dr. Éger István elnök úr! (Nyílt levél) Kód: MOK-
 tárgy: 180314: Tudatos népiptás a káliumot a gyomor- és bélal szétmaró Kálium Retard tablettával és/vagy
kálisóval szózással „kálium pótoltatás” (a Magyar Orvo...
küldő: mail.atv.hu
biztonság: ☐ Normál titkosítás (TLS) [További információ](#)
.:A Google órakuluma szerint fontos.

Tisztelt Levélíró!

Az ATV Ügyfélszolgálatára küldött levele megérkezett.

A lehető legrövidebb idő alatt megkezdjük az e-mail feldolgozását
és amennyiben szükséges, az illetékeseknek történő továbbítását.

ATV Ügyfélszolgálat