

ESÉLYTELEN A MAGYAROK MEGMARADÁSA A NEMZETI STOP SÓ PROGRAM MIATT

Nem hidd el, hogy az infúziók alapját képező tiszta desztillált víz életveszélyesen mérgez. A zsidók legjobb ivóvíze a tiszta esővíz, a tiszta desztillált víz (lásd Talmud, Taanith 10 a. lap), ami megfelelő sózás mellett általános gyógyító hatású (lásd Talmud, baba kamma 93 b. lap). Ráfogták a csökkentett konyhasóptlással okozott elektrolit zavart a tiszta vízre (a figyelmünk eltereléséhez)!

A Népszabadság mellékelt cikke (lásd melléklet-1) jellemző példa arra, hogy egyszer-egyszer meg lehet írni az igazságot is, ha azt előtte és utána is folyamatosan szembehazudják. A cikk világosan dokumentálja, hogy csak a megkérdezett emberek egyhateda mondta, hogy csökkent a vérnyomása a konyhasóval sózás, vagyis a nátriumpótlás csökkentése óta. A többieknek, az öthatoduknak, a konyhasó pótlás csökkentéstől nőtt vagy nem változott a vérnyomása. Egyhatoduknál a statisztikai felmérés során regisztrált vérnyomás csökkenés egyidejű, egyéb hatások következménye is lehetett! Mérési bizonytalanság szintű a vérnyomás csökkentési százalék, amit a konyhasóptlás csökkentése eredményeként ígérnek. Mérd meg egymás után néhányszor a vérnyomásod és látni fogod, így van!

Tudd, hogy 1950-ben Nobel díjjal jutalmaztak 3 kutatót, akik patkányoknál és embereknél is, hatás mérésekkel bebizonyították, hogy az ételekkel, italokkal nátrium pótlás csökkentése és a kálium pótlás növelése is vérbesűrítő, magas vérnyomás előidéző, vese- és szívmérgező, idegműködés és izomműködés tönkretévő, nemi jelleg eltorzító, ivartalanító, vagyis fajirtó hatású (lásd melléklet-2)!

Az egészséges ember testnedveiben 110-szer több a víz mint a konyhasó (nátrium-klorid) és 30-szor több a nátrium mint a kálium. Ebben az arányban pótolják a Ringer oldatnak nevezett infúzióval, és korábban az étkezéssel is ilyen arányra törekedve pótoltuk. Az emberek étkezéssel is, több ezer év óta, ugyanígy, napi 3 liter vízzel 27 gramm konyhasót és 0,36 gramm káliumot igyekeztek pótolni, (lásd melléklet-3 és melléklet-4)! Már 1-2 gramm kálium egy óra alatt vérbejutása is szívmérgező!!!

Az a kérdés, hogy lehet-e annyira ostoba egy ember, hogy elhiszi az emberi testben működő vízből, nátriumból és kloridból és káliumból összetett elektrolitról, hogy az egészséges ember testében lévő optimálishoz képest, az infúzióval vagy szájon át bejuttatott víz és konyhasó arányának ötszörösre, és a kálium: nátrium arányának a tízszeresre növelése is egészség javító hatású, vagy csak úgy tesz mintha elhinné azért, hogy a többiek azt hihessék ő elhiszi, s önmagukat mérgezzék, kipusztuljanak!


Ehhez képest kb. 1950 óta arra hivatkozva, hogy majd „csökkenti a magas vérnyomásos betegek arányát”, felbiztatnak minket, hogy naponta 5 grammnál kevesebb konyhasót és 4,7 grammnál több káliumot pótoljuk, akármennyi víz mellé, akármilyen gyorsan. A gyorsabb kálium bejuttatás sokkal mérgezőbb! Előírták a vérelektrolit víz : konyhasó arányától és nátrium : kálium arányától több ezer százalékkal (!) eltérő dózisarányokat. Lásd az interneten a „Nemzeti Stop só Program”-jukat!

Egyedüli védekezési módszer a tiszta sóval helyesen sózás és ivóvíz desztillálás (lásd melléklet-5)!

Létezik egy 100 éves terv a magyarok kipusztításra és a helyünkre betelepülésre (lásd melléklet-6)!

Verőce, 2016. december 30.

Tejfalussy András
oknyomozó mérnök feltalálói
www.tejfalussy.com



A „komisz” só

A fiziológiai napisószükséglet valójában 15–25 gramm, lásd a fiziológia (pl. Salsola vagy Ringer) infúziós oldatokkal beadagolt napi konyhasó mennyiségét!

A magas vérnyomás megelőzésére sószegény étrendet ajánlanak. Elegendő lenne napi 0,5-1 gramm só, ennek azonban többszörösét fogyasztjuk. Pedig a só sokáig gyógyszernek számított. Vér-szegénység, erőtlenség, fejfájás és migrén orvoslására szolgált. Sós vizet adtak a légutak megbetegedésekor, emésztési panaszok, reuma-fájdalmak esetén. Gyerekkorunkból emlékezhetünk a forró sóval töltött zacskóra, amit a fülünkre tettek.

De mitől lett „komisz” a só? Az első tanulmányt Lewis Dahl írta, melyben kimutatta, hogy a patkányok vérnyomása emelkedik, ha erősen sózott eledelt kapnak. A kísérlethez használt só azonban annyi volt, hogy egy embernek naponta fél ki-

lót kellene ennie, hogy ugyanakkora dózist vegyen magához. Egy másik kísérletben a világ minden részéről vizsgáltak emberek, az adatok feldolgozása meg-lepő eredményt hozott. A vérnyomás csökken, ha növekszik a sóbevitel. A leg-több sót fogyasztó népcsoportnak (napí 14 gramm) nem volt magasabb vérnyo-mása, mint azoknak, akik csak 6 gram-mot ettek. Négy csoport viszont teljes-en kilógott a sorból: jóformán nem ettek sót, és a magas vérnyomást is alig ismer-ték. Amikor az ő értékeiket is hozzáad-ták a többiekéhez, csak akkor kapták meg az elvárt értéket. A tudósok-nak több rendellenesség is feltűnt, ezért kérték az eredeti adatokat, de hiá-ba. Ehelyett a szerzők új-ra feldolgozták azokat, új-módszerekkel. Az eredmény:

a só hatása a vérnyomásra negatí-vabb, mint gondolták valaha. Egy német kritikus „adatmasszírozásnak” hívja ezt a módszert.

Rehabilitálják-e valaha vajon a sót? Az amerikai Science szaklap nemrég szem-rehányásokat tett a só elleni kampány



Amerikában is leplezték, hogy nem ún. „összeesküvés-elmélet” az élelmiszerek eltorzított számványával életrövidítés, hanem tudományos (kalibrálási mérési) csalásokkal is felderített tudatos nepirtás! (Mózes II. 23. 20–33. és V. 7. 2. 22. szerinti nemzsidólanítás!)

aktivistáinak. De a lapok tovább publi-kálják a sófogyasztás és vérnyomás kö-zötti összefüggés credenciáit. Más ta-nulmányok is megmutatták, hogy a só-szegény étrend nem csökkenti a vérnyo-mást. Azt is kimutatták, hogy a sóbevi-tel korlátozása növeli az elhalálozást, és elősegíti a szív- és keringési betegségeket. A vitát a jövő dönti el. Az viszont biztos, hogy a só mellőzése megemeli a kolesz-terinszintet, de változatlanul koleszterin-csökkentő és sószegény táplálkozásra in-tenek minket. Ember legyen a talpán, aki felismeri, hogy épp mi problémájá-nak okozója. Milyen tanácsot adha-tunk a magas vérnyomásban

szenvedőknek? Német or-vosok szerint a népesség kétharmadánál a vérnyo-más nem reagál a sóra. A ma-radék harmad egyik felénél emelt sófogyasztásnál csökken a vérnyomás, a másik felénél emelkedik. Akinek magas a vérnyomása, próbálja ki kevesebb sóval, hogy ő melyik csoport-hoz tartozik. Egyszóval, ne hagyjunk magunknak egyszerűen csak odaszólni.

Jelinek Mária

CSIPETNYI TRÜKK

A só tartósító hatása a vízfelvétel tu-lajdonságában rejlik. Észak Európa számos vidékén bevett eljárás volt az ósszel tömegesen vágott marha rendszeres sózása. Nálunk a sertés-húsdarabokat a szalonnával együtt sózták, füstölték.

A só megnöveli a víz forrási hő-mérsékletét, a víz jobban felmeleg-szik, mielőtt formi kezdene. Ezért a sós vízben az élelmiszer (a tojás vagy a tészta) magasabb hőmérsékletre melegszik fel, és gyorsabban főhet.

Egy csipet sóval könnyebb felverni a tojásfehérjét. Az avas vaj ismét használható, ha kevés langyos tejjel és egy csipet sóval keverjük el. A ve-lő nem esik ki a csontból, ha főzés előtt mindkét végét besózzuk. A máj nem keményedik meg főzés közben, ha a még nyersen összevágott szele-teket besózzuk, majd fél órára a hű-tőszekrénybe tesszük. Nem lesz cso-mós a rántás, ha csipetnyi sót te-szünk bele. Egy késhegynyi só tisztít-ja a leégett lábast, eltünteti a zsír ful-tot és a vörösbőr pecsétjét, kezünk-ről a hagyma és a hal szagát. Sós ví-zel friss sörpecsétet, vizes sóval cso-koládéfoltot távolíthatunk el.

A konyhasó nem egyéb, mint ten-gervérzből nyert nátrium-klorid vagy bányászott kősó. A zöld só: zöldpet-rezselvény, zeller zöldje, saláta, les-tyán, csalán, pitypang, útifülevél megszártva, porrá törve, kevés sóval elkeverve. A jódozott sós pajzsmi-rigybetegek esetén használjuk.

A konyhasó, a tengeri só, az asz-tali só és egyéb elnevezésekkel for-galomban lévő sók káliumtartalma sokszor nagyobb a kívánatosnál. A túlzott káliumbevitel pedig felborít-hatja a szervezet ionegyensúlyát, csökkenti a veseműködést, vissza-tartja a folyadékot, ezáltal méregre-lenítési problémákat okozhat. Meg-zavarja az idegrendszer és a szív mű-ködését, ritmuszavart kelt.

J. N. J.

Kapja: A Nemzeti Nyomozó Iroda (fax: 443-5573, 426-9278)

Feljelentem a fent leírt életrövidítő, vagyis NÉPIRTÓ sóhasználati és kalibrálási csalást!

A bizonyítékokat lásd az interneten, a www.AQUANET.fw.hu honlapon.

Budapest, 2006. jan. 13. Tejfalussy András (1036 Bp., Lajos u. 115.)

NOBEL-DÍJAS KUTATÓK MÉRÉSEI IS BIZONYÍTJÁK, HOGY SZÁMOS BETEGSÉG NAGYSÁGRENDI MEGSZAPORODÁSÁNAK A HAGYOMÁNYOS („FIZIOLÓGIÁS”) SÓZÁSSAL ELLENTÉTES ELVEKRE ALAPOZÓ „ÉTKEZÉSI SÓREFORM” A FŐ OKA

A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában, „A biológia aktuális problémái” főcím alatt található „A mellékvesekéreg biológiája” c. fejezet. Aki írta, az akadémiai nívódíjas Dr. Szabó Dezső azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek alapján Kendall, Reichstein és Hench 1950-ben Nobel-díjban részesültek „a mellékvesekéreg-hormonok és szerkezetük és biológiai hatásuk” felfedezéséért. Az összefoglalás jellegű leírás emellett további 61 tudományos publikáció mérési eredményeire is hivatkozik. (Az alábbiakban zárójelben jelzem, hogy a könyvből itt idézett megállapítások a könyv mely oldalain találhatók.)

EZEK A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK EGYBEHANGZÓAN BIZONYÍTJÁK AZT, HOGY A NÁTRIUMHIÁNYOS ÉS KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT EMBEREK ÉS PATKÁNYOK MELLÉKVESEKÉREG HORMONTERMELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A TUDOMÁNYOS KUTATÓK VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEKKEL RENDELKEZNEK (134), AMELYEK SZERINT A NÁTRIUMHIÁNYOS VAGY KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT ÁLLATOKON (PATKÁNYOKON) ÉS EMBEREKEN IS MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK BE, MIKÖZBEN A SZERVEZET ELETROLIT-HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)

Ezek későbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrövidítő, ivartalanító stb. hatások például konkrétan a következők:

- 1./ A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik (140)
- 2./ A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás alakul ki. (167)
- 3./ A különböző stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)
- 4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsősorban a vesesejteknel, de a verejtékszejteknel és az emésztőrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez ha hosszabb ideig tart, törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet:
- 5./ Idővel nátrium-hiány jön létre (168)
- 6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)
- 7./ Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168)
- 8./ Romlik a keringés. (168)
- 9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szűrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)
- 10./ Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168)
- 11./ A bőr és a nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)

12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)

7/4.

13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)

14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)

A káliumtúladagolás és vagy hiányos nátriumpótlás legvalószínűbb betegségei

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)

20./ A vérbesűrűsödés miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést, renintermelő vese-daganatok jönnek létre. (169)

A nátriumhiányos és/vagy kálium-dús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait is okozza („pszeudohermafroditizmus”):

21./ Leánymagzatok nemi szerveinek a fejlődési zavarait, pl. szeméremajkak összenövését, klitoris-megnagyobbodást. (169-170)

22./ Lánygyermeknél klitoris-megnagyobbodást, idő előtti menstruációt. (170)

23./ Felnőtt nőknél: klitoris-megnagyobbodás, test- és arcszőrösödés, kopaszodás, érdes hang, a menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)

24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erőteljes izomzat kifejlődést, a testnövekedés gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszőrzet idő előtti megjelenését, korai szakáll-növekedést, hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)

25./ Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermeknél és férfiaknál emlő-megnagyobbodást okoz. (170)

26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztaták) növekedését serkenti. (170)

Közismert, hogy egyesek ezeket a betegségeket mindenféle más okra vezetik vissza, miközben ezt a két legfőbb okot részint elhallgatják, részint ellenkező hatásúnak tüntetik fel. Az élettani optimum szerinti (fiziológiás mértékű) sópótlást, a vér elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelő étkezést „elavultnak” hazudják, pedig a fiziológiás sópótlás helyességét nem csak a tengervíz, a magzatvíz és a vér és a fiziológiás infúziós Ringer oldat azonos nátrium és kálium aránya igazolja, de az is, hogy kálium túlfogyasztás esetén torzul az EKG = romlik a szív működés! (A könyvről általam készített fotókat, s a többi, fent említett mérési és tankönyvi dokumentumot is le lehet hívni, ki lehet nyomtatni az internetről, amihez a Google keresőbe a „mellékvesekéreg” szót kell beírni, ill. lásd: a www.aquanet.fw.hu honlapon.)

Verőce, 2008. június 30.

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, 2621 Verőce, Lugosi u. 71.

Desztillált vízben oldva az alábbi konyhasó és kálium mennyiség van az infúziós Ringer oldatban:

A Ringer-oldat, melynek összetétele a szívteljesítménynek legjobban megfelel:
0,9% NaCl,
0,03% KCl,
0,025% CaCl₂ és
0,02% NaHCO₃-ból áll.

AZ INFÚZÓS RINGER-OLDAT ALKOTÓELEMEI
Dr. Kiszely György és dr. Hársing László: Gyógyszerész továbbképzés Biológiai és élettan alapismeretek, 90. oldal. Medicina, 1958.
Iratkód: Ringer-oldat

Melléklet-5.

NYILATKOZAT

A Ringer oldat a testnedvekhez hasonló ionösszetételű folyadék. A Ringer oldat (0,9 % NaCl, 0,03% KCl, 0,025 % CaCl₂, 0,02 % NaHCO₃, 99 % desztillált víz) szerinti nátrium, kálium, klór és víz pótlási arány megfelelő kóros veszteségek esetén, de ugyancsak optimális a napi étkezések során is.

Budapest 2010. január 6.


Dr. Papp Lajos
ny.egyetemi tanár
akadémiai doktor

Lásd: [Papp Lajos beszél a káliummal mérgezett sóról](#)

<https://www.youtube.com/watch?v=TvDYzBr0l4M>

2013. NOV 18



FIGYELEM!

Képtelenség túl sósan enni, mert olyankor ehetetlen az étel. Ha az étel csak kicsit van túlsózva, szomjasak leszünk. A víz segít eltávolítani a szervezetből a már feleslegessé vált anyagokat, túlsózás esetén a konyhasót is. Ha folyamatosan kevés sőt eszünk, ez viszonylag lassan, de biztosan károsítja a szervezetünket, és az is, hogy ilyenkor emiatt kevesebb vizet iszunk. Iszik Ön legalább napi 2-3 liter TISZTA VIZET? Mert ha nem, jobb lenne több konyhasót (NaCl) fogyasztania! Ne féljen a konyhasótól, sózzon bátran! Segít megszabadulni a betegségektől, véd a meddőséggel szemben, meghosszabbítja az életét.



Csak kétféle étkezési só létezik, a biztonságos és a többi. A gyógyszerkönyvi tisztaságú NaCl patikai konyhasó a lehető legbiztonságosabb étkezési só. A napi NaCl biztonságos konyhasó szükségletünk mai (2013-as) áron számolva kb. 10 Forint. Napi 10 Forintért nem érdemes kockáztatni egészségünket, szaporodóképességünket, nemzetünket!

A konyhasó tisztaságán kívül nagyon fontos a napi beviteli mennyisége is. A „STOP SÓ Nemzeti Sócsökkentő Program”-ban ajánlott napi 5 gramm NaCl napi mennyiség nem elegendő! Ha egy magatehetetlen beteg a kórházba kerül, napi kb. 2 liter sós infúziót (Ringer oldat) kap. 1 liter Ringer oldatban 9 gramm NaCl van, így napi 2 literrel 18 gramm NaCl jut be a szervezetünkbe. Normál körülmények között ez ajánlatos, élettanilag optimális napi mennyiség (kb. egy csapott evőkanál) egy egészséges felnőtt számára.



Tudtál-e, az MSZ 14002:2010 szabvány 1. bekezdése...

1 Kg

www.tisztaso.hu

70/235-1899

Országhódítók

Marschallkó Lajos

München, 1975

Mikes Kelemen kör, München

Készült Ledermüller Olivér nyomdájában München, 2.

Landwehrstr. 65.

Russischen Invaliden

(1910. dec. 30., 285. szám).

Ebben jelent meg az *Alliance Israelitée* felhívása, amelyet magyar lapok is közöltek. A Weimarer Hist.-Gen. Taschenbuch, S. XII., fordítása szerint a következőket tartalmazza:

"Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem, amelyet könnyebben leigázhatnánk, mint Galiciát és Magyarországot. E két országnak mindenképpen a miénknek kell lennie, mert számunkra ott a legkedvezőbbek a körülmények. Ti, zsidó testvérek, fáradozzatok minden erőtökkel azon, hogy mindkét országot teljesen birtokotokba vehessétek. Törekedjétek, hogy mindent, amit ott még a keresztények birtokolnak, teljesen a kezetekbe vegyetek. Ha erre nem volna elegendő anyagi eszközök, a párizsi szövetségünk minden erővel segíteni fog titeket. Erre a célra a szövetségünk máris gyűjtéseket rendez és az adományok váratlan bőséggel folynak be pénztárunkba azzal a céllal, hogy a galíciai és magyarországi területeket a galíciaiak és magyarok kezéből kiragadjátok és hogy azok kizárólag zsidó kézre kerüljenek. Az egész világ tőkései erre a célra nagy összegeket áldoznak s egyesülnek, hogy ezt a célt a legrövidebb idő alatt elérhessétek."

Kód: alliance-israelitée-1910