

Pesti Központi Kerületi Bíróság
1054 Budapest, Markó u. 25.

Tisztelt Büntetőbíróság!

Alulírott ezúton feljelentem a Pest Megyei Kormányhivatal vezetőjét annak alapján, hogy a Központi Nyomozó Ügyészségtől származó hamis vádakra alapozva velem szemben indított „gondnokság alá helyezési eljárásra” idéztek be, egyelőre „ügyfélként”, de súlyos pénzbüntetést helyezve kilátásba arra az esetre, ha netán nem jelennek meg. Pest Megyei Kormányhivatal Szobi Járási Hivatala, PE-16/GYAMN/171-1/2017, -2/2017. stb. Nincs joguk ellenőrizetlen hamis vádakra alapozva gondnokság alá helyezést indítani!

Azt kérem ettől a Bíróságtól, az országgyűlési szakértőként általam tett feljelentésen alapuló PKKB 13.B.24/1993/2. végzésre tekintettel, hogy ítélje el az engem „gondnokság alá helyezési eljárás alatt állónak” feltüntetéssel rágalmazó hivatalos iratokért való vezetői felelőssége alapján a fenti kormányhivatal vezetőjét a végzéseikkel rólam rágalomterjesztéssel különösen nagy vagyoni és nem vagyoni kárt okozó hitelrontásért.

Az általam felderített bűncselekmények elkövetőit fedező ügyészek korábbi hasonló próbálkozásai alapján valószínűsítem, hogy a hivatalvezető az ügyészségre hivatkozva, a gondnokság alá helyezési eljárás indítását jogosnak feltüntetéssel, elsősorban azért rontja a hitelem, mert a 13.B.24.211/1993/2. PKKB végzés szerinti bűnügyben megbízás nélküli kárelhárítás keretében tovább folytattam a rendőrségen egy év után leállított nyomozást, miután a dr. Demeter Ágnes ügyész által az aktából részemre kimásolt iratokból láttam, hogy a 13.B.24.211/93/2. végzésben felsorolt lakosság mérgező kálium használatokat igazolták a nyomozás során beszerzett klinikai jelentések. Például gyógyszerként engedélyezték a Kálium-R tablettát, miután a klinikai jelentés szerint kb. 10%-os gyakorisággal marja véresre a gyomorfalat! Tömeggyilkosság az engedélyezése!!


Kérem a hivatkozott végzések és azokkal kapcsolatos valamennyi előzmény irat hivatalból beszerzését, mert a Kormányhivatal nem mellékelte a hamis vádakra alapozott „ügyészségi megkeresést” az idézéseihez.

Jogos védelemként (Btk.) bejelentem, hivatkozással az ugyancsak hamis vádaskodásokra alapozott korábbi sikertelen gondnokság alá helyezési hasonló próbálkozásokra, hogy „ügyfélként” sem vagyok a hajlandó a tudományos szakértői hitelem már az idéző végzéseivel is rontó „gyámügyi osztályi” tárgyaláson résztvenni!

Verőce, 2017-05-17.

Jogos védelemként (Btk.) megbízás nélküli egészségvédelmi kárelhárítás keretében (Ptk.) benyújtja:

Tejfalussy András (személyi sz.:1-420415-0215, an.: Bartha Edit)
oknyomozó mérnök, számos méréstudományi nemzetközi szabadalom
feltalálója, volt országgyűlési és önkormányzati szakértő
Magyarország 2621 Verőce, Lugosi u. 71.
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com,
www.tejfalussy.com, +36 20 218 1408



Cc: Pest Megyei Kormányhivatal Szobi Kirendeltsége

hellel, An 3/AT-ka
(2 oldal !)

A PESTI KÖZPONTI KERÜLET BÍRSÁG	
GYÓJSZÁM	KEZDŐIRATON
ÉRK.	1996 -10- 29
PELDANY	FELEZEL
GYÓJSZÁM	UTÓIRATON

8. ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELES

- Megállapítottuk, hogy a megadott dózisú Kalium-R tablettával történő kezelés során, hogy el-
lensúlyozzuk vele a különböző gyógyszerek hipoka-
lémizáló mellékhatását.
- Kellő adagban adva normalizálja a szérum K^+ -szin-
tet bármely okból hipokalémiás egyéneknél.

A székletminták passzírozásával a bevett tabletták 13%-át nyertük vissza. A tabletták maradványok KCl tartalmának meghatározása alapján megállapítottuk, hogy a KCl in vivo jól kioldódik, a kiürített tab-
letták mindössze átlag 11,36 mg KCl-t tartalmaz-
tak.

Ezekből a tényekből nyilvánvaló, hogy a KCl a jó kioldódás után jól felszívódik.

- A készítmény valóban retard hatású, a maximális szé-
rumkoncentrációt a bevételelől számított 4-12 óra
között tapasztaltuk. 5000 mg feletti egyszeri adag-
nál 48 órával a bevétel után is magasabb volt a szé-
rum K^+ -szint a kiindulásinál.
- A normokalémiás szérumkoncentráció elérése után a
felesleg a vizelettel jól kiválasztódott.
- A radiológiai vizsgálatok során megállapítást nyert,
hogy a tabletták általában 12 óra hosszan követhető.

Code: Kalium-R-jel-PKKB961029a

hellel
An 3/AT-ka
95026
K.B. 24.06/1996
a. feladatnál 2.
9. 20. k. 66.068/
1994/3 n. TB-
pénzt a bank-
ba!
96 XI.01

8 óra dor.

- 28 -

423

a gyomor-bél rendszerben. Ezalatt alakját és nagyságát - ha csökkent intenzitással is -, tartja. Szédése még kevésbé gyakorlott radiológusnak sem jelent differenciál diagnosztikai problémát. 4 esetben néhány óráig "kitapadt" a gyomor-bél rendszerben.

10%!

A betegek a kezelést jól tűrték. A leggyakrabban észlelt mellékhatás a gyomorfájdalom volt. A tolerancia vizsgálat során 8000 mg, ill. a feletti egyszeri dózis során 6 egyén közül 5-nél lépett fel. A krónikus kezelés során 40 beteg közül 5-nél észleltük. Valószínű, hogy a gyomorfájdalom fellépte összefüggésben van az egyszerre alkalmazott dózis nagyságával. A tolerancia vizsgálat során 1 betegnél észleltünk akut gyomornyálkahártya eróziókat, mely véleményünk szerint a Kalium-R kezelésnek tulajdonítható. A krónikus kezelést 1 esetben megszakítottuk meléna miatt, de az utóbbiért az alapbetegség - Myeloma multiplex - tehető felelőssé.

17!

83%

125%

16%!

Gyomor- és bélmérgező

Pécs, 1983. nov. 1.

dr. Vezekényi Zsuzsanna tudományos mts. dr. Jávor Tibor egyetemi tanár

dr. Past Tibor tud. főmts.

dr. Tapsonyi Zsuzsa szakmérnök

dr. Radnai Béla klin. ts.


dr. Angyal Pál rtg. oszt. vez. főorvos

dr. Vaskó Gabriella adjunktus

dr. Nagy Lajos tud. mts.

Code: Kalium-R-jel-PKKB961029 b

TUDATOSAN „ELFELEJTETTÉK” BEÍRNI, HOGY A GYOMORFALKISEBESÍTŐ HATÁSA KB. 10 % GYAKORISÁGÚ, AMIBŐL FEKÉLY, S ABBÓL RÁK IS LEHET:



Kálium-R

tabletta

A szervezet káliumhiányának a megelőzésére, ill. megszüntetésére, az orvos utasítása szerint.

Ha az orvos másképpen nem rendelkezik, szokásos adagja naponta 1-2 tablettát. A tablettát a reggeli étkezés után, szétrágás nélkül, egészben kell lenyelni.

Ha szapora szívdobogás, hányás, hasmenés, a has felpuffadása, szurokszínű vagy véres széklet jelentkezik, a tablettát szedését abba kell hagyni és orvoshoz kell fordulni.

Hasi röntgenvizsgálat esetén a tablettát szedéséről a vizsgáló orvost tájékoztatni kell.

A gyógyszert gyermekek elől gondosan el kell zárni.

OGYI-eng. szám: 1702/56/84



ALKALOIDA RT

Code: Kalium-R-cedula

2
AOT-028-2

MÉRÉSTANI SZAKVÉLEMÉNY

1 db. tablettát kálium tartalma kb. 0,5 gramm, s kb. 8 óra alatt szívárog ki belőle. Pécsi klinikai ellenőrző mérések (összefoglaló jelentése) szerint, ez a tablettát sokszor órákra is odatapadt a gyomor-, ill. a bélfalra, ahol is lokális kálium-túladozást, s emiatti gyomorfájdalmat, sőt "akut nyálkahártya eróziót" is előidézett! Vagyis közveszélyes!

A gyógyszertárak számítógépei e hatásai ellenkezőjét hazudják!

Budapest, 2008. 02. 04.

Tejfalussy András dipl. mérnök mérés-tani szakértő