

Kód: gyógyszerkent-arusított-patkanymergek-170604

A „kiválasztott” kutató orvosok és gyógyszerkutatók aljas praktikáit leleplező hatásmérések

A „kiválasztottak” az egészségjavító étkezési sóként Star Koser tanúsítvánnyal (!!!) „Bonsalt (jósó) hamis elnevezéssel árusított, patkányméreg hatású életrövidítő és ivartalanító kálisóval mérgezik a „nem kiválasztottakat”. Továbbá olyan „Kálium-Retard” kálisó tablettát írnak fel a vízajtó szerek mellé, amelyekből a 4 grammos káliumdózis a klinikai kipróbálás alkalmával hatból öt személynél okozott gyomorbántalmakat, egyiküknél gyomorfali vérzést is. Jelenleg mindenkinek, gyereknek és felnőttnek is hivatalosan elő van írva, hogy napi legalább 4,7 gramm káliumot fogyasszon (Stop Só, Menzareform, chips adó). Amerikai és hazai szakkönyvek, orvosi egyetemi tankönyvek bizonyítják, hogy felnőttél csak 0,2 - 0,4 gramm káliumot kell naponta a vérbe juttatni, s egy órán belül a vérbe jutó 1 gramm káliumtól mindenkinek megmérgeződött a veséje a klinikai kísérlet során. A korábbi felére csökkent a vizeletkiválasztása, a 2 grammnál több pedig a szív működését is rontotta (Redi Só kísérlet). Eltorzította az EKG-t. 1950-ben Nobel-díjat kapott az a három kutató, akik patkányokon és embereken végzett nátrium és kálium dózis variációs etetési kísérleteikkel bebizonyították, hogy a kálium túladagolás, különösen, ha hiányos a konyhasó pótlás, magas vérnyomást okozó életrövidítő és nemi jelleg torzító (ivartalanító) hatású fajirtási módszer. Ezek ellenére, vagy éppen ezért, csak azt hallani a legtöbb orvostól, hogy napi 2 gramm alá kell csökkenteni a nátriumfogyasztást (azaz 5 gramm alá a nátrium-klorid konyhasó pótlást) és napi 4,7 gramm fölé kell növelni a káliumpótlást. Azzal érvelnek, hogy a Levish Dahl nevű kutató a túl sok konyhasóval magas vérnyomást okozott a patkányoknak. Nem érdekli őket, hogy a Népszabadság is dokumentálta, hogy hamisan számolták át a magas vérnyomást okozó só dózis patkányról emberre. Ember estében napi fél kg (!) konyhasó bejuttatás felelne meg a patkányoknál magas vérnyomást okozó konyhasó mennyiségnek. Ezek az orvosok aljas gazemberek, akiket egy alkotmányos jogállamban halálra ítélnének, nálunk viszont miniszterek is lehetnek. Például Dr. Surján László, aki miniszterként azt írta nekem, hogy „napi 70 grammig ártalmatlannak a kálium, ill. napi 133 grammig a kálisóval sózás”. Ezzel fedezte a 99%-ban kálisóból álló, a gyógyszertárakban orvosi rendelvényre „gyógytápszerként” árusított „REDI SÓ” elnevezésű patkánymérget. (A Star kosher tanúsítványos BONSALT hasonló népiirtó hatású.)

1. SALE SENZA SODIO BONSALT | Fior di Loto

www.fiordiloto.it/it/alimenti/condimenti/sale/sale-senza-sodio-bonsalt

Bonsalt è infatti totalmente privo di sodio, è basato sul cloruro di potassio e su altri componenti, che gli ... **Bonsalt** ha anche la certificazione **Star K-Kosher**.

2. Orális káliumpótlás a háziorvosi gyakorlatban - Dr.Barna István

drbarnaistvan.hu/kalium-oralis-kaliumpotlas-a-haziorvosi-gyakorlatban/,

2015. ápr. 7. - A **retard** készítmények alkalmazásával a **kálium**-kiáramlás sebessége lassult, a felszabadulás fokozatos, ezzel a lokális irritáció veszélye ...

Méréstudományi szakértői megjegyzésem: a fenti reklámmal szembehazudják a klinikai kísérlet eredményét, ami szerint a tabletták kb. 10 %-a kitapad a gyomor- ill. bélfalon és súlyos irritációt, vérzést is okozott. Lásd az általam kezdeményezett rendőrségi nyomozás során beszerezett klinikai összefoglaló jelentést, ahol az első oldalon sikeresnek nyilvánítják a Kálium-Retard tablettánál, hogy hatból öt embernél okozott gyomorfájdalmakat, egyiküknél gyomorfal vérzést is:

hellek, Gu3/AT-kor 2. oldal !)

A PESTI KÖZPONTI KERÜLETI BÍRSÁG	
GYÓGYSZÁM	KEZDŐRATON
ÉRK:	1996 -10- 29
PÉLDÁNY	FELJEL
GYÓGYSZÁM	KEZDŐRATON

8. ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELES

- Megállapítottuk, hogy a megadott dózisú Kalium-R tablettával történő kezelés során, hogy el-
lensúlyozzuk vele a különböző gyógyszerek hipoka-
lémizáló mellékhatását.
- Kellő adagban adva normalizálja a szérum K^+ -szin-
tet bármely okból hipokalémiás egyéneknél.

A székletminták paszírozásával a bevett tabletták 13%-át nyertük vissza. A tabletták maradványok KCl tartalmának meghatározása alapján megállapítottuk, hogy a KCl in vivo jól kioldódik, a kiürített tab-
letták mindössze átlag 11,36 mg KCl-t tartalmaz-
tak.

Ezekből a tényekből nyilvánvaló, hogy a KCl a jó
kioldódás után jól felszívódik.

- A készítmény valóban retard hatású, a maximális szé-
rumkoncentrációt a bevételelől számított 4-12 óra
között tapasztaltuk. 5000 mg feletti egyszeri adag-
nál 48 órával a bevétel után is magasabb volt a szé-
rum K^+ -szint a kiindulásinál.
- A normokalémiás szérumkoncentráció elérése után a
felesleg a vizelettel jól kiválasztódott.
- A radiológiai vizsgálatok során megállapítást nyert,
hogy a tabletták általában 12 óra hosszan követhető.

Code: Kalium-R-jel-PKKB961029a

hellek
Gu3/AT-kor

95026

13.8.24.96/1996/2
a. feladat. 2.
9. 20. k. 66.068/
1994/3 n. TB-
permet a bevezet-
ve!
96 XI. 01

8 óra dor

a gyomor-bél rendszerben. Ezalatt alakját és nagyságát - ha csökkent intenzitással is -, tartja. Szedése még kevésbé gyakorlott radiológusnak sem jelent differenciál diagnosztikai problémát. 4 esetben néhány óráig "kitapadt" a gyomor-bél rendszerben.

10%!

A betegek a kezelést jól tűrték. A leggyakrabban észlelt mellékhatás a gyomorfájdalom volt. A tolerancia vizsgálat során 8000 mg, ill. a feletti egyszeri dózis során 6 egyén közül 5-nél lépett fel. A krónikus kezelés során 40 beteg közül 5-nél észleltük. Valószínű, hogy a gyomorfájdalom fellépte összefüggésben van az egyszerre alkalmazott dózis nagyságával. A tolerancia vizsgálat során 1 betegnél észleltünk akut gyomornyálkahártya eréziókat, mely véleményünk szerint a Kálium-R kezelésnek tulajdonítható. A krónikus kezelést 1 esetben megszakítottuk meléna miatt, de az utóbbiért az alapbetegség - Myeloma multiplex - tehető felelőssé.

17!

83%

12,5%

16%!

Gyomor- és bélmergő

Pécs, 1983. nov. 1.

dr. Vezekényi Zsuzsanna
tudományos mts.

dr. Jávor Tibor
egyetemi tanár

dr. Past Tibor
tud. főmts.

dr. Tapsonyi Zsuzsa
szakmérnök

dr. Radnai Béla
klin. ts.

dr. Angyal Pál
rtg. oszt. vez.
főcervos

dr. Vaskó Gabriella
adjunktus

dr. Nagy Lajos
tud. mts.

Code: Kálium-R-jel-PKKB961029 b

KÁLIUM-R tabletta



Hatóanyag:

potassium
chloride

ATC:

Kalium
chloride

Vényköteles

- Normatív TB támogatás: **igen**
- Közgyógyellátásra adható: **igen**
- EÜ támogatásra adható: **nem**
- EÜ 100 támogatásra adható: **nem**

3. Stop só, Menzareform

<http://www.stopso.eu/>

FROM : AGROQUEST KFT. Mosonmagyaróvár PHONE NO. : 00 36 96 579752 Feb. 10 2011 10:56AM P2

Iratjel: Tisztifoorvosi-kozokirat-hamisitas-110210m3a

Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet
Alapítva: 1949

Intézetvezető: Dr. med. habil. Martos Éva főigazgató főorvos

FŐIGAZGATÓSÁG

Konyhasó és nátrium

A nátrium ugyan az egyik legfontosabb makroelem a szervezet számára, de napi 1,5-2 gramm nátrium elegendő a szervezet napi nátriumigényének fedezéséhez. A nátrium csaknem teljes egészében a konyhasóból származik, 2 gramm nátrium 5 gramm konyhasónak (NaCl) felel meg. A WHO által ajánlott maximális bevétel napi 5 gramm só, ami egy teáskanálnyi mennyiség. Az európai országokban a tényleges sóbevitel ennél jóval magasabb (9-12 gramm/nap), míg hazánkban az OÉTI által végzett legújabb reprezentatív lakossági táplálkozási felmérés (OTÁP2009) adatai szerint a sóbevitel férfiaknál 17,5, míg nőknél 12,1 gramm, azaz az ajánlott érték több, mint háromszorosa. Sajnos gyermekek esetében is hasonló a helyzet, mint azt az óvodások körében végzett országos felmérés is igazolja (Országos helyzetkép az óvodai közétkeztetésről).

A kálium, nátrium és a vérnyomás

Számos bizonyíték támasztja alá a káliumbevitel és a vérnyomás közötti fordított összefüggést, a magasabb kálium-bevitel endoteli funkcióit javító és szív- és érrendszer védő hatását, a bőséges zöldséget, gyümölcsöt tartalmazó, így káliumban gazdag étrend vérnyomáscsökkentő hatása bizonyított.

A nátriumbevitel csökkentése és a káliumbevitel növelése egyaránt vérnyomáscsökkentő hatású, mind normális, mind magas vérnyomásos egyéneknél. Bizonyítottnak tekinthető, hogy minden olyan diétás módosítás, amely a Na-bevitel csökkentésére, illetve a K-bevitel növelésére irányul, jelentősen hozzájárul a lakosság egészségi állapotának javulásához, a szív és érrendszeri betegségekből eredő halálozás csökkentéséhez.

Az Amerikai Hypertónia Társaság 2009-ben megjelent állásfoglalása a vérnyomáscsökkentő eredményező táplálkozási ajánlásokról egyebek mellett javasolja, hogy a nátrium-fogyasztás ne haladja meg a 2,3 grammot naponta, a káliumbevitel érje el a 4,7 gramm/nap szintet. Megállapítja, hogy egészséges egyéneknél, normál vesefunkció mellett a napi 4,7 gramm káliumbevitelt meghaladó étrend sem jelent semmiféle kockázatot, mivel a felesleg a vizelettel kiválasztódik.

4. Amerikai hivatalos kiadvány arról, hogy a vérérumban mindössze napi 0,2 – 0,4 grammnyi káliumot szükséges pótolni ahhoz, hogy kálium hiány ne lehessen:

Recommended Dietary Allowances

10th Edition

Subcommittee on the Tenth Edition of the RDAs
Food and Nutrition Board
Commission on Life Sciences
National Research Council



NATIONAL ACADEMY PRESS
Washington, D.C. 1989

Estimate of Requirements

Adults Potassium requirements have been evaluated in only a few studies. Although losses on a low or "minimum" potassium diet are small, potassium is less well conserved than sodium (see Table 11-1). Fecal losses are less than 400 mg (10 mEq) per day, and renal losses may approach 200 to 400 mg (5 to 10 mEq) per day (Squires and Huth, 1959). Other losses (e.g., in sweat) are negligible. On intakes of about 20 mEq/day, metabolic balance is achieved at the expense of reduced body potassium stores (up to 250 mEq) and in some cases with reduced plasma levels (<4 mEq/liter). To maintain normal body stores and a normal concentration in plasma and interstitial fluid, an intake of about 40 mEq/day may be needed (Sebastian et al., 1971). Therefore, it would appear that the minimum requirement is approximately 1,600 to 2,000 mg (40 to 50 mEq) per day. There is considerable evidence that dietary potassium exerts a beneficial effect in hypertension, and recommendations for increased intake of fruits and vegetables (NRC, 1980) would raise potassium intake of adults to about 3,500 mg (90 mEq) per day.

Izzadsággal elbanyagolható, a széklettel és vizelettel pedig mindössze 0,4-0,8 gramm a napi káliumvesztése egy felnőttnek. Ennél többnek a pótlása nem csak felesleges, de veszélyes is lehet. (Code: USA-Dietary256b)

5. Már a 0,8 – 1,6 grammnál több kálium (akárhonnan) egy óra alatt a vérbe bejutása is veszélyesen hyperkalaemizál:

Dr. Varga Péter és társai: "Az intenzív betegellátás elmélete és gyakorlata" című tankönyve, 192. oldal. Medicina, Budapest, 1977.

Kód: Varga_Peter_Hyperkalaemia-192

rete kielégítő információt nyújt. A se-K-szint értékelését pontosabbá teszi, ha ismerjük az adott körképben a K „vándorlásának” aktuális irányát, a se-Na-tartalmat, a szervezet hidráltóságát, illetve a napi vizelet K-tartalmát. Ennek 50 mval alatti értéke K-hiányra utal akkor is, ha a se-K-szint jelentősen nem csökkent.

1. A K-háztartás kóros, ha a felvétel nem megfelelő, ha zavart szenved a sejtekbe való beépülés, avagy károsodik a kiválasztás. A K-kötésben levő össz-anionok mennyiségét K-kapacitásnak nevezzük. Ebben az értelemben a K-háztartás zavaráról beszélünk akkor is, ha a K-kapacitás és az aktuális K-tartalom egyensúlya megbomlik.

2. Hyperkalaemiában a se-K szintje 5 mval/l fölé emelkedik. Az egészséges vese K-ürítése lépést tart a bevitellel, a vesecéltelenség oligo-anuriájában a tubulusban a kiválasztás károsodik, és nincs mód az emelkedett szint kiürítés útján való csökkenésére.

Hyperkalaemiához vezethetnek a szövet-roncsolással, szövetszétéssel járó folyamatok, az égszbetegség, traumák, a parenchymás szervek necrosis, intravasalis haemolysis. Nagy mennyiségű konzervvör gyors transfúziójakor a vörösvértestek szétesése miatt tetemes mennyiségű K szabadulhat fel, ugyanúgy, mint fokozott sejtkatabolizmusban, metabolikus acidosisban. Veszedeles hyperkalaemiát okoz a K-tartalmú oldatok gyors infúziója, ha a K mennyisége meghaladja az óránkénti 20–40 mval-t, illetve a napi 280 mval mennyiséget. Krónikus hyperkalaemia jelentkezhet K-retenciót kiváltó gyógyszerek hatására.

A klinikai kép nincs mindig összhangban a serum megnövekedett K-szintjével, mert a tünetekért a rendszerint vele egyittjáró metabolikus acidosis, a Na és Ca-eltérések együttesen lehetnek felelősek.


8. Tünettanára az ideg-izomtevékenység gátlása, az általános izomgyengeség, a szív dilatációja és ritmuszavara, valamint az érzészavarok a jellemzők.

9. Az EKG-n a magas, sáterszerű T hullámok, a QRS-komplexus kiszélesedése, a Q–T idő megrövidülése, szárblokk kialakulása, a P-hullámok ellapulása a leggyakrabban előforduló eltérések. Ha a se-K szintje 7–10 mval/l

föle emelkedik, kamra-fibrillációval, továbbá diastolés szívmegállás veszélyével lehet számolni (18-3. ábra).

11. Hypokalaemiáról beszélünk akkor, ha a se-K értéke 3,5 mval/l alatt van. Kiváltója lehet az elégtelen bevitel, a sejtekbe való fokozott beépülés, illetve, ha kórosak a renalis és extra-

Serum káliumszint és EKG



18-3. ábra. K (mval/l) érték változása és az EKG

192 1./ A 2,2-3,6 gramm/24 óránál gyorsabb étkezési káliumbevitel egy előtte egészséges felnőttél hyperkalaemiássá torzítja az EKG-t!

2./ A Magyar-Petrányi tankönyv hamisan, a 7 mval/litert tanítja a hyperkalaemia küszöbértékéként!

3./ Vesemérgező a káliumot túladagolás! Nem lehet egészséges a vese, miután 0,8 - 1,6 gramm vagy több káliumot tartalmazó vizet (levet) iszunk éhgyomorra.

4-6./ A káliumból 20 mval=0,8 gramm, vagy 40 mval=1,6 gramm, vagy ennél is több 1 óra alatt vagy még gyorsabban bejuttatása a vérbe: veszedelmesen mérgező!

7./ A csökkentett nátriumpótlás növeli a káliumtúladagolás miatti mérgezés veszélyét!

8,10, 11./ Ezek lettek nagyságrenddel gyakoribbak, amióta kálisóval "sózák" az ételeket és kálisóval műtrágyázással növelik a növények káliumtartalmát!

9./ Otthon is (otthoni) EKG-vel lehet legkönnyebben észrevenni a mérgező kálium túladagolást!

12./ Ezek a alapul vehető, mérésekkel is igazolt tényleges normokalaemiás határok!

7. A ténylegesen szükséges napi víz, nátrium-klorid és káliumpótlás étkezés esetén is a gyógyhatású Ringer-infúziós oldat dózisarányai szerinti. Vagyis a napi 3 liter víz mellett 27 gramm konyhasó és 0,36 gramm kálium vérbejuttatása az optimális, a szív számára is.

A Ringer oldat az alábbi vegyületeket (ásványi anyagokat) tartalmazza desztillál vízben feloldva:

A Ringer-oldat, melynek összetétele a szív igényének legjobban megfelel:
0,9% NaCl,
0,03% KCl,
0,025% CaCl₂ és
0,02% NaHCO₃-ból áll.

AZ INFÚZÓS RINGER-OLDAT ALKOTÓELEMEI
Dr. Kiszely György és dr. Hársing László: Gyógyszerész továbbképzés Biológiai és élettan alapismeretek, 90. oldal. Medicina, 1958.
Iratkód: Ringer-oldat

NYILATKOZAT

A Ringer oldat a testnedvekhez hasonló ionösszetételű folyadék. A Ringer oldat (0,9 % NaCl, 0,03% KCl, 0,025 % CaCl₂, 0,02 % NaHCO₃, 99 % desztillált víz) szerinti nátrium, kálium, klór és víz pótlási arány megfelelő kóros veszteségek esetén, de ugyancsak optimális a napi étkezések során is.

Budapest 2010. január 6.



Dr. Papp Lajos
ny.egyetemi tanár
akadémiai doktor

Lásd www.tejfalussy.com: 10. sz. videó!


8. A Redi só 2 grammja (0,88 gramm kálium) felére csökkentette 10 előtte egészséges személy mindegyikénél a vizeletkiválasztást, a kétszerese, 4 gramm Redi só (1,76 grammnyi kálium) pedig mindegyiküket hyperkalaemizálta kb. másfél óra időtartamra, vagyis rontotta a szív működését:

A klinikai mérések

Az OÉTI-től kikértük a REDI-só klinikai kísérleti dokumentációját (állampolgári jogon). A szérumban káliumszintje **10 egészséges emberből 10-nél** meghaladta az 5 mval/litert, kb. 1 órán át, ha 4 gramm REDI-só oldatát itatták velük [2].



1. ábra
Vér-Szérumban káliumszint-változások „REDI-só”
terhelés ideje alatt
(A Pécsi Orvostudományi Egyetem 1. Számú
Befekltika mérése: 4111/8-4. OÉTI [2])



2. ábra
Vizeletkiválasztás a „REDI-só”-terhelések
ideje alatt.
A vizelet kiválasztása a REDI-só különböző dó-
zisainak alkalmazása után egészséges
felnőtteken [4].

9. Nobel díjas kutatók hatás mérései a csökkentett nátrium és növelt káliumbevitel magas vérnyomást, szív és keringési zavarokat, életrövidülést, nemi torzulásokat is okozó fajirtó hatásairól:

Ügykód: nepirtonatriumhianyeskaliumentuladagolas140606a

Népirtó nátriumhiány és káliumtúladagolás

(Megbízás nélküli ügyvitel keretében közérdekű kárelhárítás, lásd Ptk.)

NOBEL-DÍJAS MELLÉKVESEKÉREG KUTATÓK ÉLETTANI KÍSÉRLETEI IS BIZONYÍTJÁK, HOGY A „STOP SÓ NEMZETI SÓCSÖKKENTÉSI PROGRAM”, AMI HAMIS ELMÉLETEKET HAMISAN IGAZOLÓ „EPIDEMIOLÓGIAI STATISZTIKÁKRA” HIVATKOZIK, TUDATOSAN MESOKSZOROZZA A RÁK- ÉS AZ EGYÉB ÉLETRÖVIDÍTŐ BETEGSÉGEK GYAKORISÁGÁT.

A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában, „A biológia aktuális problémái” főcím alatt található „**A mellékvesekéreg biológiája**” c. fejezet. Aki írta, az akadémiai nívódíjas Dr. Szabó Dezső azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek alapján **Kendall, Reichstein és Hench 1950-ben Nobel-díjban részesültek** „a mellékvesekéreg-hormonok és szerkezetük és biológiai hatásuk” felfedezéséért. Az összefoglalás jellegű leírás emellett további 61 tudományos publikáció mérési eredményeire is hivatkozik (zárójelben jelzem, hogy a könyvből idézett megállapítások a könyv mely oldalain találhatók).

EZEK A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK EGYBEHANGZÓAN BIZONYÍTJÁK AZT, HOGY A NÁTRIUMHIÁNYOS ÉS KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT EMBEREK ÉS PATKÁNYOK MELLÉKVESEKÉREG HORMONTERMELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A TUDOMÁNYOS KUTATÓK VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEKEL RENDELKEZNEK (134), AMELYEK SZERINT A NÁTRIUMHIÁNYOS VAGY KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT ÁLLATOKBAN (PATKÁNYOKBAN) ÉS EMBEREKBN IS MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK BE, MIKÖZBEN A SZERVEZET ELETROLIT-HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)

A későbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrövidítő, ivartalanító stb. hatások, például konkrétan a következők:

- 1./ A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik. (140)
- 2./ A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás alakul ki. (167)
- 3./ **A különböző stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)**
- 4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsősorban a vesesejtekben, de a verejtékszövetekben és az emésztőrendszer mirigysejtjeiben is (167-168). Ha ez hosszabb ideig tart, törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet:
- 5./ Idővel nátrium-hiány jön létre. (168)
- 6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)
- 7./ Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168)
- 8./ Romlik a keringés. (168)
- 9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szűrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)
- 10./ Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168)
- 11./ A bőr és a nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)

12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)

13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)

14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)

A hiányos nátrium pótlás és vagy kálium túladagolás miatti egészségromlás leggyakoribb tünetei:

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)

20./ A vér besűrűsödése miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést, renintermelő vesedaganatok jönnek létre. (169)

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait, a nemi jelleg eltorzulást („pszeudohermafroditizmust”) is okoz, emiatt lett, lesz egyre több a homoszekszuális :

21./ Leánymagzatok nemi szerveinek a fejlődési zavarait, pl. szeméremajkak összenövését, klitoris-megnagyobbodást. (169-170)


22./ Lánygyermeknél klitoris-megnagyobbodást, idő előtti mentstruációt. (170)

23./ Felnőtt nőknél: klitoris-megnagyobbodás, test- és arcszőrösödés, kopaszodás, érdes hang, a menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)

24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erőteljes izomzat kifejlődést, a testnövekedés gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszőrzet idő előtti megjelenését, korai szakáll-növekedést, hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)

25./ Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermeknél és férfiaknál emlő-megnagyobbodást okoz. (170)

26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztaták) növekedését serkenti. (170)



10. Magazin mellékletben, félrevezető bevezető szöveggel, komolytalan címekkel tették közzé a világszintű sózás elrontási csalás bizonyítását, bizonyítékait, hogy a nem „kiválasztottak” ne vegyék komolyan:

36

A SÓNAK MANAPSÁG ROSSZ LETT AZ IMÁZSA. AZ ORVOSOK ÉS EGÉSZSÉGVÉDŐK ÓVA INTENÉK: AKI TÚL SÓT FOGYASZT, MEGROVÍDÍTJA ÉLETÉT. ROSSZ HÍRNEVET A SÓ ÁNNAK KÖSZÖNHETI, HOGY MEGEMELI A VÉRYOMÁST, CSÖKKENTI A VÁRHATÓ ÉLETTARTAMOT.

A „komisz” só

A magas vérnyomás megelőzésére-szárazgény étrendet ajánlanak. Elegendő: napi 0,5-1 gramm só, ennek azonban többszörösét fogyasztjuk. Pedig a só sokáig gyógyszernek számított. Vér-szegénység, erőtlenység, fel-fajás és magán orvoslásról szóló. Sós vízrel áztatott a legutolsó megbetegedésekor, emésztési panaszok, reuma-fájdalmak esetén. Gyerekkorunkból emlékezhetünk a forró sóval töltött zacskón, amit a lábunkra tettek.

De mitől lett „komisz” a só? Az első tanulmányt Lewis Dahl írta, melyben kimutatta, hogy a patkányok vérnyomása emelkedik, ha erősen sózott ételt kapnak. A kísérlethez használt só azonban annyira volt, hogy egy embernek naponta fél kilót kellett ennie, hogy ugyanakkora dózist vegyen magához. Egy másik kísérletben a világ minden részéről összegyűlt embereket, az adott feldolgozása megkezdő eredményt látni. A vérnyomás csökkent, ha növelik a sóbevitelt. A legutolsó sós fogyasztó népcsoportnak (napi 14 gramm) nem volt magasabb vérnyomása, mint azoknak, akik csak 6 grammot evesek. Négy csoport viszont teljesen ellentétben a sóból: japánok nem evesek sót, és a magas vérnyomás is alig ismerős. Amikor az ő ételüket is hozzáadták a többiekhez, csak akkor kapták meg az elvárt értéket. A tudósoknak több emlékeztetés is felváz, ezért kérik az eredeti adatokat, de hiába. Elhelyett a szerzők új feldolgozást azokat, új módszerekkel. Az eredmény: a só hatása a vérnyomásra negatív, mint gondolták valaha. Egy német kritikus „adományozásokról” írta ezt a műkészen.

Retorikailag és valóban vajon a só? Az amerikai Science szakkönyv nemrég szemrehányásokat tett a só elleni kampány.

alátámasztanak. De a lapok tovább publikálják a sófogasztás és vérnyomás közötti összefüggés eredményeit. Más tanulmányok is megmutatták, hogy a sószegény étrend nem csökkenti a vérnyomást. Azt is kimutatták, hogy a sóbevitel korlátozása növeli az elhízást, és csökkenti a szív- és keringési betegségeket. A világ a jövő útját el. Az viszont biztos, hogy a só mellesleg megemeli a kolesterinszintet, de változatlanul kölcsönösen csökkentő és sószegény táplálékban intenek minket. Ember legyen a talpán, aki felismeri, hogy egy-ny problémáinak okozója. Milyen tanácsot adhatunk a magas vérnyomásban szenvedőknek? Némely orvosok szerint a népesség kétharmadánál a vérnyomás nem reagál a sóra. A maradék harmad egyik felénél emelt sófogyasztással csökken a vérnyomás, a másik felénél emelkedik. Akinek magas a vérnyomása, próbálja ki kevesebb sóval, hogy ő melyik csoportba tartozik. Egyetével, ne hagyjunk magunknak egyszerűen csak edzeni.

Jakab Márton

CSIPETNYI TRÜKK

A só túlzott használata a szív- és érrendszeri betegségeket okozhatja. Ezért a só fogyasztását csökkenteni kell. A só túlzott használata a szív- és érrendszeri betegségeket okozhatja. Ezért a só fogyasztását csökkenteni kell.

A só megemeli a vérnyomást, ami a szív- és érrendszeri betegségeket okozhatja. Ezért a só fogyasztását csökkenteni kell.

Egy csipet sóval könnyebb édesíteni a süteményeket. Az orvosok azt tanácsolják, hogy a só fogyasztását csökkenteni kell. A só túlzott használata a szív- és érrendszeri betegségeket okozhatja. Ezért a só fogyasztását csökkenteni kell.

A kenyérszén nem egyenlő, mint a kenyérszén. A kenyérszén nem egyenlő, mint a kenyérszén. A kenyérszén nem egyenlő, mint a kenyérszén.

A kenyérszén nem egyenlő, mint a kenyérszén. A kenyérszén nem egyenlő, mint a kenyérszén. A kenyérszén nem egyenlő, mint a kenyérszén.

J. N. J.

Népszabadság melléklet, 2002. nov. 15. TUDATOS VÉNYTÁRSALAK A BIZONYÍTÁS!

11. Dr. Surján László miniszter azzal fedezi a káliummal népirtást, hogy ártalmatlannak nyilvánítja a (patkánymérreg) kálisóval szóást „napi 133 grammig” (70 grammnyi káliumig):



Code: Surján930219a *hiteles!*

*Bünygi bizonyíték
a miniszter hamis
szakvéleménye!*

343/S/93

T e j f a l u s s y András
elnök úr részére
Agroanalízis Tudományos Társaság
Környezetvédelmi- és Gazdasági
Ellenőrző Központ

B u d a p e s t
Lajos u. 115.
1036

Tisztelt Elnök Úr!

Az 1992. december 29-én kelt levelében felvetett problémák szakértői véleményezésre felkértem az Országos Élelmezési- és Táplálkozástudományi Intézetet. *Abúellátottság-vel v. mérgezés!*
A hozzám eljuttatott elemzésük alapján a következőket tudom válaszolni Önnek.

A kálium bevitel világszerte 2-8 g/nap között változik. Magyarországon az ajánlás 3 g/nap. Káliummérgezés csak 18 g/nap vagy ennél nagyobb mennyiség bevitelére esetén következhet be. Egyes közvélemények szerint 1 g kálium (ez 1,9 g káliumkloridnak felel meg) naponta és testtömeg kg-ként még nem toxikus adagnak tekinthető. Ez azt jelenti, hogy 70 kg testtömegű ember 70 g káliumot, vagy ennek megfelelő 133 g káliumkloridot elfogyaszthat egy nap, mérgezés veszélye nélkül. Ennek az az oka, hogy a vese könnyen és gyorsan kiválasztja a felesleges kálium ionokat. A káliumnak bizonyos esetekben, - pl. veseelégtelenség, Verospiron nevű gyógyszer szedése - valóban lehet káros hatása. Azonban ezek szélsőséges, viszonylag ritka esetekben fordulnak elő és megfelelő gondossággal legtöbb esetben elkerülhető.

A mérési adatok szerint 0,8 g is mérgező lehet gyors bevitel mellett (1983.)

önnyelvények ellenőrzése?

*felírta
csökkent
an 1,76
grammklorid-
4-12 g is
a vese via
szűkítő-
látszólagos-
sejtel!*
(1983.)



*Ez az a veszélyes 4 betegséget
1-4 gramm káliummal történő
adag 3 kg-os extrém ka-
liummérgezés a klinikán!*

Code: Surján930219b

- 2 -

Az International Life Sciences Institute, European Branch 1990-ben közzétett állásfoglalása szerint az ajánlott kálium bevitelnek morálisan azonosnak kell lenni a ténylegesen elfogyasztott nátrium mennyiségével. Szerintünk az ajánlott nátrium bevitel 2300 mg/nap, ennek megfelelően 3900 mg/nap kálium bevitel javasolt.

Az első magyar reprezentatív táplálkozás epidemiológiai vizsgálat adatai azt mutatják, hogy a kálium bevitel mind a férfiak, mind a nők esetében kevés, a nőknél mindegyik vizsgált korcsoportban, férfiaknál a 60 év felettiek táplálkozásában kisebb a bevitel az ajánlottnál.

Az Országos Élelmezési- és Táplálkozástudományi Intézetet szerint a nátrium-kálium beviteli arány akkor kedvező, ha a hányados 1 alatt van. Az említett vizsgálat szerint férfiak esetében az arány 2.4, nők esetében 2.2.

A hypertonia-betegségek a lakosság 15%-át érintő elterjedtsége indokolja, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy a kálium bevitele negatív korrelációban van a diasztolés vérnyomással, következésképpen javasolni kell a lakosságnak a káliumban gazdag táplálékokból összeállított étrendet a hypertonia betegség megelőzése érdekében.

A káliumsók adása hozzátartozik a hypertóniások kezelésének irányelveihez, ezért, valamint a fentieket figyelembe véve nem látom indokoltnak a közel nátriummentes REDI-só és a csökkentett nátriumtartalmú sók forgalomból történő kivonását. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy Nyugat-Európában és Amerikában a különböző káliumtartalmú sópótló szerek nagy választékban állnak a vásárlók rendelkezésére.

Hazánkban jelenleg az előbb említett kétféle csökkentett nátriumtartalmú, sós íz biztosító készítmény van forgalomban.



Nem az "íz" a lényeg!

A REDI-só, amelynek összetétele:

káliumklorid	55%
káliumcitrát	43%
magnéziumglutamát	2%

← Gyereketnek is napi 10 gramm, ehhez egy evőkanál is ajánlott, de talán forgalomban!

azaz 1 g só elfogyasztása 0.443 g káliumion bevitelét jelenti. Ezt a készítményt az OÉTI 1983-ban gyógytápszerként törzskönyvezte. Törzskönyvi száma:20

A másik említett sókeverék nátriumkloridból és káliumkloridból készül, 100 g-onként 24 nátriumot és 25 g káliumot tartalmaz.

← Egy napra 20-30 grammot is elfogyaszthatunk, mind a két keverék!

A káliumsók a növényi élethez is feltétlenül szükségesek. A modern mezőgazdasági gyakorlat szerint a terméssel és az egyéb növény-részekkel a talajból eltávolított kálium mennyiséget pótolni kell. A forgalomban lévő műtrágyák káliumnitrátot, káliumkloridot, vagy káliumszulfátot tartalmaznak. (A magyarországi talajok ásványi anyag tartalmának felmérésére a MÉM - Növényvédelmi Agrokémiai Központ végzett igen részletes méréseket az elmúlt évtizedben.) A megfelelő mennyiségben alkalmazott kálium műtrágyák nem okozhatnak veszélyt, a legtöbb talaj jelentős kálium-megkötő kapacitással rendelkezik.

← Az ellátás hiányát mindig a rendes méréssel!

Összefoglalásként szeretném nyomatékosan hangsúlyozni, hogy semmi okot sem látunk arra, hogy korlátozzuk a káliumtartalmú ételek fogyasztását. Az egészséges életmód ismertetésével kapcsolatban azt kell kiemelni, hogy a megszokott étrendek nátriumtartalmát csökkenteni kell, ugyanakkor káliumtartalmát célszerű növelni. A csökkentett nátriumtartalmú sókeverékek választékát, fogyasztását növelni és nem korlátozni kell. A káliumtartalmú sók nemcsak azért jók, mert használatukkal csökken a nátriumbevitel, az enyhébb fokú káliumhiány is megszűnhet és javul a táplálékban a nátrium és a kálium aránya.

Vak?!

← Nem kell rájönni!

← Nem jók, hanem mérgezőek!

Ami az 1992. december 29-én kelt levelében fölvetett konkrét kérdéseket illeti, a következőket jegyzem meg:

1. A 8253 sz. írásbeli válaszban szereplő adatok olyan lektorált, tudományos folyóiratokból és szakkönyvekből származnak, amelyeket mértékadó tudományos körök elfogadnak. *Azotban az ellentétben áll a valósággal!!*

2. Ön szerint "óránkénti 0.8 -1.6 g könnyen felvehető kálium felnőtt emberre is mérgező hatású lehet". Ez megfelel 19.2 - 38,4 g naponkénti elfogyasztásának. *Nem felel meg, nem lehet felvehető!*

3.-4. A REDI-sóval kapcsolatos aggályai eloszlatása végett újfent megjegyzem, hogy e gyógytápszer 1983-ban törzskönyvezték. Hasonló összetételű, a sós íz biztosítását szolgáló készítmények világszerte forgalomban vannak, így - az OÉTI szerint - klinikai vizsgálat nem látszott szükségesnek. *Nem igaz! Nem igaz, hogy nem mérgezők, a mérgezőnek bizonyult!*

Sajnálattal kell ugyanakkor közölnöm Önnel, hogy az Ön által feltételezett, a "magyar lakosság megmérgezésére szerveződött külföldi összeesküvés" kivizsgálására hivatali kompetenciám nem terjed ki.

A nemzetbiztonsági "biztonság" sem hisz benne!

Budapest, 1993. február 19.

Köszönti:

L. Surján

Surján László



A mi Antirandom méréseink eredményeinek a Falurádióban közzététele után *beismerte* egy szlovákiai kutató alábbi cikke, hogy a talajvíz kálium tartalmát a 90 mg/kg természetesnél nagyobbra növelve a "műtrágyaként" adagolt káliumvegyületekkel számos betegséget lehet okozni a növények, de az állatoknak és az emberek részére is, ez utóbbiakat meddővé is teszi, s a hagyományosnak a többszöröse nővelhető vele a természetes önköltség.
Budapest, 2007. 02. 19. Teifalussy András /mérési szakértő/

Köztudott, hogy viszonylag magas színvonalú nálunk a növénytermesztés, de problémáink vannak az állattenyésztésben, ahol a világ fejlett országaival való összehasonlítást nem éppen hízelgő a számunkra. Ez leginkább a húsgazdálkodási minőségével kapcsolatban áll (főzik ki). A tejtermeléshez például sokkal több etetőanyagot használunk, mint máshol, és a fejelt szarvasmarha-tenyésztéssel rendelkező országok, mivel húsgazdálkodásról nem-budjuk elérté a kívánt mértéket. A szarvasított húsgazdálkodás ugyanúgy nálunk 25-30 gramm kálsóval te tartalmaz klorogammaként, noha az optimális mennyiség 10-15 gramm között lenne. De ugyanígy problémák a burgonya keményítőtermelésénél is, a cukorrépa cukortartalmánál, sőt még a gabona kora érése is, amely utóbbi legca-

A talaj kalkiumtartalmának csökkentése megoldandó a tápanyagproblémák is. Bebizonyosodott ugyanis a kísérletek során, hogy a nagyobb mennyiségű termelés érdekében ártalmasan magas kalkiumtartalom mellett háromszor-négyszer nagyobb mennyiségű nitrogént kell felvennie a növénynek. Ezen kívül a talaj kalkiumtartalmának csökkentése még egy sokkal nagyobb problémát megoldásban is segíthet: az egyszerűbbé lenné a termelésre vonatkozó szabványok – a mezőgazdasági termékek. Ehhez a tudományos dolgozók véleménye szerint szükséges, hogy mindenütt pontosan megállapítsák a talaj összetételét és ádolgozzák a műveléskor szükséges adagolási arányát. Ezeknek a méréseknek az elvégzésére az agrárokra vállalkoz minden nagyobb befektetés nélkül képesek, tehát elsősorban a mezőgazdasági dolgozók módjára, hogyan közelítsék a levetett problémákhoz.

(526745)

[illegible]

27/16. oldal, 2017-06-04, Kód: gyógyszerkent-arusitott-patkanymergek-170604

ANTIRANDOM-SRTESSZ-TOLERANCIA MÉRÉS EREDMÉNYEI ALAPJÁN NÉPIRTÁS ELHÁRÍTÁS

A nemzetközi szabadalmaim szerinti mérés egyértelműen mutatja a káliumműtrágyázás mérgező hatásait. A káliumműtrágyázás tönkreteszi a növények alkalmazkodó képességét. Az Antirandom mérésem megjeleníti a fóliaházban (vízmegvonással és túlmelegedni engedéssel) előidézett aszálynál, hogy négy fajta paprika, mind az öt nitrogén és háromféle foszfor műtrágya dózis valamennyi kombinációjában túlélte az aszályt a kálium műtrágyával nem kezelt talajú cserepekben, mialatt a káliummal műtrágyázott talajú cserepekben megritkult, kipusztult. Tehát végzetes kárt okoz a talajhoz adagolt káliumműtrágya aszálykor. Csak kárt okoz a káliumműtrágyázás, végzetesen eladósítja a gazdákat. A magyar termőtalajok többségének 1-6 % közötti a kötött káliumtartalma. Ez óriási mennyiség, amiből automatikusan pótlódik a növények számára optimális vízben oldható kb. 90 mg/talajkg mennyiségű kálium. Kína és az iszlám országok nem használnak számottevő mennyiségű káliumműtrágyát a náluk alkalmazott nitrogén és foszfor műtrágyák mennyiségéhez képest. De akkor miért alkalmazza a többi ország? Azért, mert a műtrágyagyártók, öntözőberendezés gyártók, és növényvédőszergyártók és -árusítók, és a gyógyszergyártók és orvosok gazdagodását szolgálják. A túladagolt kálium a sejtek alkalmazkodó és védekező képességének az elrontásával fejt ki pusztító hatását. Végzetesen rontja a növények, állatok, emberek egészségét a káliummal műtrágyázott talajban nevelt élelmiszer növények megnőtt káliumtartalma! 1950-ben Nobel díjat kapott három tudományos kutató, akik patkányokon és embereken végzett etetési konyhasó- és kálium dózisvariációs hatás méréseikkel egyértelműen bebizonyították, hogy betegítő, életrövidítő és ivartalanító hatású a káliumtúladagolás (és a hiányos konyhasópótlás is). Tehát egyértelműen népiirtó hatású a hazai „Stop só program”, „Menzareform” és „Chips-adó” által a magyar lakosságra rákényszerített káliumtúladagoló és konyhasóhiányos étkezés. De akkor miért alkalmazza a Magyar Kormány? Azért, mert a kálium túladagolás miatt lerövidült életű, utód nélkül kihalt magyarok nyugdíjbefizetései és „elárvult” ingatlanai is a kormány bevételeit gyarapítják. A sok elárvult ingatlant közvetlenül és/vagy ingatlanbefektető spekulánsok közvetítésével eladhatják a népiirtással kiűrt Magyarországra külföldről beözönlő és/vagy becsalt „letelepülési kötvényes” legális migránsoknak.




Jogos védelem (Btk.) és megbízás nélküli kárelhárító ügyvitel (Ptk.) keretében Orbán Viktor miniszterelnök segítségére közérdekű kárelhárító bejelentésként megküldi: Tejfalussy András méréstudományi szakértő feltaláló volt országgyűlési és önkormányzati szakértő (Magyarország 2621. Verőce, Lugosi u. 71.)

Verőce, 2017. 05. 23. (Kód: aszalystresszhatas-es-nepirtas-elharitas170523)

A Tejfalussy András által
felhatalmazott ANTIRANDOM
szervezet alkalmazásával
1992-ben elvégzett
izraeli káliumnitrát- és
káliumklorid hatásmérés
mérőter-elrendezési terv.

Csúcs: Izraeli Káliumnitrát Mérés 92



Változók: nitrát /34%-os N/
foszfát /20%-os P/
káliumnitrát /60%-os K, 11%-os N/
káliumklorid /60%-os KCl/
fajta
H₂O-ellátás

Földhasználati talajtermékenység-vizsgálat
stresszhatással, paprika-jelző-növényekkel
1992. június-július /palántázás: június

All Rights Reserved by A. Tejfalussy, Hungary

J E G Y Z É S K Ö N Y V

Felvéve ATT Verőcsemarosi kísérleti állomásán, 1992. szeptember 9-én, az izraeli káliumnitrát élővilágvédelmi ellenőrző mérésnek az együttes értékelése alkalmával.

Az értékelésen jelen vannak:

Tejfalussy /Sydo/ András ATT elnök

Böröcz Zsuzsanna Antirandom gmk vezető

Pelczéder Tibor növényvédelmi szakértő

Dr. Biczkó Gyula KTM-OTVH főosztályvezető

Dr. Vajna Tamásné a KTM-OTVH élővilágvédelmi szakértője

Rosta László, mint a KTM-OTVH talajtani és növényvédelmi szak-
értője.

A mérőter elrendezésének és az értékelési módszernek/lsd. hát-
oldali segédlet/, a jelenlévők mindegyike közvetlenül ki tudja
olvasni a növényzet látható jellemzőiből /termésmennyiség, levél-
elcsúszódás, megdőlés/ annak interferencia képei alapján
/Interaction Interference Test: IIT/ a következő kalibrálási
eredményeket:

Kettő növény-/paprika-/fajtánál is mutatja a mérőter növényze-
tének a strukturálódása, hogy az izraeli káliumnitrát csak abban
az egy esetben károsítja kevésbé /kevésbé/, mint a káliumklorid/
a növényeket, ha erősen áztatott talajban használják. Egyébként,
a korábban nem trágyázott, ill. még nem műtrágyázott talajon is,
a kálium mindkét főfában történt adagolása erőteljesen csökkentette
már kis, 25-60 kg/hektár dózisainál is, a növényzet alkalmazkodó
és különösen a stressz-tűrő képességét. Ez mind a foszfát, mind
a nitrogén, mind a fajta paraméterek perturbáló hatása esetén jól
láthatóan megmutatkozott. Erőteljesen csökkenti a káliumos műtrá-
gyázás a növényzet asszilyelviselését. Növeli a nitrátfelvételi
veszteségeit, több káliumnál ugyanolyan termés és zöld levél szín
nagyobb nitrogén műtrágya adagokhoz kapcsolódott /vismérgező ha-
tás/. A foszfát műtrágyakomponens 25-80 kg/hektár dózisok kö-
zött növelte a növényzet alkalmazkodó és tűrésszerűségét és produk-
cióját, száraz körülmények között a nitrogén már 75-125 kg/hek-
tár dózis között is pusztította a növényzetet, növelte az asszily-
kárt. Kálium nélkül a növények mindenhol - a vízmennyiségtől függő-
en - kevés műtrágyával is egészségesek, jól produkáltak.

K.m.f.

Tejfalussy /Sydo/ András Böröcz Zsuzsanna Pelczéder Tibor
Dr. Biczkó Gyula Dr. Vajna Tamásné Rosta László

A gyógyszeripar aljas praktikái



Kitálalt egy Pfizer szakértő

Az orvoslás történelmének legnagyobb hamisítási botránya kezd kibontakozni amiatt, hogy a Pfizer gyógyszergyár alkalmazásában álló Dr. Scott Reuben bevallotta, hogy 13 éven át az volt a feladata, hogy kutatási eredményeket és tanulmányokat hamisítson meg azért, hogy a cég gyógyszereit jobban el tudják adni. A Pfizer szövivői irodájának munkatársaként tucatszám jelentett meg orvosi szaklapokban olyan publikációkat, amiknek semmi valóság alapja nem volt.

A vezető amerikai média példaként hozta, hogy Dr. Reuben és csapata 75000 dollárt kapott például a Celebrex nevű gyógyszerrel 2005-ben készített tanulmányukért. A tanulmányban, amit orvosi lapokban jelentettek meg több mint száz orvosra és vizsgálatra hivatkoztak, amiben a Celebrex segített a fájdalmat csökkenteni a műtétek után. Egyetlen probléma van csupán: Soha egyetlen páciensen sem végezték el a vizsgálatot.

Dr. Scott Reuben kitálalt: az egész tanulmány hamisítvány volt és ennek ellenére megjelentették.

Ez nem az egyetlen Dr. Reuben által írt hamis tanulmány volt. A Wall Street Journal megrendelésére írt hamis tanulmányokat a Bextra és a Vioxx nevű gyógyszerekről is.

Ennek hatására két társlap, a Anesthesia & Analgesia és a The Day nevű londoni lapok is lehoztak összesen 31 Reuben által írt cikket, amikről utólag kiderült, hogy általa fabrikált, valóságot egyáltalán nem tartalmazó írások voltak.

Miután a botrány kiderült, állítólag a doki aláírt egy megállapodást, hogy 420 000 dollárt (84 millió forint) visszafizet a megbízójának, de ez már valószínűleg nem menti meg a börtöntől. Elbocsátották munkahelyéről a Baystate Medical Centerből, ahol kényelmes foteljéből osztotta az észet és 250 000 dollár pénzbírság és 10 év letöltendő szabadságvesztés vár rá.

A Celebrex Magyarországon is engedélyezett gyógyszer lett, államilag támogatott és ajánlott készítmény.

Hétköznapi gyógyszerbiznisz

Érdekes, hogy fenti történet miatt csak egy doki kerül börtönbe. A Pfizertől senki, pedig ott is mindenkinek tudnia kellett erről. A szaklapban idézett több száz orvos 13 év alatt egyszer sem jelentkezett, hogy kérem én ott sem voltam!

Ennek a Reubennek lehet, hogy ezer kósza volt csupán ebben az egy gyógyszerüzletben. Vagy társként, vagy csendestársként.

A Gazdasági Versenyhivatal a múlt héten elítélte egy magyar orvost, mert nem tartotta tudományosan megalapozottnak azt, hogy a vitaminjainak gyógyhatást tulajdonított. Az indoklásban az is szerepelt, hogy nemzetközileg elismert tudósoknak szabad csak olyan kijelentéseket tenniük, hogy egy adott szernek gyógyító hatása van.

Ilyeneknek, mint Dr. Reuben és munkatársai.

Ebből a történetből, nem az a tanulság, hogy pár orvos, kutató klinikai kutatásokat hamisított egy gyógyszergyárnak. Nem is az, hogy az úgynevezett tudományos orvosi folyóiratok kiadták a fabrikált tanulmányait. Még csak nem is az a tény, hogy a gyógyszerállalatok dollármilliókat fizetnek ki ezekért a hamisítványokért, amit áttételesen a beteg emberek és a járulékfizető egészségesek termelnek meg.

A történet tanulsága számomra az, hogy ez teljesen általános a gyógyszerüzletben. Dr. Reuben története nem egyedülálló. A gyógyszergyártó cégek jellemzően ezen a módon érik el, hogy eladásuk növekedjen. A termékek engedélyezését végző hivatalok, a minisztériumi munkatársak, mind ezen „tudományos” munkák alapján döntenek. Nemrég jelent meg az a hír, hogy napi egymillió forintban korlátozták az orvosok által felvehető tanácsadói díjat az egyik amerikai egyetemen. Ez igen magas összeg és látszólag van az a pénz amitől ellágyul egy orvos is.

Nekem mindig nevezhetném támad és már tudom is miről van szó, amikor „tudományos bizonyítékon alapuló” kijelentéseket hallok és a természetes gyógymódokat pedig elítélő kijelentéseket. Ha illet hall, tudhatja, hogy Dr. Reubenhez hasonló fizetett orvosok által kreált hamisítványokról van szó valójában és a tudomány annyi van benne, mint egy Irigy Hónaljmirigy műsorban.

A csaló orvosok száma igen nagy. Tulajdonképpen nélkülük nem is működne egyetlen gyógyszeripari cég sem. Nélkülük nem lehetne marketing üzeneteket gyártani és a gyógyszer engedélyezési hivatalok sem tudnának miből dönten. A Dr. Reubenhez hasonló gyógyszerreklám arcok nélkül megakadna a profitgépezet, esnének a résvények a piacon és igazgatói, miniszteri székek kerülnének veszélybe.

Tényleg nem figyelték meg, hogy két héttel ez előtt megjelent egy rövid hír, miszerint sikerült eladni meg nem nevezett külföldre a H1N1 vakcinánkat? És lám, azóta nemhogy senki meg nem halt a hírekben új influenzától, de még megbetegedésekről sem hallani. Addig kellett a hisztériát fenn-

tartani, amíg a marketingnek erre szüksége volt.

Nem csodálkoznék, ha pár éven belül kiderülne, hogy ezt is egy hamisított jelentés indította el és rács mögé kerülne a tisztifőorvos vagy a miniszter úr, akik leghangosabban reklámozták a terméket.

Ha valaki nekem azt mondja, hogy „tudományos bizonyítékokon alapuló...” én nevetek és azt mondom: Dr. Reuben?

Mi a „tudományosan megalapozott” jelentése?

Maradva az orvosi szakkifejezéseknél, a recept a következő: Fabrikálj egy bizonyítékot. Jelentesd meg egy orvosi szaklapban. Ez után már hivatkozhatasz rá bulvár médiában és ezerszám megjelentetheted, mint tény. Erre fog hivatkozni a miniszter, ezt fogja idézni a tisztifőorvos és minden jó tanuló az orvosi egyetemen. És ez egészen addig fennmaradhat, amíg ki nem tálalsz, hogy vicc volt az egész. De addigra már sok-sok dollárt kerestél rajta és ki tudod fizetni a büntetést is.

Amikor egy ismerős arc a televízióban azt hajtogatja, hogy a védőoltás tudományos alapon biztonságos, vagy azt, hogy a patkányméreg tudományos alapon kis mennyiségben gyógyszer, akkor tudhatjuk, hogy valószínűleg Dr. Reuben és munkatársainak hamisított eredményeire alapozva mondják ezt.

Korrupció ára: százezer forint óránként

Egy amerikai kongresszusi vizsgálat az etikátlan orvosi magatartás nyomába eredt és kiderült, hogy az orvosok úgy kapnak pénzt gyógyszergyáraktól, hogy nevükön és beosztásukon kívül semmit nem tesznek érte. A vizsgálat eredményeként az egyik amerikai egyetemen belső határozatot hoztak arról, hogy a gyógyszergyártó cégek nem fizethetnek többet óránként 500 dollárnál (100 000Ft) és naponta 10 óránál többet (1 millió forint naponta) olyan orvosoknak, akik szakértőként vagy tanácsadóként a nevüket adják egy-egy gyár termékéhez.



Korrupció:

maximum 1 000 000,- Ft naponta

Hogy is néz ki egy ilyen megállapodás? Ül egy doki valamelyik egyetem (esetünkben a bostoni) irodájában a székében. Szinte mást nem is kell tennie, csak ülnie. Az átlagember már attól hanyatt esik, hogy aki a terméket ajánlja neki, az orvos és egyetemi tanár. Az „orvos” és az „egyetem” szavak azt jelentik az emberek számára, hogy valami megbízható és igaz. Ezt használja ki a gyógyszergyártó marketing. A tény az, hogy ez a rendelet 25 orvost és egyetemi tanárt érint. Nekik e rendelet miatt esni fog a jövedelmük. Maximum naponta 5000 dollárt utalhat nekik a megbízójuk. A rendelet azt is megtiltja, hogy az orvosok az adott gyár képviselőjében az országot járva a terméket népszerűsítsék.

A rendelet megalkotóit látszólag nem zavarta az, hogy összeegyeztethetetlen etikai az, hogy egy egyetemi tanár és orvos nem lehet egyszerre egy gyógyszergyártó cég ügynöke is. Ez a két feladat teljesen ellentmond egymásnak. Míg egy részvénytársaság célja az egy részvényre eső profit növelése, addig egy orvos feladata a beteg érdekeinek védelme lenne - de lehet, hogy rosszul gondolom. Az pedig szinte biztos, hogy egy orvos sem marad pártatlan és objektív, ha a zsebében egy gyógyszergyár tömi, mindegy mekkora összeggel. A rendelet

megalkotó ezt az ellentmondást nem oldják fel, csupán egy alacsonyabb szinten maximalizálják a korrupcióra szánható pénzeket.

Szerencse, hogy ez csak Amerikában van így

Hogy a jelenség nem amerikai, arra jó példa egy közelmúltbeli történet, amit személyesen éltem meg. Egy marketing konferencián az előadó a beszédében példaként említette a fentihez hasonló esetet, miszerint a gyógyszergyárak az orvosokat ilyen-olyan indokkal fizetik vagy utaztatják, amikor is a közönségből felállt egy orvos-látogató és tiltakozását fejezte ki, hogy ez régen volt, de ma már ilyen nincs, kéri a megjegyzést törölni a felvételtől.

Szünetben megkerestem és elmeséltem neki, hogy mindössze egy hónappal korábban sikerült last-minute szereznünk egy ciprusi nyaralást, ami azért volt érdekes, mert rajtunk és 4-5 utazási irodás alkalmazotton kívül 400 gyógyszerész és orvos volt a két charter járaton. Hogy ne feledjem el, hogy ki fizette, a mai napig hordom a Sanofi-Aventis logóval jelölt pólómat, amit tévedésből én is, mint mindenki kaptam a repülőgépen egyéb apró ajándékokkal együtt.

Vajon miért mondta, hogy nincs ilyen?

Warfarin: patkányméreg receptre

A legnagyobb magyar egészségportálok lelkesen visszhangozzák, hogy az omega-3 értéktelen, a ginkgo biloba veszélyes - pedig a korrekt tudós szakemberek szerint pontosan ezek a legfontosabb táplálék kiegészítők közé tartoznak az aloe verával és sok más ősi természetes gyógynövénnyel együtt. És ugyanitt, ezeken az „egészség”portálokon a gyógyszergyári reklámokban a warfarint reklámozzák, ami tulajdonképpen patkányméreg!!!.

* A Warfarin (Aldocumar, Coumadin, Panwarfin) tulajdonképpen patkányméreg. Ez nem egy városi legenda, hanem kémiai tény. Megtalálható a biocid anyagok jegyzékében (12. számú melléklet a 38/2003.(VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelethez).

A „biocid” anyag jelentése az, hogy bizonyos élőlénycsoportokat szelektíven károsító anyag. Amikor egy patkány megeszi, belsőleg elvérzik, mert a vére nem tud meg-alvadni. Éppen úgy, mint azoknak az embereknek, akik túlادagolják.

Érdekes, hogy a webbeteg.hu vagy a hazipatika.hu sosem ír arról, hogy a patkányméreg fogyasztása veszélyes lenne. Bezzeg az Omega3-at, Ginkgo bilobát, aloe verát és másokat igenis a legfontosabbak közé sorolják!

Miért mond nemet egyre több ember a H1N1 védőoltásra?

Miközben a gyártó pereket helyezett kilátásba azokkal szemben, akik nyilvánosan kétségbe merik vonni a vakcinájuk biztonságát, az ANTSz pedig honlapján adóforintokból reklámozza őket, az derült ki felmérésekből, hogy a vártnál nagyságrendekkel kevesebben igénylik az oltást. Ez aggodalomra adhatna okot, ha nem lenne mind-egy, hogy eladják a vakcinát vagy sem. Hiszen ki van fizetve. Most azt hallottam, hogy az EU szerint a vakcinával rendelkező szerencsés országoknak humanitárius segítségként adniuk kellene azoknak az országoknak, akiknek nincs. Hogy ott is beindulhasson az üzlet és lehessen reklámozni a betegséget. Egy ampullát ezen a módon többször is el lehet majd adni? A magyar

adófizetők pénzén előállították, majd humanitárius okból átadjuk mondjuk Szlovákiának, ahol ismét el lehet adni?

Amíg az egészségpolitika kitalálja, hogyan szabaduljunk meg a vakcináktól, már amennyiben nem igénylik a magyarok, eszembe jutott egy vicc, amit a Kossuth Rádióban hallottam és még ma is fent van a rádió honlapján: Falus doktor nyilatkozta, hogy „az oltás egyébként nem létező mellékhatásai sokkal kisebb veszélyt jelentenek a kismamákra, mint az influenza maga“. Ez a mondat javítás nélkül félóránként lement a múlt héten a hírekben. Csak nekem tűnik fel az ellentmondás abban, hogy ha valami nincs is, az hogy lehet kisebb vagy nagyobb valaminél?

Lássuk, mi az öt legfőbb oka, ami miatt nem adják be maguknak a gondolkodó emberek az oltást:

„A H1N1 új influenza (leánykori nevén sertésinfluenza) járvány veszélyes és halálos.“

A valóságban, bár a H1N1 fertőzési aránya magas, a halálozási aránya rendkívül alacsony. Valójában, nem magasabb, mint egy normális, idényjellegű influenzának.

„A vakcina megvéd a fertőzéstől“

A gyártói adatokon kívül nem jelent meg egyetlen tudományos publikáció sem az oltás hatékonyságáról. Nem is vizsgálta senki, hogy a valódi vírussal szemben ad-e bármi védettséget a vakcina. A beoltott emberekben kifejlődő antitestek jelenléte nem jelenti azt, hogy nem fognak megbetegedni. Az így fabrikált immunrendszer hatékonyságát úgy lehetne vizsgálni, hogy az önkénteseket, akiket kipróbálták az oltást, meg is kellene fertőzni a tényleges vírussal, de ezt etikai okokból nem végzik el.

„A vakcina tökéletesen biztonságos, még gyerekek számára is.“

Ez a legnevetesegebb kijelentés. Anélkül nevezni valamit biztonságosnak, hogy nem vizsgáltuk a hosszabb távú hatásokat, mérés dolog. Számos orvos adott hangot az elmúlt hetekben aggodalmának, a teljes sejt-oltások problémájának. Miközben eddig ez tiltott eljárás volt 3 éves kor alatt, most csecsemőknek, sőt várandós kismamáknak is ajánlják.

„Nincs semmi más védekezési mód, csupán a védőoltás.“

Ez egyenesen hazugság. A cél: minél több védőoltás eladása. Számos gyógynövény létezik, ami még a kereskedelemben kapható mennyiségben is alkalmas az influenza kivédésére, talán nagyobb arányban, mint a védőoltás. A Ginzeng-arany Chia, az aloe vera, astragalus, a bíbor-kasvirág (echinacea suprem), D-vitamin és a cink messze biztonságosabb ellenszere a vírusos megfázásoknak.

„Ha nem adatod be magadnak az oltást, másokat veszélyeztetsz.“

Ez ostobaság. Gondoljunk csak bele abba, hogy az eddigi fertőzöttek családtagjai sem kapták meg a fertőzést, miközben egy lakásban éltek és egy tálból cseresznyéztek az áldozatokkal. A helyzet éppen az ellenkezője annak, amit a propaganda állít. Aki megveszi és beadatja magának, az pénzügyileg is támogatja a vakcinaipart és azt éri el, hogy a mostani mizéria kimerülése után ennek sablonján ki fognak találni egy új, még veszélyesebb vírust, ami ellen újra el lehet adni egy védőoltást és ezt akár két-évente el lehet majd játszani a félművelt emberekkel.

Abban reménykedni, hogy egészségesek maradunk azáltal, hogy pénzt adunk egy oltóanyaggyártónak éppen olyan ostobaság, mint pénzt küldeni egy fegyvergyártónak azért, hogy támogassuk a világbékét.

Persze más lenne a helyzet, ha tényleg háború lenne. Amennyiben valaki állig felfegyverkezve sorakozna határainkon, én is szívesen adnám a pénzem fegyverekre, ha nem jutna jobb az eszembe. Ha egy tényleg járványos fertőzésre alkalmas vírus ellen kellene védekezni, talán lenne értelme a lakosság oltásának. Az ilyen vérlázító vaklármával csak azt érik el, hogy ha tényleg lesz egy komoly járvány, akkorra az emberek már nem fognak hinni nekik...farkast kiáltani feleslegesen csak 1-2szer lehet! De jelenleg nincs járvány, úgy tűnik lassan egy év alatt sem sikerült ezt elintézni.

Akkor mi ellen is hadakozunk?

NATURHÍREK.HU

http://www.hazipatika.com/tudastar/kalium_tuladagolas/40684





**KÁLIUM: EBBŐL SEM JÓ
A TÚL SOK**

A hiperkalémia tulajdonképpen azt jelenti, hogy a vérünkben a normálisnál magasabb a kálium szintje. Ez viszonylag gyakori betegség, de szélsőségesen súlyos esetben akár halálhoz is vezethet.



Létrehozva: 2015. július 28. 10:51

Módosítva: 2016. április 17. 12:37

Kálium: ebből sem jó a túl sok

Hiperkalémia: amit tudni érdemes róla

A hiperkalémia tulajdonképpen azt jelenti, hogy a vérünkben a normálisnál magasabb a kálium szintje. Ez viszonylag gyakori betegség, de szélsőségesen súlyos esetben akár halálhoz is vezethet.

Normális esetben a szervezetünkben, pontosabban a vérünkben a kálium szintje 3.5-5 mEq/L között mozog. Ha ennél magasabb a kálium szintje, akkor hiperkalemiáról beszélhetünk, ez lehet enyhe, közepes vagy súlyos mértékű.

A káliumnak nagyon fontos szerepe van a szervezetünk egészségének megőrzésében, például hozzájárul az izmok, a szív és az idegek **megfelelő működéséhez** is. Ahhoz is kálium szükséges, hogy az idegsejtek sikeresen továbbítsák az elektromos impulzusokat. Mivel a kálium nagyon fontos ahhoz, hogy a szívritmusunk megfelelő legyen, akár túl kevés, akár túl sok van belőle, az szabálytalan, **abnormális szívritmust** okozhat. Ez attól függően, hogy milyen mértékű a hiperkalémia, csak EKG-n észrevehető kilengésektől akár a szív megállásáig is okozhat eltéréseket. A hiperkalémia emellett megzavarhatja a vázizomzat működését, és akár - időszakos - bénulást is okozhat.

A szervezetünk sokkal jobban tolerálja, ha a káliumszint lassan, fokozatosan emelkedik, mintha hirtelen felugrik. Lassú emelkedés jár együtt például a **veseelégtelenséggel**. Mivel a káliumszint lassú emelkedése nem jár együtt komolyabb tünetekkel, **sokszor csak akkor veszik észre, ha baj van**, amikor már nagyon magas a káliumkoncentráció a szervezetben. A hiperkalémia sok esetben nem jár együtt tünetekkel, vagy a tünetek nagyon általánosak, például hányinger, fáradékonyság, izomgyengeség, bizsergő érzés. Súlyosabb hiperkalémia esetén a szívverés lelassul és a pulzus gyengén érezhetővé válik. Nagyon súlyos esetben a hiperkalémia a szív megállásával is együtt járhat.

A magas káliumszintet **okozhatja** veseelégtelenség, a **mellékvese betegségei**, vagy akár gyógyszerek is. A problémák sokszor össze is adódnak, például ha egy vesebetegnek olyan gyógyszert kell szednie, mely emelheti a vér káliumszintjét, akkor nála sokkal gyorsabban alakulhat ki hiperkalémia.

Vannak olyan betegségek is, melyek a testünk sejtjeiben lévő káliumot "eltávolítják" a sejtekből, így az bekerülhet a véráramba. A véráramban nagyjából a szervezetünk káliumtartalmának **két százalékáa található**, a többi a sejtekben van, de ez az egyensúly könnyen megbomolhat. Ezt a jelenséget okozhatja például a **diabéteszes ketoacidózis**, de a sejtek pusztulásával együtt járó sérülések, égések, hemolízis vagy rhabdomyolysis is.

A vér káliumszintjét megemelő gyógyszerek közé tartoznak például bizonyos vízhajtók, nem szteroid gyulladásgátlók, vagy ACE-gátlók is. A káliumszintet növelik emellett a **káliumban gazdag élelmiszerek**, a káliumtartalmú **étrend-kiegészítők**, vagy azok a szerek, melyeket a sók visszapótlására szednek.

Mivel a magas káliumszint gyakran egy másik betegség tünete, ezért a kezelése is nagyban függ attól, hogy milyen okok húzódnak meg a kialakulásának a hátterében. **A terápia függ** az érintett beteg általános egészségi állapotától, a vérvizsgálati eredményektől, illetve attól, hogy milyen súlyosnak tekinthető a hiperkalémia. Az enyhe fokú hiperkalémia, különösen, ha nem társul mellé más betegség, nem igényel kórházi kezelést. Súlyosabb esetekben, vagy ha az érintettnek vesebetegsége van, esetleg **cukorbeteg**, kórházi tartózkodásra is szükség lehet, mert a nagyon magas káliumszint akár az életet is veszélyeztetheti.

A terápia során az **étrendet úgy kell összeállítani**, hogy az káliumban alacsony legyen, emellett be kell fejezni a káliumszintet megemelő gyógyszerek és étrend-kiegészítők szedését. Előfordulhat, hogy intravénás glükóz, inzulin, illetve kalcium beadására is szükség van, az első kettő segítségével "visszaterelhető" a kálium a sejtekbe, míg a kalcium a szívet és az izmokat védi meg. A gyógyszeres kezelés célja lehet a kálium kiürítése a szervezetből. Nagyon súlyos esetben, vagy amikor már a veseműködés is leállt, [dialízisre](#) van szükség.

HOZZÁSZÓLÁS

Gratulálok, hogy másnak is volt mersze megírni az igazat, a valós tényeket a kálium túladagolásról, de sajnós a cikkhez csatlakoztatott „**Mindent a káliumról**”, A kálium körülbelül 150 grammnyi mennyiségben található meg a szervezetben, szinte kivétel nélkül a sejteken belül, a sejtplazmában oldva. A folytatásért **kattintson!**” függelék teljesen félrevezeti az olvasót, az életveszélyesen hamis „napi kálium dózis” ajánlásaival!

Felnőtt egészséges ember EKG-je is eltorzul napi 5 - 8 grammnyi kálisóval szózástól, lásd Magyar Petrányi: a Belgyógyászat alapvonalai-2, Hyperkalaemia. ", 2,2, - 3,5 gramm szájon át történő napi káliumbevitel. Egy óra alatt bárhol a vérbe jutó 20 - 40 mval (0,8 - 1,6 grammnyi) vagy több kálium már veszedelmes hyperkalaemiát okoz. Lásd Varga Péter és társai: az Intenzív betegellátás elmélete és gyakorlata, Hyperkalaemia). Az Orvosi Kamara válasza sem méltatja, hogy tiltakoztunk a napi legalább 4,7 gramm kálium akármilyen gyors bejuttatását előíró Stop só, Menzareform, Chips adó csalások ellen, amit a kormány a sajtóban félmilliárd forinttal finanszíroz, lebeszélve a napi 5 grammnál több konyhasó pótlásról a magyar lakosságot, holott napi 3 liter Ringer infúziós oldatban 27 gramm a konyhasó és csak 0,36 gramm a kálium. Azért ennyi, mert ez az arány a testnedvekben, a vérszérumban. 1950-ben Nobel díjat kapott három kutató, akik patkányokon és embereken végzett dózis variációs kísérleteik nagyszámú hatás mérési adatai alapján bebizonyították, hogy a növelt káliumbevitel és a nátriumbevitel csökkentés magas vérnyomást is okozó, életrövidítő és nemiség eltorzító, fajirtó hatású. Vagyis tudatos fajirtás a Stop só, Menzareform és Chips adó csalás. Az idézett és további bizonyítékok is közzé vannak téve a www.tejfalussy.com honlapomon!

Verőce, 2017-06-04.

Tejfalussy András

 SZŰRŐVIZSGÁLATOK • PROBIOTIKUMOK • NAPI EGÉSZSÉG • ÉLETMÓD • TÁPLÁLKOZÁS • PSZICHÉ • BETEGSÉGEK A-Z

☒ Közzététel a Facebookon is Küldés

**András Béla S. Tejfalussy** · Budai Nagy Antal Gimnázium

Gratulálok, hogy másnak is volt mersze megírni az igazat, a valós tényeket a kálium túladagolásról, de sajnós a cikkhez csatlakoztatott „Mindent a káliumról”, A kálium körülbelül 150 grammnyi mennyiségben található meg a szervezetben, szinte kivétel nélkül a sejteken belül, a sejtplazmában oldva. A folytatásért kattintson!” függelék teljesen félrevezeti az olvasót, az életveszélyesen hamis „napi kálium dózis” ajánlásaival!

Felnőtt egészséges ember EKG-je is eltorzul napi 5 - 8 grammnyi kálisóval szózástól, lásd Magyar Petrányi: a Belgyógyászat alapvonalai-2, Hyperkalaemia. ", 2,2, - 3,5 gramm... Bővebben

Tetszik · Válasz · épp most

Miért és mikkel irtják a magyarokat a kormány által betelepülni engedett „kiválasztottak”

Lásd 2 Mózes 23/20-33, 5 Mózes 7/1-36, Talmud Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap:
Csak az él hosszú ideig, csak az marad szaporodóképes, csak az gyógyulhat ki a betegségekből, aki tiszta (desztillált) vizet iszik és az élelmiszereit tiszta nátrium-klorid konyhasóval helyesen sózza.

A helyes víz:konyhasó pótlási arány 110, infúziónál is (Salsol, Salsola, Ringer) és étkezésnél is, s 30-szor annyi konyhasót kell pótolni, mint káliumot. Például a napi 3 liter Ringer infúziós oldattal, desztillált vízzel, 27 gramm konyhasót, de csak 0,36 gramm káliumot juttatnak be a vérbe.

Nemrég közzétették, hogy 153 egészségesnek látszó magyar fiatallemberről, akik spermadonornak jelentkeztek, a mérés 150 spermáját minősítette az egészséges utód létrehozására alkalmatlannak. Az oka is nyilvánvaló: 1950-ben Nobel díjat kaptak a kutatók, akik patkányokon és embereknél is bebizonyították a káliumtúladagoló és konyhasó hiányos étkezés életrövidítő és ivartalanító hatását.

Mindegyik lelkész aljas bűnöző, aki tudja ezeket, de nem világosítja fel a hitközségéhez tartozókat, hogy a „nemzeti kormány” kálium túladagolással és konyhasó pótlás akadályozással életrövidíti és ivartalanítja a magyarokat, s mindazok a hivatalnokok is aljas bűnözők, akik tudják ezeket, de nem lépnek fel a Stop só, Menzarefom, Chips adó csalások ellen. Mindegyikük aljas bűnöző, aki a tiszta víz ivás és tiszta konyhasóval rendesen sózás akadályozással a magyarokat irtó „kiválasztottak” bűnszervezetét szolgálja.

Verőce, 2017-06-04.

Tejfalussy András okl. vill. mérnök oknyomozó mérnök feltaláló, volt országgyűlési és önkormányzati szakértő, számos nemzetközi méréstudományi szabadalom szerzője, Dr. Tejfalussy Béla táblabíró és Bartha Béla rendőrfőkapitány unokája, (Lásd: <http://www.tejfalussy.com/regiweboldalok/aquanet-apla/aquanet-2-apla/aquanet-2/szoveg1/tejfalussy-andras.htm>)

