

Nyílt levélként Lezsák Sándor országgyűlési képviselőnek közvetlenül is megküldve

Miután újabban válaszra sem méltatjátok a Mózesi-talmudi fajirtó terrorizmus Nobel-díjas mérési bizonyítékait*, közérdekű bejelentésként felteszem felétek a ki is „óriásplakátozható” mindenki által érhető egyszerű, de közönséges kérdést:

„A FIDESZ-KDNP vezetősége is a népirtásra alapozó ingatlanspekulánsok seggét nyalja?”

*A nagyszámú hatás-okozat mérés tudatos mérgezést bizonyító eredményeit lásd <http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2017/02/PPA-170224sum.pdf>

Verőce, 2017.06. 27.

Jogos védelemként (Btk.), megbízás nélküli ügyvitel (Ptk.) keretében közzéteszi:

Tejfalussy András
oknyomozó mérnök feltaláló
volt minisztériumi, országgyűlési és önkormányzati szakértő



Kód: hihetomagazin-2


Előzmény

Az Antall kormány idején személyesen is felhívtam a figyelmed a káliumot mérgezően túladagoló műtrágyázás és étkezés mérgező hatásait bizonyító hatásmérésekre, lásd mellékletek. A Nemzetközi Műtrágya Szövetség által közzétett diagramokra is. Ez utóbbiak szerint Kína és az iszlám országok (a nitrogén és foszfor műtrágyákhoz képest) csak elhanyagolható mennyiségű „kálium műtrágyát” használnak. Az MDF piac szervezését is végző saját szakértőd, majd Surján László, Gergátz Elemér és Keresztes K. Sándor miniszterek is akadályozták a védekezést (8253. válasz, 1992. december 8.). Az interpellációra válasz várás közben a feleségemet súlyos baleset „érte”. A hivatalok eltüntették a rendőrségi jelentést, ami szerint három személy egy gép elrontásával okozta a balesetét. A bíróság irat félre iktatási stb. csalásokkal hárította el a baleset okozói elleni kártérítési pert. Közben Gergátz Elemér miniszter Kamara János, majd Kuncze Gábor belügyminiszter segítségével az ügyészekkel „gondnokság alá helyezési pert” szerveztetett ellenem. A rendőreitek bilincsben hurcoltak el a „per” tárgyalására. Miután előtte az irodámban, majd a Bp. III. ker. Rendőrségen agyrázkódásosra vertek-

rugdostak. (1997. szeptember 10-én). Így is belebuktattam őket a perbe. Közben az III. ker. OTP 514.000 Ft-ot lelopott a (11703006-20014400) számlánkról. Göncz Árpád hamis irata (X-389/98.) máig is fedezi a veretőket és a verőket. Az OTP-s lopást pedig az I-XII. Ker. Ügyészség vezetője hamis irata (B.I. 252/1992.) fedezi. Utóbbiban azt hazudják, hogy az én tartozásom volt az OTP által tőlünk ellopott pénz. A verő rendőröket egy katonai ügyész, dr Félix Roland úgy fedezte, hogy az ellenük tett feljelentést áttette a polgári ügyészségre. Ott a rendőrök ellenem tett feljelentéseként bírálhatták csak. Mmivel én nem vertem őket, ejthették vádat. A rendőrségi és ügyészségi vezetők e hónapban újra megkísérelték, hogy a hamis vádaskodásaikkal „bolonddá nyilvánítsanak”. Ebbe is belebuktak. Mindezek: csalás, csalás, csalás, gyilkolás, gyilkolás, gyilkolás, politikai pszichiátria, politikai pszichiátria, politikai pszichiátria, rablógyilkosság, rablógyilkosság, rablógyilkosság. Az ígért jogállam helyett – izraeli mintára – „talmudi terrorizmus” valósult meg Magyarországon.

Melléklet-1:

A kálisó növénymérgező hatását megjelenítő általam feltalált Antirandom hatásmérés:



Láthatóan jobban tolerálják a növények a kálisóval nem kezelt parcellákon a tőszám változást, a nitrogén dózis változás és a foszfor dózis változást is a nagy termés tartományban (a feketével jelölt parcellákon több volt a termés 125 mázsa/hektárnál! Mindenféle növényekkel további több tízezer parcellát megmértünk. Mindig, mindenhol bebizonyosodott a káliumműtrágyák kártékony hatása!

Például nem csak a nitrogén és foszfor műtrágya dózis változásokat, de a túlmelegedést, az aszályt is jobban tolerálják a kálisóval nem műtrágyázott cserepekben nevelt növények. A kálisóval kezelt cserepekben láthatóan sínylődtek és/vagy kipusztultak a növények. Mind a négy paprika fajtánál a Kertészeti Egyetem udvarán 1983-ban megvalósított Antirandom Stressz Monitor mérés során és a saját kutatóintézetünk verőcei fóliaházában megismételt mérésnél is, lásd 2. és 3. melléklet :


Melléklet-2:

ASZÁLYHATÁS-STRESSZT KALIBRÁLÓ ANTIRANDOM SOFTWARE

A kálisó mentes cserepekben mind a négy paprikafajta túlélte az aszályt!

fajta-1.

fajta-2.



P.	K.
2	2
1	2
0	2
1	2
2	2
2	1
1	1
0	1
0	0
1	0
2	0
2	0
1	0
0	0
0	1
1	1
2	1
2	2
1	2
0	2
0	2

All Rights Reserved!
Tejfalussy András
Hungary, 1982.

Kód: aszalyhatas-
streszt-kalibralo-
antirandom-sw-
83-paprika

fajta-3.

fajta-4.



0012344-N-4432100

A káliumklorid (és a káliumnitrát műtrágya is) katasztrofálisan csökkenti nem csak az aszály-, de a nitrogén és foszfor műtrágyák elviselését is!



Code: PaprikaToleranceMeasuring83a

"OK-OKOZAT KALIBRÁLÁSI
ANTIRANDOM SOFTWARE"
szerinti tolerancia-mérés (1983.
Budapesti Kertészeti Egyetem.)
All Software Rights Reserved!
Tejfalussy András, Budapest.

J e g y z ő k ö n y v

Felvéve ATT Verőcsebarosi kísérleti állomásán, 1992. szeptember 9-én, az izraeli káliumnitrát élővilágvédelmi ellenőrző mérésének az együttes értékelése alkalmával.

Az értékelésen jelen vannak:

Tejfalussy /Sydo/ András ATT elnök

Böröcz Zsuzsanna Antirandom gmk vezető

Pelczéder Tibor növényvédelmi szakértő

Dr. Bicsók Gyula KTM-OTVH főosztályvezető

Dr. Vajna Tamásné a KTM-OTVH ^{mezőgazdasági felügyelő} ~~élővilágvédelmi szakértője~~

Rosta László, mint a KTM-OTVH ~~talajtani és növényvédelmi szak-~~
~~értője~~ ^{Élővilágvédelmi Főosztály főmunkatársa}

A mérőtér elrendezésének és az értékelési módszernek /lásd. hátoldali segédlet/, a jelenlévők mindegyike közvetlenül ki tudja olvasni a növényzet látható jellemzőiből /termésmennyiség, levél-elcsíneződés, megdőlés/ annak interferencia képei alapján /Interaction Interference Test: IIT/ a következő kalibrálási eredményeket:


Kettő növény-/paprika-/fajtánál is mutatja a mérőtér növényzetének a strukturálódása, hogy az izraeli káliumnitrát csak abban az egy esetben károsítja kevésbé /kevésbé, mint a káliumklorid/ a növényeket, ha erősen áztatott talajban használják. Egyébként, a korábban nem trágyázott, ill. még nem műtrágyázott talajon is, a kálium mindkét formában történt adagolása erőteljesen csökkentette már kis, 25-60 kg/hektár dózisainál is, a növényzet alkalmazkodó és különösen a stressz-tűrő képességét. Ez mind a foszfát, mind a nitrogén, mind a fajta paraméterek perturbáló hatása esetén jól láthatóan megmutatkozott. Erőteljesen csökkenti a káliumos műtrágyázás a növényzet asszilyelviselését. Növeli a nitrátfelvételi veszteségeit, több káliumnál ugyanolyan termés és zöld levél szín nagyobb nitrogén műtrágya adagokhoz kapcsolódott /vismérgező hatás/. A foszfát műtrágyakomponens 25-80 kg/hektár dózisok között növelte a növényzet alkalmazkodó és tűrőképességét és produktívát, száraz körülmények között a nitrogén már 75-125 kg/hektár dózis között is presztitotta a növényzetet, növelte az asszilykárt. Kálium nélkül a növények mindenhol - a vízmennyiségtől függően - kevés műtrágyával is egészségesek, jól produkáltak.

K.m.f.

..... Tejfalussy /Sydo/ András	 Böröcz Zsuzsanna	 Pelczéder Tibor
..... Dr. Bicsók Gyula	 Dr. Vajna Tamásné	 Rosta László

Melléklet-4:

Doktori disszertáció is létezik a talaj vízben oldható (ún. „kicserélhető”) kálium tartalmát növelés aszálykár, növénypusztulást fokozó mérgező hatásáról:



A kálium.

Gyümölcsfaíink pusztulásában nagy jelentőséget tulajdonítok a káliumnak. Erre a megállapításra az a megfigyelés indított, hogy klorózisos és pusztuló gyümölcsfaíink leveleinek káliumtartalmuk kétszerese az egészséges gyümölcsfalevelek káliumtartalmának. A káliummal egyidejűen vizsgált kalcium, fosfor, magnézium és nátrium tekintetében minsem ilyen nagy különbség a vizsgálati eredmények között. Rendkívüli mértékben aszimmetikus a 29. szilvaféle szilvaféle káliumtartalma és a vizsgált káliumtartalma, ugyanis ezek az értékek olyan magasak, hogy ennél a szilvánál agyagszilva esetére kell gondolni.

As előzőekben említett vizsgálati adatok a következőképpen alakulnak.

A legnagyobb kicserélhető káliumértékek általában a felső talajrétegekben mutatkoznak/ a 20 cm-ig, 4-5 "8" érték $\frac{\%}{\text{cm}}$, kivéve a 29. pusztuló szilvaféle szilvaféle, ahol a 70-85 cm-ig terjedő talajban jelentkezik a maximális kicserélhető kálium, mégpedig 14,32 $\frac{\%}{\text{cm}}$ értékkel.

/Mivel a kálium mennyiségét légfotométeres méréssel határoztam meg, ahol a magas humusztartalom - színes hatás miatt - zavaró lehet, ezért a Talajvizsgálati módszertan vizsgálati leírása szerint /74/ a humuszt hidrogénhiperoxiddal elrontottam./

Code: mullerne2

Egy Szlovák Tudományos Akadémiai kutató mérnök is fellépett a mérgező kálissóval műtrágyázás ellen:

A mi Antirandom méréseink eredményeinek a Falurádióban közzététele után beismerte egy szlovákiai kutató alábbi cikke, hogy a talajvíz kálium tartalmát a 90 mg/kg természetesnél nagyobbra növelve a "műtrágyaként" adagolt káliumvegyületekkel számos betegség lehet okozni a növények, de az állatoknak és az emberek részére is, ez utóbbiakat meddővé is teszi, s a hagyományosnak a többszöröseire növelhető vele a termesztési önköltség.
Budapest, 2007. 02. 19. Tejfalussy András /mérési szakértő/

A termőterületek műtrágyázásával, illetve a terméseredmények szempontjából a komázás optimális mértékével és ennek környezeti hatásaival nem egy szakcikk érkezik, vagy talus szemelgetés foglalkozik a sajtó hasábjain. A műtrágyázás egyik különösen negatív hatásaként a zöldségfélékben és egyéb növényi termékekben feltehető nitrogénzármarazékokat nevezik meg, s ezzel összefüggésben felhívják a figyelmet a nitrogéntartalmú műtrágyák túlzott alkalmazására.

A Szlovák Tudományos Akadémia Kísérleti Növénykerti és Rovartani Intézetében elért legújabb eredmények azonban egy másik „bűnösre” mutatnak rá, amely részt vállal a modern mezőgazdaságban mutatózó negatív jelenségek szinte mindegyikéből. Ez a figyelemre és főleg ellenőrzésre méltó elem – Ján Kráľovičnak, az említett Intézet munkatársának véleménye szerint – a kálium, amelynek problémájával már évtizedek óta foglalkoznak.

Gond a tejjel

A probléma bevezetőjében el kell mondani, hogy a cseh-szlovák mezőgazdaság a műtrágya-felhasználása, a gyom és rovarirtószerek alkalmazása területén is túl van azon a határon, amit a termelés mennyisége és minősége szempontjából optimálisnak nevezhetünk. Általában elterjedt nézet – mivel a termékekben magas a nitrátok aránya – hogy a talaj nitrogénrel van túlterhelve. A nitrátok problémája természetesen komoly és aktuális, de a legújabb eredmények arra engednek következtetni, hogy ebben is a túladagolt kálium, illetve néhány helyen foszfor hatását kell látnunk.

Közdött, hogy viszonylag magas színvonalú nálunk a növénytermesztés, de problémáink vannak az állattenyésztésben, ahol a világ fejlett országaival való összehasonlítás nem éppen jellező a számunkra. Ez leginkább a tömegkaraményok minőségével kapcsolatban áll. Biztos, ki, a tejtermeléshez például sokkal több erőtlenkarménlyt használunk fel, mint más fejlett szarvasmarha-tenyésztéssel rendelkező országok, mivel tömegkaraménylyal nem tudjuk elérni a kívánt teljesítményt. A szárlott tömegkaraménylyt ugyanis nálunk 25-30 gramm káliumot is tartalmaz kilogrammonként, noha az optimális mennyiség 10-15 gramm között lenne. De ugyanígy probléma a burgonya keményítőtartalma, illetve a cukorrépa cukortartalma, sőt még a gabona kora érése is, amely utóbbi leg-

főbb feltételek veszteségeit okoz hektáronként. Mindez Kráľovič mérnök szerint a káliumtartalomra vezethető vissza.

Hiányzó mikroelemek

A kálium az az alapvető elem, amely a növényekben az ionok felvételétől dől. Bizonyos koncentrációkig harmonikusan felvesz mindenféle iont, de egy határon túl blokkolni kezd a kálium és a magnézium felvételét. Ezek az ember és az állat élelmiszer-

Kedvező körülmények alakulnak ki a káliumot korlátozó gyomok felmérésén is, s ezek már nagymértékben elszaporodtak. Ha körülnézünk a földeteken, ahol egyébként egyre több gyomirtót használunk, bizonyos fajták gyomok eltűntek, mások viszont állandóan terjednek. Ekkor ugyan a kárkoly, amelyek nem kedvez a kálium, de van helyette foszfor és parlagi tüske minden mennyiségben. Ezek ellen újra herbicidet használunk, ami gátolja a foltosintézt, tehát megint csak elősegíti

De nemcsak a növények ellenállóképeségét, illetve a mezőgazdasági termékek élelmiszer-összetételét befolyásolja, hanem közvetlen hatással van a gazdasági haszra is. A burgonyában valamikor a hatvanas évekig még 20-21 százalékos volt a keményítőtartalom, amely mára 13-14 százalékra csökkent, s ugyanez a helyzet a cukorrépánál is, ahol a hatvanas évekig 18-20 százalékos cukortartalmat mérhettünk, s mára az átlag 14,6 százalék. Ehhez tudunk kell, hogy az évtizedes években a talaj káliumtartalmának káligrammonkénti még körülbelül 90 milligrammnyi szinten volt, s mára már 250 körül értekel is mérhetünk.

Csökkenteni kell

Ahhoz tehát, hogy a fentebb felsorolt problémákat kiküszöböljük – az SZTA Növénykerti és Rovartani Intézetének eredményei szerint – a legfontosabb feladatot a talaj káliumtartalmának csökkentése. Ez nemcsak jobb terméseredményeket hozhat, hanem ami lényeges, javítja annak minőségét, és csökkentheti az egyéb műtrágyák, a növényvédő és rovarirtó szerek felhasználását is. Ezek óta végzik a kálium és a nitrogén arányának a terméseredményekre való hatását vizsgáló kísérleteket. Bebizonyosodott, hogy a legnagyobb terméseredményeket akkor érik el, ha a talaj káligrammja 90 mg mennyiségű káliumot tartalmaz, és hogy a természetesnek 200 milligrammál, különböző években 15-24 százalékkal is csökkenhetnek. Ez a 200 mg a jelenlegi átlagos szint.

A talaj káliumtartalmának csökkentése megoldandó a nitrátproblémát is. Bebizonyosodott ugyanis a kísérletek során, hogy a nagyobb mennyiségű termés előlése érdekében magas káliumtartalom mellett háromszor-egyszer nagyobb mennyiségű nitrogén kell felvennie a növénynek. Ezen kívül a talaj káliumtartalmának csökkentése még egy sor más probléma megoldásában is segít, és egyszerűbbé teszi a termesztést. Ez a mezőgazdasági termelés. Ehhez a tudományos dolgozók véleménye szerint szükséges, hogy mindenütt pontosan megállapítsák a talaj összetételét és kiadják a műtrágyák szükséges adagolási arányát. Ezeknek a méréseknek az elvégzésére az agrárkémiai vállalatok minden nagyobb befektetés nélkül képesek, tehát elsősorban a mezőgazdaság dolgozói műkö-
höz.

(Szénási)


Túl sok a kálium

Új szempontok a műtrágyázásban

lápállományok alapelvei. Hiányuk csontlágyság, csonttrikuláz, ízületi gyulladásokat okozhat, és manapság ezek a betegségek, az erre való hajlam már fiatal korban is sok esetben megfigyelhető. A káliumot és a magnéziumot a növényi táplálékot, például a zöldség juttatják a szervezetbe, vagy a tej, de ha ezekből hiányzik, akkor természetesen más úton kellene és súlyosabb esetben kell pótolni. De az csak két elem. A talaj magasabb káliumszintje más mikroelemek felvételét is akadályozza, például a légszét szpongió "törzse" van, vagy a már említett nitrátok lebontásához szükséges molibdén, mangán és cink felvételét. Ha ezek a mikroelemek ott vannak a szervezetben, akkor a nitrátokat ammóniákká bontják, és az távozik a szervezetből. Ha hiányoznak, akkor ez a szintézis nem megy végbe, csak gátlék vagy egyéb nitrogénzármarazékok, például a nitrátok keletkeznek, s mivel ezek karcogén anyagok, betegségeket idéznek elő. A talajban lévő kálium a káli felvételének blokkolásával a gazdasági átlak reprodukcióját is veszélyezteti. = MEGDÖVE TESZ QDET ISM

Deformálja a sejteket

Mivel a kálium nem engedi meg, hogy a növény elegendő kalciumhoz és magnéziumhoz jusson, ezzel törkövel a sejteket, és enniük növekszik a növények érzékenysége. A sejteket könnyen megáramodják a mikroorganizmusok, egyéb kórokozók, s mivel a talaj sejtszerkezetét elősegíti a szabad ammóniák felvételét – amelyek a mikroorganizmusok táplálékja – így azok elszaporodnak, a növényeken betegségek jelennek meg.



A burgonya keményítőtartalma és a cukorrépa cukortartalma alakulása a talaj káliumtartalmának függvényében

Tejfalussy András szerint az a végső cél, hogy a káliumot a talajból kórokozó káliumtartalom. Egy 1000 négyzetméter 2% átlagos káliumtartalmú talajnak az 5 méteres termőrétegében kb. 150000 kg kálium van!

Tehát a kálium túladagolás nem csak gazdasági kárt okoz, de rákkeltő és ivartalanító, vagyis **fajirtó** hatású is!

Melléklet-6:

Jeles hazai orvosok is felléptek a (patkányméreg) kálisóval sózás ellen, az egészséges sópótlás helyreállításáért:

NYILATKOZAT

A Ringer oldat a testnedvekhez hasonló ionösszetételű folyadék. A Ringer oldat (0,9 % NaCl, 0,03% KCl, 0,025 % CaCl₂, 0,02 % NaHCO₃, 99 % desztillált víz) szerinti nátrium, kálium, klór és víz pótlási arány megfelelő kóros veszteségek esetén, de ugyancsak optimális a napi étkezések során is.

Budapest 2010. január 6.


Dr. Papp Lajos
ny.egyetemi tanár
akadémiai doktor

Szóbeli nyilatkozat: Papp Lajos beszél a káliummal mérgezett sóról
<https://www.youtube.com/watch?v=TvDYzBr0l4M>

Vagyis a napi 3 liter víz mellé 27 gramm nátrium-klorid konyhasó, de csak 0,36 gramm kálium vérbejuttatása optimális, nem pedig a „Reformkonyha, Stop só, Menzareform, Chips-adó, Bonsalt Star kóser tanúsítványos étkezési só kálisó” csalásokkal a magyarokra rákényszerített dózisok, az ezek alkalmazására felbiztatásokkal az „akármennyi víz mellé, akármilyen gyorsan, napi legalább 4,7 gramm kálium és legfeljebb 5 gramm konyhasó”.

Ez a káliumtúladagolás és konyhasópótlás korlátozás is népirtó hatású. Lásd a magyarok elől a hazai népirtó-bérenc lapok, rádiók, televíziók által elködösített (csak sunyipublikált), 1950-ben Nobel díjjal elismert, ezt bizonyító alábbi hatásvizsgálati mérési eredményeket:

Népi rtó nátriumhiány és káliumtúladagolás (Megbízás nélküli ügyvitel keretében közérdekű kárelhárítás, lásd Ptk.)

NOBEL-DÍJAS MELLÉKVESEKÉREG KUTATÓK ÉLETTANI KÍSÉRLETEI IS BIZONYÍTJÁK, HOGY A „STOP SÓ NEMZETI SÓCSÖKKENTÉSI PROGRAM”, AMI HAMIS ELMÉLETEKET HAMISAN IGAZOLÓ „EPIDEMIOLÓGIAI STATISZTIKÁKRA” HIVATKOZIK, TUDATOSAN MESOKSZOROZZA A RÁK- ÉS AZ EGYÉB ÉLETRÖVIDÍTŐ BETEGSÉGEK GYAKORISÁGÁT.

A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában, „A biológia aktuális problémái” főcím alatt található **„A mellékvesekéreg biológiája”** c. fejezet. Aki írta, az akadémiai nívódíjas Dr. Szabó Dezső azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek alapján **Kendall, Reichstein és Hench 1950-ben Nobel-díjban részesültek** „a mellékvesekéreg-hormonok és szerkezetük és biológiai hatásuk” felfedezéséért. Az összefoglalás jellegű leírás emellett további **61 tudományos publikáció** mérési eredményeire is hivatkozik (zárójelben jelzem, hogy a könyvből idézett megállapítások a könyv mely oldalain találhatók).

EZEK A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK EGYBEHANGZÓAN BIZONYÍTJÁK AZT, HOGY A NÁTRIUMHIÁNYOS ÉS KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT EMBEREK ÉS PATKÁNYOK MELLÉKVESEKÉREG HORMONTERMELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A TUDOMÁNYOS KUTATÓK VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEKSEL RENDELKEZNEK (134), AMELYEK SZERINT A NÁTRIUMHIÁNYOS VAGY KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT ÁLLATOKBAN (PATKÁNYOKBAN) ÉS EMBEREKBN IS MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK BE, MIKÖZBEN A SZERVEZET ELEKTROLIT-HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)

A későbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrövidítő, ivartalanító stb. hatások, például konkrétan a következők:

- 1./ A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik. (140)
- 2./ A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás alakul ki. (167)
- 3./ **A különböző stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)**
- 4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsősorban a vesesejteknel, de a verejtéksejteknel és az emésztőrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez hosszabb ideig tart, törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet:

5./ Idővel nátrium-hiány jön létre. (168)

6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)

7./ Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168)

8./ Romlik a keringés. (168)

9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szűrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)

10./ Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168)

11./ A bőr és a nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)

12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)

13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)

14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)

A hiányos nátrium pótlás és vagy kálium túladagolás miatti egészségromlás leggyakoribb tünetei:

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)

20./ A vér besűrűsödése miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést, renintermelő vesedaganatok jönnek létre. (169)

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait, a nemi jelleg eltorzulást („pseudohermafroditizmust”) is okoz, emiatt lett, lesz egyre több a homoszexuális :

21./ Leánymagzatok nemi szerveinek a fejlődési zavarait, pl. szeméremajkak összenövését, klitoriszmegnagyobbodást. (169-170)

22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idő előtti menstruációt. (170)

23./ Felnőtt nőknél: klitorisz-megnagyobbodás, test- és arcszőrösödés, kopaszodás, érdes hang, a menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)

24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erőteljes izomzat kifejlődést, a testnövekedés gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszőrzet idő előtti megjelenését, korai szakáll- növekedést, hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)

25./ Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermekeknél és férfiaknál emlő-megnagyobbodást okoz. (170)

26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztaták) növekedését serkenti. (170)

AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG PANASZIRODA FELÉ TETT ÚJ FELJELENTÉS INDOKOLÁSA:

AZ ÜGGYEL FOGLALKOZÓ ÜGYÉSZEK ÉS (HAMIS) SZAKÉRTŐIK KÖZEL 20 ÉVE FOLYAMATOSAN „NEM BŰNCSELEKMÉNYNEK” MINŐSÍTIK EZT, A KONYHASÓHIÁNNYAL ÉS KÁLISÓVAL NÉPIRTÁST. A SÓKITERMELŐ CÉGEK ÉS AZ ÉLELMISZER BOLTOK TÖBBSÉGE, S AZ EZEKET „ELLENŐRZŐ” HAZAI HATÓSÁGOK SEM HAJLANDÓK ELÁRULNI A KÁLISÓVAL KEVERT SZABVÁNYSÉRTŐ ÉTKEZÉSI „SÓK” ÉS AZOKKAL KÉSZÍTETT ÉLELMISZEREK KONYHASÓ- ÉS KÁLIUMTARTALMÁT. EKÖZBEN AZ INTERNETEN IS ÉS EGYÉB PUBLIKÁCIÓKKAL IS BÜNTETLENÜL RÁGALMAZZÁK AZ FENTI BŰNCSELEKMÉNYEK KIDERÍTŐIT, BIZONYÍTÓIT. SOKSZOR AZT IS TAGADJÁK, HOGY KÁLIUM- TARTALMÚ ÉTKEZÉSI SÓK IS FORGALOMBAN VANNAK! ILYENEK PL. A BONSAIT ÉS A (BIOKÓSER!) BONOSAL, MINDKETTŐ SZINTE TELJESEN KÁLISÓ. „KONYHASÓPÓTLÓ GYÓGYTÁPSZERKÉNT” A GYÓGYSZERTÁRAK KORÁBBAN KB 99%-OS KÁLISÓTARTALOMMAL REDI-SÓ-t ÁRUSÍTOTTAK. A LEGÚJABB NÉPIRTÓ TALÁLMAŊY A VIVEGA, EZ 40% KÁLISÓT TARTALMAZ. AZ BENNE A TALÁLMAŊY, HOGY A MÉRGEZŐ KÁLISÓ ROSSZ ÍZÉT FŰSZEREKKEL FEDIK EL. DE 20-50% KÁLISÓ VAN SZÁMOS EGYÉB HAZAI SZABVÁNYSÉRTŐ ÉTKEZÉSI SÓBAN IS. TÖBB OLYAN „SÓT” IS TALÁLTUNK, AMELYNÉL RÁTÖLTÖTTÉK A MÉRGEZŐ KÁLISÓT A KONYHASÓRA, ÉS A KÉTFÉLE „SÓT” ÖSSZE SEM KEVERTÉK!

A fenti módszerrel előidézett betegségeket mindenféle más okokra vezetik vissza, miközben ezt a két fő okot, a nátriumhiány okozást és káliummérgezést okozást elhallgatják, vagy ellenkező hatásúnak tüntetik fel. Miniszteri, államtitkári szintről „elavultnak” hazudják az élettani optimum szerinti (fiziológiás mértékű) sópótlást, a vér-elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelő étkezést. Pedig a fiziológiás sópótlás helyességét a tengervíz, a magzatvíz és a vészérum és a fiziológiás infúziós Ringer- oldat ezekével azonos, optimális nátrium és kálium dózisarányai is igazolják. ISMERT ORVOSI TANKÖNYVEK SZERINT EKG TORZULÁS IS MUTATJA, HOGY EGÉSZSÉGES FELNÖTTNEK IS RONTJA A SZÍVMŰKÖDÉSÉT NAPI 3-4 GRAMMNÁL TÖBB KÁLIUM SZÁJON ÁT BEJUTTATÁSA, SÓT, 1 ÓRÁN BELŰL, PL. ITALLAL A VÉRBE JUTTATVA, MÁR 1-2 GRAMM KÁLIUM IS VESZÉLYESEN MÉRGEZHET!

Verőce, 2014. június 06.

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő (1-420415-0215)
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk va., TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT,
2621 Verőce, Lugosi u. 71., T/F: +36-27-380-665 (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, T.:366202181408)

Nemrég 150 spermadonornak jelentkezőből 150-nek volt rossz spermája, lásd: [Szörnyű: Baj van a magyar spermával | BorsOnline - Sztárhírek ...](#)
A fent bemutatott konkrét hatás mérések alapján bárki beláthatja, hogy a túladagolt kálium sejtmérgező hatásai következtében a növények, a patkányok és emberek is elveszítik a stressz ellen védekező képességet!

feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>

címzett:Lezsak Sandor <sandor.lezsak@parlament.hu>

dátum:2017. június 27. 22:22

hihető magazin 2. „A FIDESZ-KDNP vezetősége is a népirtásra alapozó

tárgy:ingatlanspekulánsok seggét nyalja?” Nyílt levélként Lezsák Sándor országgyűlési

képviselőnek közvetlenül is megküldve!

küldő:gmail.com