

MELLÉKLETEK „A NÁZÁRETI JÉZUSHOZ KOLLEKTÍV IMÁDKOZÁST SZERVEZŐKHOZ INTÉZETT NYÍLT LEVÉLHEZ”

Megismételt szakvélemény

Csakis a mérgező káliummal fajirtás biológiai hatás mérési bizonyítékai alapján (lásd melléklet-1) lehet észhez téríteni a magyarokat! Sehogy máshogy. Tízévente milliószámra pusztulnak ki a mérgező kálium miatt a magyarok!

Amelyik párt, vagy egyéb, a hazai országgyűlési választáson indulásáért kampányoló személy és vagy szervezet nem veszi fel a kampányuk céljai közé a nemzőképtelenséget is okozó mérgező káliummal fajirtás (melléklet-1) leállítását és megbosszulását, az a fajirtó illuminátusok és talmudisták lekötöztetettje. A szervezői, a vezetői pedig az ILLUMINÁTI tréning videó (lásd melléklet-2) szerinti fajirtásban tudatosan és vagy ostobaságból közreműködő elmebeteg haszonlesők.

Melléklet-1: Fajirtó állami bünszervezet elleni feljelentésként kapja a Miniszterelnöki Hivatal vezető Lázár János: AZ MTA BÜNÖZŐGÁRDÁJA SZERVEZTE ÉS FEDEZI A MÉRGEZŐ KÁLIUMMAL FAJIRTÁST (Iratjel: MTAsokbuncselekmenye-KadarImre-171227LazarJanos)

Melléklet-2: Egy kiszivárogtatott ILLUMINÁTI tréning videó-hoz (Iratjel: illuminatis171225)

Melléklet-3: Konkrét hatás mérési bizonyítékok az izraeli kutatók által a „nyugati férfiak” 2050-re jószolt teljes ivartalanodásának eltírt okáról, ami a mérgező kálium (Azonosító: emailkonyv-101-ivartalanitanak2050re)

Budapest, 2017. december 27.

Tejfalussy András

(Iratjel: megismeteltszakvelemenye171227)

Fajirtó állami bünszervezet elleni feljelentésként kapja a Miniszterelnöki Hivatal vezető Lázár János: AZ MTA BÜNÖZŐGÁRDÁJA SZERVEZTE ÉS FEDEZI A MÉRGEZŐ KÁLIMUMMAL FAJIRTÁST

Idézet a kálium műtrágyázást népszerűsítő, ellenvéleményeket szembehazudó MTA Talajtani Kutatóintézeti alkalmazott dr. Kádár Imre 1992-ben kiadott „**A növény táplálás alapelvei és módszerei**” című könyvéből.

Az alábbi idézet a könyv **341.** oldaláról származik. Kádár Imre értelemzavaró, hibás, ellentmondásos szóhasználatait, a másoktól átvett megállapítások megértését nehezítő értelmezéseit aláhúzással emeltem ki!

„A műtrágyázott takarmányok negatív állatételtani hatásáról ritkán olvashatunk. Érdemes utalni néhány forrásra, melyek általunk ugyan nem elbírálgathatóan, de érzékeltetik az egyoldalú trágyázás ilyenén következményét (In: STAUB 1983)

1. Anheld és HAHN (1973) adatai szerint a hivatalos szaktanácsadás szerint intenzíven trágyázott NPK-nyomelemekkel „kiegyensúlyozottan” táplált, legelőn tartott birkák **spermaminósága romlott** és az állatok gyakran terméketlennek bizonyultak. A komposztal, szerves trágyázott legelőn tartott állatoknál mindez nem jelentkezett.

2. GOTTSCHESKI (1974) 5 éven át házinyulakkal folytatott kísérletsorozatban azt találta, hogy a biotakarmányok etetése során kevesebb a halvaszületés; mind az anyagállatok, mind az embrió egészségesebb a műtrágyázott kontrollhoz viszonyítva.

3. A szerző más forrásokra utalva kiemeli, hogy a generatív szövetekben és szervekben károsodásokat figyeltek meg, mely az utódokon kifejezettebben jelentkezett. Patkányokkal és macskákkal több nemzedéken át folytatott takarmányozási kísérletekben bizonyították, hogy míg az első nemzedék némileg lefogyhat a rossz minőségű tápláláskor, a második és harmadik nemzedéknél már súlyos deformációk és csontelváltozások állhatnak elő. **A negyedik nemzedéknél megkezdődött a kipusztulás.**

Megjegyezzük, itt a táplálékot hőkezeléssel denaturálták, nem trágyázással változtatták meg. A szerző szerint azonban a hatás analóg lehet az egyoldalú nagyadagú műtrágyázás esetén. A táplálék deformálódik, értéktelenebbé válik, mely a növény-állat-ember, végső soron a teljes ökoszisztéma (benn az emberi faj) degenerációját eredményezi. „**Unokáink erről többet fognak tudni**” - véli STAUB (1983). ”

Kádár Imre a fenti kutatók helyes megállapításait úgy hozta szóba, hogy azokat az ő, a kálium műtrágyázás szükségességét és előnyeit hazudó hamis valószínűsítéseivel szemben senki se fogadja el bizonyító erejűnek!

Kádár Imre könyve módszeresen szembehazudta a káliumműtrágyának a nemzetközi szabadalmi szerinti sokváltozós **ANTIRANDOM** hatásvizsgáló mérésekkel **közvetlenül láthatóvá tett** mérgező hatásait is. Azt, hogy a mérgező káliummal **K** műtrágyázás katasztrofálisra fokozza az aszálykárt és a mérgező káliummal növelt káliumtartalmú növények az **N** és **P** makrotápanyagokra is elvesztik az alkalmazkodó képességüket. Egyébként az is bizonyítja, hogy Kádár Imre és társai tudatos bűnözők, hogy azután kezdték el alkalmaztatni hazánkban és a többi nyugati országban műtrágyaként és „étkezési sóként” a mérgező káliumot, hogy **1950-ben Nobel díjat kapott három biológus mellékvesekéreg kutató**, akik a patkányokon és embereken végzett konkrét biológiai hatás vizsgáló kísérleteikkel egyértelműen bebizonyították a mérgező kálium mindenkit betegítő, életrövidítő és nemi jelleg torzító, ivartalanító hatásait. Tehát pontosan tudták a mérgező kálium túladagolás várható eredményét. De pl. ezek alapján valószínűsíthette egy, a kálium mérgező hatását ugyancsak elhallgató „**izraeli tudós**”, hogy a „4. nemzedék” után, vagyis **2050-re** már nem lesz szaporodásra képes „nyugati férfi”! Lásd: <https://kuruc.info/r/4/179568/>, valamint www.tejfalussy.com, 101. email könyv.

Karácsonyi ajándékként, nemzeti konzultációs témaként, a fentieket további bizonyításként küldöm Orbán Viktor miniszterelnök úrnak. Arról, hogy a magyar lakosoknak egy izraeli tudós által **2050-re** valószínűsített nemzőképtelenségét, a mindent, növényt, állatot és embert is mérgező kálium műtrágyaként és étkezési sóként előírásával, a Magyar Tudományos Akadémia azon bűnözői okozzák, akik a Nobel díjas biológus mellékvesekéreg kutatók hatásmérései alapján **1950** óta hivatalból is kell tudják, hogy a mérgező kálium

67./3 Kód: Jezushozimadkozasszervezoknek180220mellekletei

visszafordíthatatlan nemzőképtelenséget idéz elő a férfiak spermiumai és a női szaporítószervek genetikai torzításával, lásd a fenti bűnvádi bizonyítást, és a megnevezett konkrét biológiai hatás mérési bizonyítékokat.

Magyarország, 2017. december 27.

Népirtási bizonyítékokkal, jogos védelem (Btk.) és megbízás nélküli kárelhárítás (Ptk.) keretében közlése:

(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215, an.: Bartha Edit) oknyomozó mérnök feltaláló a mérgező kálium hatásaival korábban minisztériumi, országgyűlési és önkormányzati megbízottként is foglalkozó hatás-mérés tudományi szakértő (magánhonvédő), tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

Cc: A bűnügyi nyomozást évek óta mindenféle retorziókkal akadályoz(tat)ó dr. Polt Péter legfőbb ügyész

(Iratjel: MTAsokbuncselekménye-KadarImre-171227LazarJano

A kapcsolódó melléklet iratjele: illuminatis171225


67./3 Kód: Jezushozimadkozasszervezoknek180220mellekletei

67./4 Kód: Jezushozimadkozasszervezoknek180220mellegei

Kód: illuminatis171225

Egy kiszivároztatott ILLUMINÁTI tréning videó-hoz

Forrás: <https://www.youtube.com/watch?v=KnfuF0oYhAk>



Magyarázatként, egy illuminátus nyilatkozatát tartalmazó részlet „AZ IGAZSÁG A MI FEGYVERÜNK” című, először 1980-ban megjelentetett könyvből (az Emissary Publications 1984 évi kiadása alapján, HUNNIA 1992. június 25.-i szám 37. és 55. oldal. A fordítást készítette: Bérczy Márton):

”Az illuminátusok rabszolgáságunkat tervezik

A Római Klub egyik tagja, Howard Odum, 1980 augusztusában így nyilatkozott a Fusion magazinnak:

„Az Egyesült Államoknak új és izgalmas vezetőszerpe van a világban. A világot le fogjuk vezérelni. Lesegítjük a világot alacsonyabb energiafelhasználási szintre. Az Egyesült Államoknak lakosságát a következő ötven év alatt kétharmaddal kell csökkentenie”.

Az illuminátus Odum nem mondja el nekünk, hogyan fogják eliminálni hozzávetőlegesen 150 millió honfitársunkat, de abban nyugodtak lehetünk, szorgalmasan ügyködnek rajta.

Elkerülheti-e Amerika a globális összeesküvők által felállított démoni csapdát? Válaszunk: Igen!

Sorsdöntő évtized

Most keresztútnál vagyunk. A következő dekádban eldől Amerika és a világ sorsa. Akiknek szemük van, világosan látják a helyzetet. Balra vezet a könnyebbik, rózsaszínű út, a felelőtlen, érzéki életet élők világa, azoké, akik a „humanista” propaganda által ajánlott utat választják. Ez traumához, leépüléshez, szegénységhez és végül rabszolgásághoz vezet. ”

MIVEL, HOGYAN IRTJÁK KI AZ ÁLTALUK HALÁLRA ÍTÉLT NÉPEKET, NEMZETEKET

Abban talán igazuk van az illuminátusoknak, hogy a Föld nevű bolygón rendet kell teremteni. De semmiképpen sem rablógyilkossággal, fajirtással! A természeti környezet- és a népcsoportok harmonikus kapcsolatának létrehozásával és fenntartásával kell rendet teremteni és fenntartani! A lakosság túlszaporodását az emberek tanításával és meggyőzésével kell megfékezni. Valamint a túlszaporodást nem, de a családok optimális szaporodását támogató helyes adópolitikával!

A Biblia és a Talmud előírják az ivóvíz- és szózás elrontással fajirtást. Ezt a talmudisták és az általuk felbérelt egyéb bűnözők hajtják végre: a nyugati országokban 1950 óta ehhez gyorsították fel, terjesztették el a fajirtó mérgező kálium használatot. Azután, hogy Nobel díjat kapott három biológus mellékvesekéreg kutató, akik az étkezéssel túlادagolt kálium nemzedékről nemzedékre fokozódó genetikai torzító, nemzőképeség rontó hatását a konkrét patkány- és ember kísérleteik biológiai hatás mérési adataival egyértelműen bebizonyították. Más kutatók biológiai hatás vizsgáló kísérletei is bizonyították a mérgező kálium fogyasztás nemzőképtelenség fokozódás okozó hatását, azt, hogy termékenyítés képtelenné teszi a hím állatok spermiumait. A kálisóval is műtrágyázott legelőn élő birka kosok 4. generációja lett nemzéképtelen. Embernél ez kb. 100 év.

Nemrég egy izraeli tudós is azt valószínűsítette, hogy „a nyugati férfiak teljesen nemzőképtelenek lesznek 2050-re”. Az 1950-óta mérgező káliummal rongált spermiumú nyugati férfiak negyedik nemzedéke ekkorra várható. A „keleti férfiak” még szaporodóképesek, mert Kína és az iszlám országok korábban nem, ill. elhanyagolható mértékben műtrágyáztak a mérgező káliummal! Valószínűsíthető, hogy ezeket a népeket majd egy másik 100 éves ciklusban fogják végleg kiirtani.

A népirtással kiűrtett ingatlanokat a népirtó bünszervezet elfoglalja és vagy kiárusítja az odacsábított és vagy odakényszerített bevándorlóknak. Izrael állami Star kosher tanúsítvánnyal „Bonsalt” jósó néven, magyar nyelven jelenleg is árusítják az interneten a patkányméreg kálisót és Izrael 1950 óta nagyságrendekkel növelte a mérgező kálisó exportját. Valószínűsíthető, hogy a kálisó kitermelését Izraelt követve felfuttató kanadai Potash cég részvényei is főleg talmudistáké.

A tiszta ivóvízhez jutás akadályozási és szózásrontással ételmérgezési fajirtás az Ószövetséggel és a Talmuddal „törvényesített” országleigázási, ingatlanszerzési rablógyilkossági módszer. Lásd 2 Mózes 23/20-33, 5 Mózes 7/1-26, Talmud Taanith 10 a. lap és Talmud Baba kamma 93 b. lap. A talmudista népirtás részletes bizonyítása, a konkrét hatásmérési bizonyítékok, s a víz- és szózásrontással népirtás ellen hatásos védekezési módszerek is közzé vannak téve a HIHETŐMAGAZIN, www.tejfalussy.com honlapon, lásd: 1., 100. és 101. Email könyvek, Videók (pl. 10. sz. Videó) és „MEHNAM” intézkedések (pl. MEHNAM 876.)

Kérem, hogy mindenki továbbítsa legalább 10 magyar család részére a fenti információt. Aki nem teszi meg, népirtásban bűnségédekzik, s nem érdemli meg, hogy éljen!

Magyarország, 2017.12. 25.

*(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc
okl. vill. mérnök, kárelhárító oknyomozó kutató
hatásmérés tudományi szakértő feltaláló,
jogos védelmet folytató, megbízás nélküli
kárelhárító ügyvivő (magánhonvédő)*



Segítésre kapta: Orbán Viktor miniszterelnök

feladó: **András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy** <magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
ferenc.kalmar@mfa.gov.hu;
miniszterelnok@me.gov.hu;
címzett: "ME - Érkeztetők (noreply)" <erkeztetok.noreply@me.gov.hu>;
miniszter@hm.gov.hu;
"Érkeztetők (ME)" <erkeztetok@me.gov.hu>;
Elnok@kuria.birosag.hu

másolatot kap: Magyarok Világszövetsége elnök <elnok@mvsz.hu>

titkos másolat: . . .

dátum: 2017. december 24. 18:11

tárgy: Egy kiszivárogtatott ILLUMINÁTI tréning videó-hoz: MIVEL, HOGYAN IRTJÁK KI AZ ÁLTALUK HALÁLRA ÍTELT NÉPEKET, NEMZETEKET (Kód: illuminatis171220)

küldő: gmail.com

.Fontos a varázsgömbünk szerint.

Kik, miért és hogyan tették a nyugati országokat az ott élő népek számára észrevétlenül haláltáborrá

A kálissal műtrágyázás egy lassú, az áldozatok által csak túl későn észrevehető népirtási módszer, ami miatt 2050-re a nyugati férfiak, a magyarok is elvesztik el a nemzőképességüket, amit hamis okokat valószínűsítve nemrég egy izraeli tudós is „megjósolt”. (A „jóslatáról” lásd a www.tejfalussy.com, Email könyv 101-et.)

Nem volt nehéz megjósolnia, miután tudhatta a következőket:

1./ A birka kosok negyedik nemzedéke nemzőképtelenné lett a (káliummal is) műtrágyázott legelőn.

2./1950 után kezdték el a nyugati országok termőtalajait káliummal műtrágyázni. Azután, hogy Nobel díjat kaptak, akik patkányoknál és embereknél kísérletileg bebizonyították a növelt élelmiszer káliumtartalom nemzőképesség rontó, népirtó hatását.

3./A nemzetközi hatás-mérés tudományi szabadalmaim szerinti sokváltozós Antirandom biológiai hatás vizsgáló méréseink 1983-ban egyértelműen, jól láthatóan megjelenítették a káliummal is műtrágyázott növények végzetes mérgezettségét. Lásd melléklet-1.

4./1988-ban egy szlovák akadémiai kutató közzétette, hogy a termőtalajok vízben oldott kálium tartalmának növelése a növényeket, állatokat és embereket is mérgezi, rontja a mikroelem felvételüket, „vesélyezteteti a gazdasági állatok szaporodóképességét”: Új szó, 1988. IX. 18. „Túl sok a kálium” („Gond a tejjel”, „Hiányzó mikroelemek”, „Deformálja a sejtet”, „Csökkenteni kell”). Lásd melléklet-2.

5./ A nyugati országok, Magyarország is, kb. 1960 óta műtrágyáznak intenzíven káliummal. Embernél kb. 90 év kell a 4. nemzedékig eljutáshoz, tehát a kálium műtrágyázott növényeket fogyasztók, a magyarok nemzőképtelensége is 2050-re várható. Kína s az iszlám országok nem, ill.alig használnak kálium műtrágyát (a nitrogén és foszfor műtrágyához képest). Ezért csak „a nyugati férfiak” nemzőképtelenségét várják!

6./Elterelik a magyarok figyelmét a műtrágyaként is alkalmazott mérgező kálissal mérgező, ivartalanító hatásáról a Nemzeti Stop Só Program, MENZAREFORM. Chips adó elnevezésű hamis „étkezési reformok”.

7./ Azzal is elterelik a káliummal műtrágyázással ivartalanításról a figyelmet, hogy méregdrágán (!), hamis WHO ajánlással (!), fűszerekhez keverve (VIVEGA névvel), ill. Izrael állami Star kosher tanúsítvánnyal (BONSALT) is, a „lehető,legegészségesebb étkezési sóként” árusíthatják a (patkánymérge hatású) kálissal.

A káliummal fajirtás elleni sikeres személyes védekezéshez ezeket kell (kellett volna) mindenkinek tudnia:

- Nem szabad káliummal műtrágyázott növényt enni és vagy a konyhasó helyett kálissal ételízesíteni!
- A sok káliumot tartalmazó ételből vagy italból nem szabad egyszerre túl sokat megenni vagy meginni.
- A mérgezően sok káliumnak a vérből gyorsabban eltávolítását elősegíti a tiszta desztillált ivóvíz és a tiszta konyhasó, valamint a savanyúság és cukor fogyasztása.
- A vérbe juttatandó optimális víz, konyhasó és kálium mennyiség étkezésnél is a Ringer infúziós oldat dózisa szerinti. Pl. 3 liter desztillált víz mellé 27 gramm konyhasó és 0,36 gramm kálium az optimális!

Mivel a túladagolt kálium idegméreg, s izomgyengítő hatású is, az általa irtott népek nem igen láznak fel, és ismétlődően, bárgyú módon beszavazzák a népirtással ingatlanszerző „keleti származású” gyilkosaikat a törvényhozása és a kormányba.

Verőce, 2018-02-15.


Jogos védelemként (Btk.), megbízás nélküli kárelhárítás keretében (Ptk.), bárhol való terjesztésre közzétette:

Tejfalussy András oknyomozó mérnök feltaláló, korábbi minisztériumi, országgyűlési, önkormányzati és tudományos akadémiai hatás-mérés tudományi szakértő (sz.szám: 1-420415-0215, an.: Bartha Edit), 2621 Verőce, Lugosi u. 71., (www.tejfalussy.com, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, + 36 20 218 14 08)

Melléklet-1.

ASZÁLYHATÁS-STRESSZT KALIBRÁLÓ ANTIRANDOM SOFTWARE

fajta-1.
fajta-2,



P.	K.
2	2
1	2
0	2
2	2
2	1
0	1
0	1
0	0
2	0
1	0
0	0
0	1
1	1
2	1
2	2
1	2
0	2
0	2

Kód: asz-aly-hatas-
streszt-kalibralo-
antirandom-sw-
83-paprika

3-paprika



– fajta-3.
– fajta-4.

0012344-**N**-4432100

Melléklet-2.

A mi Antirandom méréseink eredményeinek a Falurádióban közzététele után, beismert egy szlovákiai kutató alábbi cikke, hogy a talajvíz kálium tartalmát a 90 mg/kg természetesnél nagyobbra növelve a "mútrágyaként" adagolt káliumvegyületekkel, számos betegséget lehet okozni a növények, de az állatoknak és az emberek részére is, ez utóbbiakat meddővé is teszi, s a hagyományosnak a többszörösére növelhető vele a termesztési önköltség.

Budapest, 2007. 02. 19. Teifalussy András /méréstan szakértő/

A termőterületek műtrágyázásával, illetve a terméseredmények szempontjából a kertválasztás optimális mértékű és ennek köszönhetően hatásai nem egy szakszaki értekezés, vagy inkább szeszeliutatis foglalkozik a saját hasábján. A műtrágyázás egyik különösen negatív hatásaként a zöldségfélékben és egyéb növényi termékekben felhalmozódó nitrogén-származékokat nevezzük meg, s ezzel összefüggésben felhívjuk a figyelmet a nitrogéntartalmú műtrágyák túlzott alkalmazására.

lább feltételek veszélyeségeket okozó hektáronként. Mindez Kislóvié mérnök szerint a kálifümlalakra vonatkozóan a veszélyes anyagok

Hányzó mikroelemek

A kalcium az az alapvető elem, amely a növényekben az ionok felvételéről dönt. Bizonyos koncentrációig harmonikusan felvesz mindenféle iont, de egy határon túl blokkolni kezd a kalcium és a magnézium felvételét. Ezek az ember és az állat árányai

Kedvező körülmények alakulnak ki a kálifiumot tartalmazó gyomrok számára is, s ezekből nagygyomrétegek is keletkezhetnek. Ha a körülmények a földeteken, ahol egyébként egy-egy főbb gyomfajról használnak, bizonyos fajta gyomok elterjednek, mások, viszont állandóan jelennek meg. Ekkor ugyan a kálifű, amelynek nem kedvez a kálifű, de van helyette főbbot és partait töltsék minden mennyiségben. Ezekkel ellen egy herbicidet használnak, és a földet a földszintre, tehát megnézni csak a földet.

De nemcsak a növények élettelőképes-ségét, illetve a magzónálódási körülmé-
nyeknyitny-összetételét befolyásolják, hanem
közvetlen halálával van a gazdasági hasznára
is. A burgonyában valamikor a halvasz év-
évké még 20-21 százalékos volt a keményít-
őtartalom, amely mára 13-14 százalékra csök-
kent, s ugyanez a helyzet a cukorrépáé is,
ahol a halvasz évévké 18-20 százalékos
cukortartalmat mérhettünk, a mára az átlag
14,5 százalék. Ehhez tudunk fel-
évenként évenként a talaj kalciumtartalmára kö-
szönhetően még körülbelül 90 milligramm-
nyi szénitlen volt, s mára már 250 körül értékel-
is mérhetünk. ✱

Túl sok a kálium

Új szempontok a műtrágyázásban


léptékének alapelemei. Hányuk csontig-
gyűrés, csontirakítás, izületi gyújtásokkal
okozhat, és maradványok és biológusok,
az erre való hajlam már fiatal korban is sok
tesztben megfigyelhető. A kalciumot és
a magnéziumot a növényi léptékek, például
a zöldség fajtáinak a szervezete, vagy a tej,
de ha ezekből hiányzik, akkor természetesen
más úton kellene és súlyosabb esetben köll
pótolni. De ez csak két elem. A talaj mag-
sabb kalciumzsinórá magmolekulák felvétel-
ét akadályozza, például a légers szem-
porított forrás víz, vagy a már említett
nátrók lefordulása szükséges molibdén,
magnézium és cink felvételé. Ha ezek a mikro-
elemek ott vannak a szervezetben, akkor
a nátrókat ammoniákra bontják, és az távo-
zik a szervezetből. Ha hiányoznak, akkor ez
a szindróm nem megy végbe, csak nátrók
vagy egyéb nátrókizsármazékok, például
nátrózmólok képződnek, s mivel ezek karc-
inogén anyagok, betegségekkel időznek elő.
A talajban lévő kalcium a cink felvételének
blokkolással a gazdasági átlakot reproduk-
ciót is veszélyezteti. =

Deformálta a sejtet

Mivel a kalcium nem engedi meg, hogy a növény eleget kalciumozzon és magnéziumhoz jusson, ezzel károskóros a sejtelés, és emiatt növekszik a növények érzékenysége. A sejtelek könnyen megsemmisülnek a mikroorganizmusok, egyéb kórokozók, a mivel a laktajszékkel elősegíti a szabad aminosavak felvétele – amelyek a mikroorganizmusok táplálék – így azok elszaporodnak, a növényeken betelepsznek jelennek meg.

a kálmán felvételét. Ez újra lazább lesz a sejtek között, és csökkenni a körök közötti szeméti ellenállás, amely termelésének rovarbíró kezeli. Ez újra megindítja a problémák létezését és a kár bebiztosít. Si mindezekben a folyamatokban, amelyek bonyolultabb lesznek és drágábbak a termelés, pontjak a termékek minőségét, alapvető okok ott találjuk a kálmán.

Code: TulSokKaliumKarai



A burgonya keményítőtartalmának és a cukorrépa cukortartalmának alakulása a teljes állománytartalmának függvényében

Csökkenteni kell

Athozz tehát, hogy a fentebb felsorolt problémákat kiűzőbőlök – az SZTA Nővénykár-lási és Rovartani Intézetének eredményei szerint – a legfontosabb feladat a talaj ká-lium-tartalmának csökkentése. Ez nemcsak jobb termés-eredményekhez vezet, hanem az é-lésvesztés, javítja annak minőségét, és csök-kentethi az egyéb műtrágyák, a növényvéd-ő és rovarölő szerek felhasználását is. Ezek óta végzik a kálium és a nitrogén arányát a termés-eredményekre való hatással vizsgáldó kísérletei. Bebizonyosodott, hogy a legna-gyobb termés-eredmények akkor érik el, ha a talaj káliumtartalma 90 mg mennyiségű ka-liumot tartalmaz, és hogy a termés-eredmény 200 mg/litrammól, különböző években 15-24 százalékkal is csökkenthetik. Ez a 200 mg a jelenlegi átlagos szint.

A talajkáliumhiányok csökkentése megoldandó a társfűveléssel. Bebizonyosodott ugyanis a kísérletek során, hogy a nagybúza mennyiségű termés eléréséhez átlagosan magas káliumtartalalom mellett háromszor-négyszer nagyobb mennyiségű nitrogént kell felvennie a növénynek. Ezen kívül a talajkáliumhiányok csökkentése még egy fontos probléma megoldásában is segítene az egyszerűbbé lenné a természetesen előforduló – a mezőgazdasági termeléshez – a földművelés dolgozóik véleménye szerint szükséges, hogy mindenki pontosan megállapítsa a talaj összetételét és kioldozzák a műveléskor szükséges adagolását. Ezeknek a mértékeknek a végrehajtásának a vállalkozások minden nagyobb befektetése nélkül képesek, tehát elsősorban a mezőgazdasági dolgozók felé, hogy azok közeliednek a felvetett problémákhoz.

(Szécsi)

[illegible]

* Nem igaz, mert ez csak a talajból kioldódó káliumtartalom! Egy 1000 négyzetméter 2% átlagos káliumtartalmú talajnak az 5 méteres termőrétegében kb. 150000 kg kálium van.

AZ MTA-VAL SZEMBEN KÖZZÉTETT MAGYARORSZÁGI ÉS NEMZETKÖZI FELJELENTŐIRAT
Derítse ki rendőrségi nyomozás az MTA-nak általam sokszor feltett, de általuk csak rágalomokkal álságosan „megválaszolt” kérdéseket, mert bizonyítottan **közveszélyes** a tiszta ivóvíz hiány és a konyhasó hiány és a kálium túladagolás, amit az MTA-ra alapozva egészségjavításként reklámoz a kormány.

1. Az MTA miért veszi semmibe, hogy az MTA-s nagydoktor Prof. Papp Lajos szívsebész egyetemi tanár szerint 110-szer több vizet kell pótolni, mint amennyi konyhasót, és 30-szor több nátriumot, mint amennyi káliumot, mert az ettől eltérés ártalmas? (1)
2. Az MTA miért veszi semmibe, hogy a vérbe a napi 3 liter Ringer infúziós oldattal közel 3 liter desztillált vizet juttatnak be, ill. a SALSOL és SALSOLA infúziókkal is, amelyekben a desztillált víz mellett csak tiszta NaCl konyhasó van? (2)
3. Az MTA miért veszi semmibe az 1950-ben Nobel díjat elnyert biológusok konkrét hatáskalibráló hiteles méréseit, amelyek szerint a csökkentett nátrium- és a növelt kálium pótlás a patkányok és az emberek életét is lerövidíti, mert vese-, ideg és szívműködés rontó, keringésrontó, vérnyomásnövelő és daganat előidéző hatása és nemi torzulásokat okoz, aminek a következtében, néhány nemzedéken át alkalmazva, annyira leromlik a férfiak spermája, hogy már nem tudnak egészséges utódot nemzeni. (3)
4. Az MTA milyen konkrét biológiai hatáskalibráló hiteles mérésekkel tudja bizonyítani, hogy a WHO-ra és az Európai Unióra hivatkozással folytatott, konyhasó helyett kálissóval ételízesítés és az átlagosan napi 4,7 gramm étkezési káliumpótlásra felbuztatás egészségjavító, ártalmatlan hatása? (4)
5. Az MTA milyen konkrét biológiai hatáskalibráló hiteles mérésekkel tudja bizonyítani, hogy hamisan híreszteli a Szlovák Tudományos Akadémia Növénykórtani és Rovartani Intézete a „Túl sok a kálium”, „Gond a tejjel”, „Hiányzó Mikroelemek”, „Deformálja a sejtet”, Csökkenteni kell” címmel ellátott cikkben, hogy kárt okoz a kálium műtrágya a 90mg/kg vízben oldódó káliumnál többet tartalmazó talajoknál, és az e fölé növelt káliumtartalom rákbetegséget és szaporodóképesség romlást is okoz? (5)
6. Az MTA-hoz benyújtott Bp. Kertészeti Egyetemi jelentésben a káliumműtrágya aszálykár fokozó hatását megjelenítő Antrirandom hatásvizsgálat eredménye (6) miért van ellenkezőjére hamisítva?
7. Az MTA milyen konkrét biológiai hatáskalibráló hiteles mérésekkel tudja bizonyítani, hogy az átpárlással mindentől tisztított desztillált víz mérgező hatása a fenti (a Ringer infúzió szerinti) víz : konyhasó=110 és nátrium : kálium=30 dózisarány esetén? (7)
8. Az MTA milyen konkrét biológiai hatáskalibráló hiteles mérésekkel tudja bizonyítani, hogy a gyermekétkeztetésnél veszélytelen az ételízesítő konyhasó kálissóval helyettesítése? (8).
9. Az MTA milyen konkrét biológiai hatáskalibráló mérésekkel tudja bizonyítani, hogy a Star kosher tanúsítvánnyal a konyhasó helyett, ételízesítésre árusított BONSALT kálissó nem mérgező? (9)

A fenti kérdések és az 1-9. bizonyíték semmibe vevői a Dr. Dénes Veronika PKKB bíró által a 13.B.24.211/1993/2. végzésben felsorolt súlyos népirtási stb. bűncselekményeket követik el! (10)

A fenti feljelentést jogos védelem (BTK) és megbízás nélküli kárelhárítás (Ptk.) keretében, közérdekű bejelentőként, Orbán Viktor miniszterelnökhöz nyújtom be, miután nemrég bukott bele a fenti bűnözőket bűnpártoló rendőrségi és ügyészégi vezetés az ellenem megkísérelt (6.) bolonddá nyilvánítási retorziójába.

Verőce, 2017. szeptember 28.

(Iratjel: 13.B.24.211-93-2-OV-170928)

Tejfalussy András oknyomozó mérnök korábban minisztériumi, országgyűlési, önkormányzati és tudományos akadémiai hatásmérés tudományi szakértő 2621 Verőce, Lugosi u. 71.,
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, HIHETŐMAGAZIN, www.tejfalussy.com

1.

NYILATKOZAT

A Ringer oldat a testnedvekhez hasonló ionösszetételű folyadék. A Ringer oldat (0,9 % NaCl, 0,03% KCl, 0,025 % CaCl₂, 0,02 % NaHCO₃, 99 % desztillált víz) szerinti nátrium, kálium, klór és víz pótlási arány megfelelő kóros veszteségek esetén, de ugyancsak optimális a napi étkezések során is.

Budapest 2010. január 6.


Dr. Papp Lajos
ny.egyetemi tanár
akadémiai doktor

Professzor úr szóbeli magyarázatait lásd a HIHETŐMAGAZIN www.tejfalussy.com honlapon (10. Videó)!

2.

A következő anyagok vannak a Ringer infúzióban desztillált vízben feloldva:

A Ringer-oldat, melynek összetétele a szív igényeinek legjobban megfelel:

AZ INFÚZÓS RINGER-OLDAT ALKOTÓELEMEI

0,9% NaCl,
0,03% KCl,
0,025% CaCl₂ és
0,02% NaHCO₃-ból áll.

Dr. Kiszely György és dr. Hársing László: Gyógyszerész továbbképzés Biológiai és élettan alapismeretek, 90. oldal. Medicina, 1958.

Iratkód: Ringer-oldat

Tilos lett kiírni, hogy "desztillált víz"? Korábban kiírhatták, lásd SALSOLA!

SALSOLA oldat

nátrium-klorid

Hatóanyag:
9,00 mg nátrium-klorid milliliterenként *

Elektrolitkoncentráció:
Na⁺ 154 mmol/l
Cl⁻ 154 mmol/l
Ozmolaritás: 308 mOsm/l
pH: 4,5-7,0

Segédanyag:
injekcióhoz való víz

Parenterális alkalmazás esetén kizárólag intravénásan alkalmazható!

Az orvos kezéhez.
Lásd a mellékelt tájékoztatót is.
A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

A forgalombahozatali engedély jogosultja:
TEVA Gyógyszergyár Zrt., 4042 Debrecen
Pallagi út 13.

TEVA

Kizárólag a gyógyszer oldat használható!
A megbontható oldatot félretenni és később felhasználni tilos!
A zsák épségét annak összeszorításával ellenőrizze!
Szívárgás esetén nem alkalmazható!
Sorba kötve nem alkalmazható!
Inkompatibilitás veszélye miatt egyéb gyógyszerrel történő elegyítése, melynek alkalmazási előírásában az izotóniás Na⁺ mint kompatibilis oldat nem szerepel, kerülendő!
Egyéb gyógyszer az oldatba csak olyan esetben tehető, ha annak gyógyszeralkalmazási előírása izotóniás konyhasóoldattal való hígítást javasol.
Legfeljebb 25°C-on tárolandó.
Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer!
OGYI-T-3514/04

1-8891212

* 3 liter desztillált vízzel 27 gramm/nap konyhasót juttat be, kálium nélkül!

Gy.sz.: 3150611

Talmud (Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap):

10 a. lap.) Legelőször Izrael országa teremtetett, azután az egész világ. Izrael országát maga az Ur öntözi, az egész világot pedig egy követe. Izrael országa esővizet iszik, az egész világ pedig a maradékot. Izrael országa iszik először és azután az egész világ, hasonlóképpen egy olyan emberhez, aki sajtot készít s az élvezhető részt kiválasztja, a hasznavehetetlent megolt hagyja.

Code: Talmud Dvíz + NaCl

93 b. lap. Betegség alatt az épít kell érteni, még pedig azért, mert az 83 betegségnek van kitéve; a „betegség” szó ugyanis ezt a számot adja. De mindenképpen először egy aszkenyér s rá egy korai víz. (Ugyanez áll a Baba m. 107 b. alatt is.)

Népi rtó nátriumhiány és káliumtúladagolás

NOBEL-DÍJAS MELLÉKVESEKÉREG KUTATÓK ÉLETTANI KÍSÉRLETEI IS BIZONYÍTJÁK, HOGY A „STOP SÓ NEMZETI SÓCSÖKKENTÉSI PROGRAM”, AMI HAMIS ELMÉLETEKET HAMISAN IGAZOLÓ „EPIDEMIOLOGIAI STATISZTIKÁKRA” HIVATKOZIK, TUDATOSAN MEGSOKSZOROZZA A NEMI TORZULÁSOK, A NEMZŐKÉPTELENSÉG, DE A RÁK- ÉS A TÖBBI ÉLETRÖVIDÍTŐ BETEGSÉG GYAKORISÁGÁT IS.

A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában, „A biológia aktuális problémái” főcím alatt található **„A mellékvesekéreg biológiája”** c. fejezet. Aki írta, az akadémiai nívódíjas Dr. Szabó Dezső azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek alapján **Kendall, Reichstein és Hensch 1950-ben Nobel-díjban részesültek** „a mellékvesekéreg-hormonok és szerkezetük és biológiai hatásuk” felfedezéséért. Az összefoglalás jellegű leírás emellett további **61 tudományos publikáció** mérési eredményeire is hivatkozik (zárójelben jelzem, hogy a könyvből idézett megállapítások a könyv mely oldalain találhatók).

EZEK A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK EGYBEHANGZÓAN BIZONYÍTJÁK AZT, HOGY A NÁTRIUMHIÁNYOS ÉS KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT EMBEREK ÉS PATKÁNYOK MELLÉKVESEKÉREG HORMONTERMELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A TUDOMÁNYOS KUTATÓK VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEKSEL RENDELKEZNEK (134), AMELYEK SZERINT A NÁTRIUMHIÁNYOS VAGY KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT ÁLLATOKBAN (PATKÁNYOKBAN) ÉS EMBEREKBN IS MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK BE, MIKÖZBEN A SZERVEZET ELEKTROLIT-HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)

A későbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrövidítő, ivartalanító stb. hatások, például konkrétan a következők:

1./ A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik. (140)

2./ A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás alakul ki. (167)

3./ **A különböző stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)**

4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsősorban a vesesejteknel, de a verejtéksejteknel és az emésztőrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez hosszabb ideig tart, törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet:

5./ Idővel nátrium-hiány jön létre. (168)

6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)

7./ Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168)

8./ Romlik a keringés. (168)

9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szűrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)

10./ Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168)

11./ A bőr és a nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)

12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)

13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)

14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)

A hiányos nátrium pótlás és vagy kálium túladagolás miatti egészségromlás leggyakoribb tünetei:

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)

20./ A vér besűrűsödése miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést, renintermelő vesedaganatok jönnek létre. (169)

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait, a nemi jelleg eltorzulást („pseudohermafroditizmust”) is okoz, emiatt lett, lesz egyre több a homoszexuális :

21./ Leánymagzatok nemi szerveinek a fejlődési zavarait, pl. szeméremajkak összenövését, klitoriszmegnagyobbodást. (169-170)

22./ Lánygyermeknél klitoriszmegnagyobbodást, idő előtti menstruációt. (170)

23./ Felnőtt nőknél: klitoris-megnagyobbodás, test- és arcszőrsődés, kopaszodás, érdes hang, a menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)

24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erőteljes izomzat kifejlődést, a testnövekedés gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszőrzet idő előtti megjelenését, korai szakáll- növekedést, hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)

25./ Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermeknél és férfiaknál emlő-megnagyobbodást okoz. (170)

26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztatarák) növekedését serkenti. (170)

ÉS KONKRÉTAN MIT TEHETÜNK

AZ ÜGGYEL FOGLALKOZÓ ÜGYÉSZEK ÉS EZEK (HAMIS) SZAKÉRTŐI TÖBB MINT 20 ÉV ÓTA, ISMÉTLŐDŐEN „NEM BŰNCSELEKMÉNYNEK” MINŐSÍTIK A KONYHASÓHIÁNNYAL ÉS KÁLISÓVAL NÉPIRTÁST. A SÓKITERMELŐ CÉGEK ÉS ÉLELMISZER BOLTOK TÖBBSÉGE, DE AZ EZEKET „ELLENŐRZŐ” HAZAI HATÓSÁGOK SEM HAJLANDÓK ELÁRULNI A KÁLISÓVAL KEVERT SZABVÁNYSÉRTŐ ÉTKEZÉSI „SÓK” ÉS AZOKKAL KÉSZÍTETT ÉLELMISZEREK KONYHASÓ- ÉS KÁLIUMTARTALMÁT. A MÉRGEZÉS OKOZÓI AZ INTERNETEN ÉS EGYÉB PUBLIKÁCIÓKKAL BÜNTETLENÜL RÁGALMAZHATJÁK A FENTI BŰNCSELEKMÉNYEK KIDERÍTŐIT, BIZONYÍTÓIT. SOKSZOR AZT IS TAGADJÁK, HOGY KÁLIUMTARTALMÚ ÉTKEZÉSI SÓK IS FORGALOMBAN VANNAK! PL. TISZTA KÁLISÓ A „KOSHER TANÚSÍTVÁNYOS BONSAIT”. KÁLISÓT TARTALMAZ. A HOLOKAUSZT ÁLDOZAT „SARA LEE”-RŐL (BOSSZÚBÓL?) ELNEVEZETT HASONNEVŰ CÉG „CSÖKKENTETT NÁTRIUMTARTALMÚ” SÓ IS. A BONOSAL ÉS A VIVEGA STB. A „VIVEGA” „TALÁLMÁNY”. AZ BENNE A TALÁLMÁNY, HOGY A BELEKEVERT ERŐS ÍZŰ FÜSZEREK ELFEDIK A 40%-NYI KÁLISÓ MÉRGEZŐSÉGÉT JELZŐ CSÍPŐS, KESERNYÉS ROSSZ ÍZT! EGYÉBKÉNT A HAZAI GYÓGYSZERTÁRAK „KONYHASÓ PÓTLÓ GYÓGYTÁPSZERKÉNT” IS ÁRUSÍTOTTÁK A 99% KÁLISÓT TARTALMAZÓ, VAGYIS PATKÁNYMÉREG „REDI-SÓ”-T IS! SOK EGYÉB HAZAI SZABVÁNYSÉRTŐ ÉTKEZÉSI SÓBAN IS 20-50% KÁLISÓ VAN! SÓT OLYAN „CSÖKKENTETT NÁTRIUMTARTALMÚ ÉTKEZÉSI SÓT” IS ÁRULNAK, AHOL A MÉRGEZŐ KÁLISÓT CSAK RÁTÖLTIK A KONYHASÓRA, HOZZÁ SEM KEVERIK! PÉLDÁUL EGY NYÍRTASSI CÉG IS ILYENEKET FORGALMAZOTT!

A fenti módszerrel előidézett betegségeket mindenféle más okokra vezetik vissza, miközben ezt a két fő okot, a nátriumhiány okozást és káliummérgezés okozást elhallgatják, vagy ellenkező hatásúnak tüntetik fel. Miniszteri, államtitkári szintről „elavultnak” hazudják az élettani optimum szerinti (fiziológiás mértékű) sópótlást, a vér-elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelő étkezést. Pedig a fiziológiás sópótlás helyességét a tengervíz, a magzatvíz és a vérszérum és a GYÓGYÍTÁSRA TÖBB SZÁZ ÉV ÓTA ALKALMAZOTT fiziológiás infúziós Ringer-oldat ezekével azonos, optimális nátrium és kálium dózisarányai is KÉTSÉG KIZÁRÓAN igazolják!

ISMERT ORVOSI TANKÖNYVEK SZERINT EKG TORZULÁS IS MUTATJA, HOGY A NAPI 3-4 GRAMMNÁL TÖBB KÁLIUMNAK A SZÁJON ÁT BEJUTTATÁSA AZ EGÉSZSÉGES FELNŐTTNEK IS RONTJA A SZÍVMŰKÖDÉSÉT, SÓT, 1 ÓRÁN BELÜL, PL. ITALLAL VÉRBE JUTTATVA, MÁR 1 VAGY 2 GRAMM KÁLIUM IS VESZÉLYESEN MEGMÉRGEZHETI!

4.

http://www.hazipatika.com/gyogyszerkereso/termek/kalium-r_tabletta/874

KÁLIUM-R tabletta



Hatóanyag:
potassium
chloride

ATC:
Kalium
chloride

Vényköteles

- Normatív TB támogatás: **igen**
- Közgyógyellátásra adható: **igen**
- EÜ támogatásra adható: **nem**
- EÜ 100 támogatásra adható:
nem

Stop só, Menzareform

<http://www.stopso.eu/>

FROM : AGROINVEST KFT. Mosonmagyaróvár PHONE NO. : 00 36 96 579752 Feb. 10 2011 10:56AM P2

Iratjel: Tisztifoorvosi-kozokirat-hamisitas-110210m3a

Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet
Alapítva: 1949

OÉTI Intézetvezető: Dr. med. habil. Martos Éva főigazgató főorvos

FŐIGAZGATÓSÁG

Konyhasó és nátrium

A nátrium ugyan az egyik legfontosabb makroelem a szervezet számára, de napi 1,5-2 gramm nátrium elegendő a szervezet napi nátriumigényének fedezéséhez. A nátrium csaknem teljes egészében a konyhasóból származik, 2 gramm nátrium 5 gramm konyhasónak (NaCl) felel meg. A WHO által ajánlott maximális bevitel napi 5 gramm só, ami egy teáskanálnyi mennyiség. Az európai országokban a tényleges sóbevitel ennél jóval magasabb (9-12 gramm/nap), míg hazánkban az OÉTI által végzett legújabb reprezentatív lakossági táplálkozási felmérés (OTÁP2009) adatai szerint a sóbevitel férfiaknál 17,5, míg nőknél 12,1 gramm, azaz az ajánlott érték több, mint háromszorosa. Sajnos gyermekek esetében is hasonló a helyzet, mint azt az óvodások körében végzett országos felmérés is igazolja (Országos helyzetkép az óvodai közétkeztetésről).

A kálium, nátrium és a vérnyomás

Számos bizonyíték támasztja alá a káliumbevitel és a vérnyomás közötti fordított összefüggést, a magasabb kálium-bevitel endotél-funkciót javító és szív- és érrendszer-védő hatását, a bőséges zöldséget, gyümölcsöt tartalmazó, így káliumban gazdag étrend vérnyomáscsökkentő hatása bizonyított.

A nátriumbevitel csökkentése és a káliumbevitel növelése egyaránt vérnyomáscsökkentő hatású, mind normális, mind magas vérnyomásos egyéneknél. Bizonyítottnak tekinthető, hogy minden olyan diétás módosítás, amely a Na-bevitel csökkentésére, illetve a K-bevitel növelésére irányul, jelentősen hozzájárul a lakosság egészségi állapotának javulásához, a szív és érrendszeri betegségekből eredő halálozás csökkentéséhez.

Az Amerikai Hypertonia Társaság 2009-ben megjelent állásfoglalása a vérnyomáscsökkentést eredményező táplálkozási ajánlásokról egyebek mellett javasolja, hogy a nátrium-fogyasztás ne haladja meg a 2,3 grammot naponta, a káliumbevitel érje el a 4,7 gramm/nap szintet. Megállapítja, hogy egészséges egyéneknél, normál vese-funkció mellett a napi 4,7 gramm káliumbevitelt meghaladó étrend sem jelent semmilyen kockázatot, mivel a felesleg a vizelettel kiválasztódik.

4. Amerikai hivatalos kiadvány arról, hogy a vérérszékelyben mindössze napi 0,2 – 0,4 grammnyi káliumot szükséges pótolni ahhoz, hogy kálium hiány ne lehessen:

Recommended Dietary Allowances

10th Edition

Subcommittee on the Tenth Edition of the RDAs
Food and Nutrition Board
Commission on Life Sciences
National Research Council



NATIONAL ACADEMY PRESS
Washington, D.C. 1989

Estimate of Requirements

Adults Potassium requirements have been evaluated in only a few studies. Although losses on a low or "minimum" potassium diet are small, potassium is less well conserved than sodium (see Table 11-1). Fecal losses are less than 400 mg (10 mEq) per day, and renal losses may approach 200 to 400 mg (5 to 10 mEq) per day (Squires and Huth, 1959). Other losses (e.g., in sweat) are negligible. On intakes of about 20 mEq/day, metabolic balance is achieved at the expense of reduced body potassium stores (up to 250 mEq) and in some cases with reduced plasma levels (<4 mEq/liter). To maintain normal body stores and a normal concentration in plasma and interstitial fluid, an intake of about 40 mEq/day may be needed (Sebastian et al., 1971). Therefore, it would appear that the minimum requirement is approximately 1,600 to 2,000 mg (40 to 50 mEq) per day. There is considerable evidence that dietary potassium exerts a beneficial effect in hypertension, and recommendations for increased intake of fruits and vegetables (NRC, 1980) would raise potassium intake of adults to about 3,500 mg (90 mEq) per day.

Izzadsággal elhanyagolható, a széklelettel és vizelettel pedig mindössze 0,4-0,8 gramm a napi káliumvesztése egy felnőttnek. Ennél többnek a pótlása nem csak felesleges, de veszélyes is lehet. (Code: USA-Dietary256b)

A mi Antirandom mérésünk eredményeinek a Falurádióban közzétételét követően, beismert egy szlovákiai kutató alábbi cikke, hogy a talajvíz kálium tartalmát a 90 mg/kg természetesnél nagyobbra növelve a "műtrágyaként" adagolt káliumvegyületekkel, számos betegséget lehet okozni a növények, de az állatoknak és az emberek részére is, ez utóbbiakat meddővé is teszi, s a hagyományosnak a többszörösére növelhető vele a természetes önköltség.

Budapest, 2007. 02. 19. Tejfalussy András /mérési szakértő/

A termőterületek műtrágyázásával, illetve a terméseredmények szempontjából a kompozit optimális mértékével és ennek környezeti hatásával nem egy szakács, élektéző, vagy talajszelvénytelési foglalkozás a saját hasábján. A műtrágyázás egyik legfontosabb negatív hatásaként a zöldségfélékben és egyéb növényi termékekben feltehető nitrógenszámakozások nevezik meg, s ezzel összefüggésben felhívják a figyelmet a nitrógentartalmú műtrágyák túlzott alkalmazására.

A Szlovák Tudományos Akadémia Kísérleti Növénykörtani és Rovartani Intézetében elért legújabb eredmények azonban egy másik "bűnös" mutatnak rá, amely részt vállal a modern mezőgazdaságban mutatózó negatív jelenségek szinte mindegyikéből. Ez a figyelemre és főleg ellenőrzésre méltó elem – Ján Kráľovičnak, az említett intézet munkatársának véleménye szerint – a kálium, amelynek problémájával már évtizedek óta foglalkoznak.

Gond a tejjel

A probléma bevezetőjében el kell mondanunk, hogy a csehszlovák mezőgazdaság a műtrágya-felhasználása, a gyom és rovarirtószerek alkalmazása területén is túl van azon a határon, amit a termelés mennyisége és minősége szempontjából optimálisnak nevezhetünk. Általánosan elterjedt nézet – mivel a termékekben magas a nitrátok aránya – hogy a talaj nitrógenrel van túlterhelve. A nitrátok problémája természetesen komoly és aktuális, de a legújabb eredmények arra engednek következtetni, hogy ebben is a túladagolt kálium, illetve néhány helyen foszfor hatását kell látnunk.

Közdött, hogy viszonylag magas számú nitrát a növénytermesztés, de problémák vannak az állattenyésztésben, ahol a világ fejlett országaival való összehasonlítás nem éppen hízelgő a számunkra. Ez leginkább a tömegtermékek minőségével kapcsolatban öltözik ki. A tejtermeléshez például sokkal több erőtakarmányt használunk fel, mint más fejlett szarvasmarha-tenyésztéssel rendelkező országok, mivel tömegtermékkel nem tudjuk elérni a kívánt teljesítményt. A szárlított tömegtermék ugyanúgy nálunk 25-30 gramm káliumot is tartalmaz kilogrammonként, noha az optimális mennyiség 10-15 gramm között lenne. De ugyanígy probléma a burgonya keményítőtartalma, illetve a cukorrépa cukortartalma, sőt még a gabona koral értéke is, amely utóból leg-

jobb feltételek veszteségeit okoz hektáronként. Mindez Kráľovič mérők szerint a káliumtartalomra vezethető vissza.

Hiányzó mikroelemek

A kálium az az alapvető elem, amely a növényekben az ionok felvételétől dönt. Bizonyos koncentrációig harmonikusan felvessz mindenféle iont, de egy határon túl blokkolni kezd a kalcium és a magnézium felvételét. Ezek az ember és az állat ásványi

kedvező körülmények alakulnak ki a káliumot korlátozó gyomok felmérése is, s ezek már nagymértékben elszaporodtak. Ha körülnézünk a földeken, ahol egyébként egyre több gyomirtót használunk, bizonyos fajta gyomok eltűnnek, mások viszont állandóan terjednek. Ekkor ugyan a környék, amelynek nem kedvez a kálium, de van helyette foszfor és foszfor túska minden mennyiségben. Ezek ellen újra herbicidet használunk, ami gátolja a foszforintézet, tehát megint csak elősegíti

De nemcsak a növények ellenállóképességét, illetve a mezőgazdasági termékek ásványi anyag-összetételét befolyásolja, hanem közvetlen hatással van a gazdasági haszorra is. A burgonyában valamikor a halvas évekig még 20-21 százalékos volt a keményítőtartalom, amely mára 13-14 százalékra csökkent, s ugyanez a helyzet a cukorrépánál is, ahol a halvas évekig 18-20 százalékos cukortartalmat mérhettünk, s mára az átlag 14,6 százalék. Ehhez tudnunk kell, hogy az ötvenes években a talaj káliumtartalma kilogrammonként még körülbelül 90 milligrammnál szűkebb volt, s mára már 250 körüli értéket is mérhettünk.

Csökkenteni kell

Ahhoz tehát, hogy a fentebb leírt problémákat kiküszöböljük – az SZTA Növénykörtani és Rovartani Intézetének eredményei szerint – a legfontosabb feladat a talaj káliumtartalmának csökkentése. Ez nemcsak jobb terméseredményeket hozhat, hanem ami lényeges, javítja annak minőségét, és csökkenti az egyéb műtrágyák, a növényvédő és rovarirtószerek felhasználását is. Évek óta végzik a kálium és a nitrógen arányának a terméseredményekre való hatásait vizsgáló kísérleteket. Bebizonyosodott, hogy a legnagyobb terméseredményeket akkor érik el, ha a talaj káliumtartalma 90 mg mennyiségű káliumot tartalmaz, és hogy a terméseredmények 200 milligrammnál, különböző években 16-24 százalékkal is csökkenhetnek. Ez a 200 mg a jelenlegi átlagos szint.

A talaj káliumtartalmának csökkentése megoldandó a nitrátproblémát is. Bebizonyosodott ugyanis a kísérletek során, hogy a nagyobb mennyiségű termés elérése érdekében magas káliumtartalom mellett háromszor-négyszer nagyobb mennyiségű nitrógen kell felvennie a növénynek. Ezen kívül a talaj káliumtartalmának csökkentése még egy sor más probléma megoldásában is segítene és egyszerűbbé tenné – természetesen olcsóbbá is – a mezőgazdasági termelést. Ehhez a tudományos dolgozók véleménye szerint szükséges, hogy mindenütt pontosan megállapítsák a talaj összetételét és kidolgozzák a műtrágyák szükséges adagolásának arányát. Ezeknek a méréseknek az elvégzésére az agrárművelő vállalatok minden nagyobb befektetés nélkül képesek, tehát elsősorban a mezőgazdaság dolgozóin múlik, hogyan közelítenek a felvetett problémához.

(Székely)

Túl sok a kálium


Új szempontok a műtrágyázásban

lápideknek alapelvei. Hiányuk csontlágyság, csontritkulás, izületi gyulladásokat okozhat, és manapság ezek a betegségek, az erre való hajlam már fiatal korban is sok esetben megfigyelhető. A káliumot és a magnéziumot a növényi lápidek, például a zöldség juttatják a szervezetbe, vagy a tej, de ha ezekből hiányzik, akkor természetesen más úton kellene és súlyosabb esetben kell pótolni. De ez csak két elem. A talaj magasabb káliumszintje más mikroelemek felvételét is akadályozza, például a légszempontigát "törösz" váz, vagy a már említett nitrátok lebontásához szükséges molibdén, mangán és cink felvételét. Ha ezek a mikroelemek ott vannak a szervezetben, akkor a nitrátokat ammóniákká bontják, és az átválik a szervezetből. Ha hiányoznak, akkor ez a szintézis nem megy végbe, csak nitritok vagy egyéb nitrógenszámakozások, például nitrozaminok keletkeznek, s mivel ezek karcinogén anyagok, betegségeket idéznek elő. A talajban lévő kálium a cink felvételének blokkolójával a gazdasági állatok reprodukcióját is veszélyezteti. = MEDDVE TESZ ÖMET (IS)

Deformálja a sejtet

Mivel a kálium nem engedi meg, hogy a növény elegendő kalciumhoz és magnéziumhoz jusson, ezzel lönkeleszi a sejteket, és emiatt növekszik a növények érzékenysége. A sejteket könnyen megáramlathatják mikroorganizmusok, egyéb kórokozók, s mivel a talaj sejtszerkezetet elősegíti a szabad aminosavak felvételét – amelyek a mikroorganizmusokat lápidek – így azok elszaporodnak, a növényekben betegségek jelennek meg.

a kálium felvételét. Ez újra lazábbá teszi a sejtek kötését, s csökkenti a körkötőkékel szembeni ellenállást, amelyet természetesen rovarirtóval kezelünk. Ez újra megindítja a problémák láncolatát, és a kör bezárul. S mindezekben a folyamatokban, amelyek bonyolultabbá teszik és drágítják a termelést, romlik a termékek minősége, alapvető okként ott találjuk a káliumot.



A burgonya keményítőtartalmának és a cukorrépa cukortartalmának alakulása a talaj káliumtartalmának függvényében

Tejfalussy András szerint az növényi tápanyagok felvételéhez a káliumot a Fehér Béla által a "Nem igaz, mert ez csak a talajból kódkódó káliumtartalom! Egy 1000 négyzetméter 2% átlagos káliumtartalmú talajnak az 5 méteres termőrétegében kb. 150000 kg kálium van!

Code: TulSokKalium880916-070310

Ez a cikk is fedezi azt a talajmérési alapú csalást, hogy "a talajok összes káliumtartalmának" tüntetik fel a talajok vízben oldott káliumtartalmát. A talajok természetes káliumtartalma 1-6%, a vízben oldott káliumtartalomnak a több százszorosát!

... A burgonyában valamikor a halvas évekig még 20-21 százalékos volt a keményítőtartalom, amely mára 13-14 százalékra csökkent, s ugyanez a helyzet a cukorrépánál is, ahol a halvas évekig 18-20 százalékos cukortartalmat mérhettünk, s mára az átlag 14,6 százalék. Ehhez tudnunk kell, hogy az ötvenes években a talaj káliumtartalma kilogrammonként még körülbelül 90 milligrammnál szűkebb volt, s mára már 250 körüli értéket is mérhettünk.

Csökkenteni kell

Ahhoz tehát, hogy a fentebb leírt problémákat kiküszöböljük – az SZTA Növénykörtani és Rovartani Intézetének eredményei szerint – a legfontosabb feladat a talaj káliumtartalmának csökkentése. Ez nemcsak jobb terméseredményeket hozhat, hanem ami lényeges, javítja annak minőségét, és csökkenti az egyéb műtrágyák, a növényvédő és rovarirtószerek felhasználását is. ...

Azzal a hazug ürítéssel növelik mérgezőre a talaj vízben oldott káliumtartalmát, hogy "fel kell tölteni a talajt a káliummal is".

Code: TulSokKalium880916-070310

... Évek óta végzik a kálium és a nitrógen arányának a terméseredményekre való hatásait vizsgáló kísérleteket. Bebizonyosodott, hogy a legnagyobb terméseredményeket akkor érik el, ha a talaj káliumtartalma 90 mg mennyiségű káliumot tartalmaz, és hogy a terméseredmények 200 milligrammnál, különböző években 16-24 százalékkal is csökkenhetnek. Ez a 200 mg a jelenlegi átlagos szint.

A talaj káliumtartalmának csökkentése megoldandó a nitrátproblémát is. Bebizonyosodott ugyanis a kísérletek során, hogy a nagyobb mennyiségű termés elérése érdekében magas káliumtartalom mellett háromszor-négyszer nagyobb mennyiségű nitrógen kell felvennie a növénynek. Ezen kívül a talaj káliumtartalmának csökkentése még egy sor más probléma megoldásában is segítene és egyszerűbbé tenné – természetesen olcsóbbá is – a mezőgazdasági termelést. ...

Tejfalussy András mérési szakértői meggyőzése a "Túl sok a kálium" c. cikkhez (Pacsonyi Új szöveg, 1988. 09. 16.)

A 90 mg/kg-os káliumtartalom nem a "talaj káliumtartalmát", hanem csak annak vízben oldódott részét. A talaj természetes káliumtartalma, ahonnan a víz folyamatosan kioldja és csúszva pótolódik a kálium, sokkal több, ha az átlagosan 1-6%!

Kutatási beszámoló részlet a "A HAZÁNKBAN SZÁMOTTEVŐ TERÜLETEN TERMESZTETT ZÖLDSÉGFAJOK HŐMÉRSÉKLETI IGÉNYEINEK VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KORAI FAJTÁKRA" című MTA 458/82/4.1. sz. pályázat zárójelentéséből.

A hőmérséklet, a fajta és az alapvető tápanyagellátottság /N, P, K/ hatását az AGROANAL PJT által "antirandom" néven szabadalmazott módszerrel, 5 tényező kísérletben vizsgáltuk. A talaj tápanyagellátottsága, a hőmérséklet és a fajták között kölcsönhatás mutatható ki. Azt tapasztaltuk, hogy a hőmérséklet emelkedésével csökken a paprika palánták tápanyag-konzentrációval szembeni tűrőképessége, azonban nagyobb K ellátottság mellett a növények magasabb hőmérsékleten is jobban elviselték a nagy N adagokat.

Az N, P, K ellátottság és a hőmérséklet tűrőképesség szempontjából vizsgált fajták palántái az alábbi sorrendbe állíthatók: Rekord, Soroksári hajtató, Javitott Cecei, Fehérszűn.

A Soroksári hajtató és a Fehérszűn fajták számára rövidebb, de magasabb hőmérsékleten történő palántanevelés kedvez, a Javitott Cecei és a Rekord fajták fejlődése a palántanevelési idő hosszával arányos.

Coda: kristofnéjelent

Kristóf Lászlóné dr.
tudományos munkatárs
Kertészeti Egyetem
Zöldségtermesztési Intézet

Hamis a kiértékelés, mert a kálisó műtrágya
tényleges hatása a Kertészeti Egyetem által
leírt hatások ellenkezője volt!
Bp., 1990. febr. 4. Tejfalussy András

A tényleges eredmény:



A Budapesti Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Zöldségtermesztési Kutató Intézetében, szabadföldi ANTIRANDOM MÉRŐTÉR.

A paprika a magas környezeti hőmérsékleten egy fóliaházban ritkult ki előzőleg. Ott pusztult ki fokozottabban, ahol a talaj kálisó-műtrágyát is kapott. (1983) ANTIRANDOM Software All Rights Reserved by inventor dipl. ing. A. Tejfalussy, Budapest. (Code: paprikasoroksar)



A megismételt mérés eredménye:

J e g y z ő k ö n y v

Felvéve ATT Verőcsemarosi kísérleti Állomásán, 1992. szeptember 9-én, az izraeli káliumnitrát élővilágvédelmi ellenőrző mérésének az együttes értékelése alkalmával.

Az értékelésen jelen vannak:

Tejfalussy /Sydo/ András ATT elnök

Böröcz Zsuzsanna Antirandom gmk vezető

Pelczéder Tibor növényvédelmi szakértő

Dr. Biczók Gyula KTM-OTVH főosztályvezető

Dr. Vajna Tamásné a KTM-OTVH ^{mezőgazdasági felügyelő} ~~élővilágvédelmi~~ szakértője

Rosta László, mint a KTM-OTVH ~~talajtani és növényvédelmi szak-~~
~~értője.~~ ^{Élővilágvédelmi Főosztály főmunkatársa} ^{külső határon}

A mérőtér elrendezésének és az értékelési módszernek /lásd. hátoldali segédlet/, a jelenlévők mindegyike közvetlenül ki tudja olvasni a növényzet látható jellemzőiből /termésmennyiség, levél-elészineződés, megdőlés/ annak interferencia képei alapján /Interaction Interference Test: IIT/ a következő kalibrálási eredményeket:

Kettő növény-/paprika-/fajtánál is mutatja a mérőtér növényzetének a strukturálódása, hogy az izraeli káliumnitrát csak abban az egy esetben károsítja kevésbé /kevésbé, mint a káliumklorid/ a növényeket, ha erősen áztatott talajban használják. Egyébként, a korábban nem trágyázott, ill. még nem műtrágyázott talajon is, a kálium mindkét formában történt adagolása erőteljesen csökkentette már kis, 25-60 kg/hektár dózisainál is, a növényzet alkalmazkodó és különösen a stressz-tűrő képességét. Ez mind a foszfát, mind a nitrogén, mind a fajta paraméterek perturbáló hatása esetén jól láthatóan megmutatkozott. Erőteljesen csökkenti a káliumos műtrágyázás a növényzet asszilyelviselését. Növeli a nitrátfelvételi veszteségeit, több káliumnál ugyanolyan termés és zöld levél szín nagyobb nitrogén műtrágya adagokhoz kapcsolódott /vismérgező hatás!/. A foszfát műtrágyakomponens 25-80 kg/hektár dózisok között növelte a növényzet alkalmazkodó és tűrőképességét és produktívát, száraz körülmények között a nitrogén már 75-125 kg/hektár dózis között is pszittította a növényzetet, növelte az asszilykért. Kálium nélkül a növények mindenhol - a vízmennyiségtől függően - kevés műtrágyával is egészségesek, jól produkáltak.

K.m.f.

..... Tejfalussy /Sydo/ András	 Böröcz Zsuzsanna	 Pelczéder Tibor
..... Dr. Biczók Gyula	 Dr. Vajna Tamásné	 Rosta László



EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI
MINISZTERIUM
Intézményi Főosztály

V. Budapest, Arany János u. 6-8.
Telefon: 301-7832
Telefax: 301-7833
E-mail: john.anna@eszcsm.hu

Előadó:
Hiv.szám:
Melléklet: 3 lap
Tárgy: ivóvíz-probléma
Válasz esetén kérjük levelünk számára és ügyintézésre hivatkozni.

Szám: 38261-3/2003-0007SIF

*Dr. Szenté Kálmán úrnak
alpolgármester*

*Verőce Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal*

*Verőce
Árpád út 40.
2621*

Tisztelt Polgármester Úr!

Dr. Csehák Judit miniszter asszonynak júliusban felvetett veszélytelen ivóvízzel kapcsolatos számos kérdését megvizsgáltuk. Elnézését kérem a hosszúra nyúlt ügyintézésért, de a téma közérdekű jellegére tekintettel az Országos Közegészségügyi Központ, az Országos Környezetegészségügyi Intézet, és az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet szakértőitől szakmai állásfoglalást kértünk.

Kérem, fogadja el részletes véleményüket, melyet mellékelten megküldök.

Budapest, 2003. november 13.

Üdvözléssel:

Dr. John Anna
főosztályvezető



Code: csehakverocela

Code: csehakverocelc

2

Pótolhatóak. Számos táplálék kiegészítő készítmény áll rendelkezésre, azonban ez nem mentesíti az államot és az ivóvíz szolgáltatót az egészséges ivóvíz biztosításának kötelezettsége alól. Az ivóvíz minőségéről szóló 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet 3. § (5) alatti – európai uniós előíráson alapuló – rendelkezés szerint az „...intézkedések következtében az ivóvíz minősége nem romolhat az emberi egészség védelme szempontjából lényeges tényezők tekintetében...”. Egyes esetekben (pl. jód- vas-, vagy fluoridpótlás céljából) így is szükség lehet táplálék kiegészítő készítmények használatára, azonban szociális szempontból nem lenne elfogadható, hogy az ásványi anyagok pótlásának további költségeivel is a fogyasztókat terheljük.

4. Lehet-e veszélyes a desztillált víz fogasztása?

Lehet, sőt akár az életveszélyes állapotot jelentő un. vízmérgezés is előfordulhat. Nagyfokú izzadás esetén a szervezet a kiválasztott vízzel együtt jelentős mennyiségű ásványi sót is veszít. A desztillált vízzel történő folyadékpótlás ilyenkor – egyéb úton történő sóbevitel hiányában – a szervezet ionegyensúlyának gyors felborulásához, gyengeséghez, fáradtsághoz, fejfájáshoz, majd izomgörcsökhöz, szívritmus zavarokhoz, sőt szívmegálláshoz és halálhoz is vezethet. Kevésbé drámai módon, de ugyancsak az ionegyensúly felborulásával károsítja a szervezetet az un. desztillált vizes böjt. Természetesen a desztillált víz akár évekig tartó fogasztása sem jelenthet egészségügyi kockázatot, ha az ásványi anyagoknak a táplálékkal történő beviteléről gondoskodunk. Azonban ilyenkor figyelembe kell venni azt is, hogy a különböző ásványok felszívódása a folyékony és a szilárd halmazállapotú táplálékból, valamint a tablettákból és drazséból nem azonos módon, időben és mennyiségben játszódik le. A felszívódással kapcsolatos ismeretek hiányában a vízből hiányzó anyagok pótlása nem mindig oldható meg optimális módon.

5. Milyen egyéb egészségügyi problémákat okozhat a desztillált, ill. az egyes ásványi anyagokban szegény víz tartós fogasztása?

Számos népegészségügyi tanulmány alapján nagy valószínűséggel igazoltnak tekinthető, hogy a kis keménységű (azaz kalciumban és magnéziumban szegény) ivóvíz fogasztása esetén nő a szív- és érrendszeri megbetegedések előfordulási valószínűsége. Ezen felül, élvezeti érték szempontjából sem elhanyagolható a megfelelő ásványi anyag tartalmú ivóvíz előnye a desztillált vízhez képest.

3.1.1 The addition of salt substitutes conforming to Sub Section 3.2 to a special dietary food with low sodium content is permitted and shall be limited by

3.2. Salt substitutes as such

3.2.1 The composition of salt substitutes shall be as follows:

A WHO ITT SZERVEZI, FEDEZI AZ ANTIFIZIOLÓGIÁS "SÓCSERÉVEL BETEGÍTŐKET:

- | | |
|--|---|
| (a) Potassium sulphate; potassium, calcium or ammonium salts of adipic, glutamic, carbonic, succinic, lactic, tartaric, citric, acetic, hydrochloric or orthophosphoric acids, and/or | Not limited, except that P not to exceed 4% m/m and NH_4^+ 3% m/m of the salt substitute mixture |
| (b) Magnesium salts of adipic, glutamic, carbonic, citric, succinic, acetic, tartaric, lactic, hydrochloric or orthophosphoric acids, mixed with other Mg-free salt substitutes as listed in 3.2.1(a), 3.2.1(c) and 3.2.1(d), and/or | Mg ⁺⁺ to be not more than 20% m/m of the total of the cations K^+ , Ca^{++} and NH_4^+ present in the salt substitute mixture and P not to exceed 4% m/m of the salt substitute mixture |
| (c) Choline salts of acetic, carbonic, lactic, tartaric, citric or hydrochloric acids, mixed with other choline-free salt substitutes as listed in 3.2.1(a), 3.2.1(b) and 3.2.1(d), and/or | The choline content, not to exceed 3% m/m of the salt substitute mixture |
| (d) Free adipic, glutamic, citric, lactic or malic acids | Not limited |

3.2.2 Salt substitutes may contain:

- | | |
|--|---|
| (a) Colloidal silica or calcium silicate | Not more than 1% m/m of the salt substitute mixture, individually or in combination |
| (b) Diluents: safe and suitable nutritive foods as normally consumed (e.g. sugar, cereal flour). | |

3.2.3 The addition of iodine-containing compounds to salt substitutes shall be in conformity with the national legislation of the country where the product is sold.

Joint FAO/WHO Food Standards Programme
CODEX ALIMENTARIUS VOLUME IX.

Codex Standards for Foods for Special Dietary Uses Including Foods for Infants and Children and Related Code of Hygienic Practice

WHO 1982. Rome

Témakód: WHO (Témakód: hamis kódex 82b)

Naponta kb. 500 mg. vagyis 1/10 teáskanálnyi nátriumra van szüksége a szervezetünknek, ami természetes módon fordul elő táplálékunkban. Hagyományos asztali só fogyasztásával átlagosan 2400-6900 mg nátrium kerül be a szervezetbe, amely raktározódik, megköti a vizet, **ízületi és szívproblémákat, izomgyengeséget, magas vérnyomást okoz**, hozzájárul a csontritkulás és a veseproblémák kialakulásához.

Ehhez nagy segítséget nyújt a **BONSALT NÁTRIUM MENTES SÓ**, amely természetes anyagokat tartalmazó ásványi só. ...

Normális testi funkcióinkhoz, testünk folyadékgyensúlyának szabályozásához szükségünk van sókra.

A Bonsalt minden egyes összetevője természetes eredetű és fogyasztásra alkalmas. **Kálium-klorid**, L-lizin mono-hidroklorid, **tisztított borkő**, Cream of Tartar, glutaminsav és szilikon-dioxid. Ezek mindegyike természetes, **jótékony hatást gyakorol a szívre**, a só nátriumtartalmát 100 grammonként 44,8 gramm káliummal helyettesítve.

A Bonsalt korszerű technológia alkalmazásával, a legszigorúbb minőségellenőrzési előírások betartásával készül ...

A **kálium-klorid** a termék sópótló összetevője.

A **szívbarát BONSALT** sós ízek szabadságát nyújtja.

Speciálisan alacsony kalóriatartalmával **bármely diétához** használható !!

A családok asztalainál a legjobb ízeket nyújtja az **EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD FELÉ A BONSALT**.

A termék rendelkezik a **Star-K Kosher** tanúsítvánnyal is.

BONSALT NÁTRIUM MENTES SÓ

A szívbarát BONSALT sós ízek szabadságát nyújtja.

A termék rendelkezik a Star-K Kosher tanúsítvánnyal is.

BONSALT natrium mentes só 0,85 gr 3 db

1800 Ft „



[Bonsalt Salt Without Sodium 0% 85g | Vitamins Outlet Express](https://www.vitaminsoutletexpress.com/unit/9114761/)

www.vitaminsoutletexpress.com/unit/9114761/

Bonsalt is the result of years of research in nutrition and conforms to the strictest quality control standards. **Bonsalt** also certified **Star-K Kosher**. Ingredients: ...

Pesti Központi Kerületi Bíróság
13.B.24.211/1993/2.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság Budapest, 1993. április 23-án, tárgyaláson kívüli meghozta az alábbi

v é g z é s t :

A "népirtás bűntette" és más bűncselekmények miatt ismeretlen tettesek ellen indult ügy iratait a bíróság a Budapesti V-VIII-XIII. kerületi Ügyészségnek küldi meg.

E végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.

I n d o k o l á s :

Tejfalussy András a bírósághoz április 7-én érkezett feljelentésében ismeretlen tettesek megbüntetését kérte az alábbiak miatt:

Mint az ANTROPALIZIS Tudományos Társaság Környezetvédelmi -és Önkéntesség Központjának Elnöke, évek óta foglalkozik a kálium különböző felhasználási módjai során az emberi szervezetre veszélyeztető hatásaival. Vizsgálódásai során tudomására jutott, hogy egyes klinikákon "nap 1,5-2 gramm káliummal beteg embereket mérgezték meg, majd ennek adatait az allergizációs-reagensították az engedélyezés intézői (MTA, MME, EU, CÉTI, KÖVÉL, stb.)" Feljelentésében megemlíti még, hogy hasonlóan veszélyes, mérgező tüneteket okozhat az ún. REDI só is, melyre az esetleges mérgezési tüneteket nem írják rá, napi 6-10 grammig ajánlják.

Fentiek alapján Tejfalussy András "népirtás bűntettőt" valószínűsítve a bíróságnak tette meg feljelentését mindazok ellen, akiket évek óta terhel a "káliumozott étkezési só és a káliumos műtrágyázás" alapján büntető jogi felelősség.

A feljelentésben írtak - bizonyítottságuk és valószínűségük esetén - olyan bűncselekmények lehetnek, pl.: foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, terrorizmus, stb., amely miatt a vádat az ügyész képviseli, ezért a bíróság a Bs.313.§.73/beküldés a./pontja alapján az iratok megdöntéséről rendelkezett.

A fellebbezést a Bs.321.§.d./pontja zárja ki.

Budapest, 1993. április 23.



dr. Dénes Veronika nk.
bíró

Code: 13B24211-1993

Code: KovacsPalMegbiz

Szám: ATT-22091992

Felkérés szakvélemény készítésére

Az OrTI-től már beszerezett REDI-Só engedélyezési anyagból mérési és engedélyezési eljárás tisztázási szakvélemény készítésére, Tótfalussy Andrást, mint az AGROANALIZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi és Gazdaságtudományi Ellenőrzési Központja elnökét szívesen megkírem, figyelemmel a kálium káros hatásainak felismerésével kapcsolatos előző eredményeire.


Budapest, 1992. április 20.



Dr. Kovács Pál

országgyűlési képviselő

Szociális és Egészségügyi Bizottság titkára



A fél liter vízzel

éhgyomorra megitatott 0,88 gramm kálium (2 gramm kálisó) és a kétszerese (4 gramm kálisó) felére rontotta az emberek vizelet kiválasztását. Utóbbi az EKG-t is torzító mérgezést (hyperkalaemiát) okozott! Tíz előtte egészséges emberből mind a tíznél!

Ezek után, a csaló engedélyező orvosok, akár egyszerre elfogyasztásra is, „napi 10 grammig”, a konyhasó helyett alkalmazható „gyógytápszerként” ajánlják a mérgező Redi sóval „sópótlást”!



feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetvedelmi.pjt@gmail.com>
címezett:miniszterelnok@me.gov.hu;
erkeztetok@me.gov.hu
másolatot:miniszter@hm.gov.hu;
"ME - Érkeztetők (noreply)" <erkeztetok.noreply@me.gov.hu>;
kap:ferenc.kalmar@mfa.gov.hu
titkos
másolat:
dátum:2017. szeptember 28. 16:49
AZ MTA-VAL SZEMBEN KÖZZÉTETT MAGYARORSZÁGI ÉS NEMZETKÖZI
FELJELENTŐIRAT. Ezt a feljelentést jogos védelem (BTK) és megbízás nélküli
kárelhárítás (Ptk.) keretében, közérdekű bejelentőként, Orbán Viktor
tárgy:miniszterelnökhöz nyújtom be, miután nemrég bukott bele a fenti bűnözőket
bűnpártoló rendőrségi és ügyészségi vezetés az ellenem megkísérelt (6.)
bolonddá nyilvánítási retorziójába. (Iratjel: 13.B.24.211-93-2-OV-170928)
küldő:gmail.com

CSUPA HÜLYE ÉS GAZEMBER URALJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁT ÉS A HAZAI TÖRVÉNYHOZÁST ÉS VALAMENNYI PARLAMENTI VÁLASZTÁSI PÁRTOT?

1950-ben Nobel díjjal jutalmazott mellékvesekéreg kutatók a konkrét biológiai hatásméréseikkel jó előre bebizonyították a kálium túladagolás és a hiányos konyhasó pótlás fajirtó hatását. Más kutatók mérései is bebizonyították, hogy a gazdasági állatokat (is) ivartalanítják a káliummal műtrágyázott növények. A káliummal is műtrágyázott legelőn tartott kosok 4. nemzedéke már nem volt képes utódot nemzeni.

A létfontosságúnak feltüntetett kálium túladagolással népiirtás ellen nincs kihez fordulni. Valamennyi hazai és európai uniós vezető, valamennyi hazai parlamenti párt bűnpártolja. Csak egyénileg lehetne valamennyire védekezni, de a magyarok többsége már végzetesen elkésett vele. (Védekezni a Ringer infúziós oldat dózisa szerinti desztillált víz, konyhasó és kálium pótlással lehetett volna.) Csak a vegyi fegyver káliummal nem kiirtott nemzőképesű keleti népeknek van túlélési esélye! Miután Kína és az iszlám országok nem, ill. alig használtak káliumműtrágyát, ezek népei eddig még ezért nem ivartalanodtak. (Az 1950 után gyors ütemben felfutó kálisótermelési diagramjaikból valószínűsíthetően, a növényeket, állatokat és embereket is megmérgező káliumműtrágyázást előbb Izraelből, azután Kanadából is, elsősorban a Potash cég ügynökei népszerűsítették, népszerűsítik.)

A hazai kormányok „Nemzeti Stop só Program, Menzareform és Chips adó” megtévesztő elnevezésekkel, Európai Unió és WHO engedéllyel tervszerűen folytatják az étkezéssel vérmérgezően túladagolt káliummal, mint biológiai vegyi fegyverrel, a magyar nép kiirtását.

Orbán Viktorék nem a magyaroknak, hanem a „keleti népeknek” építtetik a sok stadiont, hogy kíváncsabbá tegyék a népiirtással és eladósítással kiürített ingatlanok vásárlását?

Egy izraeli tudós nemrég előadta, hogy a 2050-ben már nem lesz nemzőképes nyugati férfi, vagyis nemzőképes magyar férfi sem lesz. A káliumműtrágyázás és a kálisóval sózás az általa eltitkolt tényleges oka. Magyarországon kb. 1960 óta káliumműtrágyáznak és 1980-tól árulják a nátrium klorid konyhasó helyett a sok kálisót tartalmazó sókeverékeket, pl. a 99 %-ban kálisó REDI Sót, a Sara Lee, a Horváth Rozi emblémás stb. „csökkentett nátriumtartalmú sókat, a Bonosal sókeveréket, és újabban az „Izrael állami Star Kasher tanúsítványos nátriummentes” kálisót, a BONSALT-ot is, méregdrága egészségvédő „étkezési gyógysóként”. Tehát a mérgezés kezdetétől, a mérgezetek körében, 1960-tól számítva, valóban kb. 2050-re várható a végzetesen szaporodásképtelen 4. nemzedék!

Megnézhetitek róla a biológiai hatásmérési bizonyítékokat: <http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2017/11/emailkonyv-101-ivartalanitanak2050re.pdf>
(101. E-mail könyv: Konkrét hatás mérési bizonyítékok az izraeli kutatók által a „nyugati férfiak” 2050-re jószolt teljes ivartalanodásának eltitkolt okáról, ami a mérgező kálium).

Verőce, 2018. február 18.

Jogos védelem (Btk.), s megbízás nélküli terrorelhárító közérdekű ügyvitel (Ptk.) keretében, a magyar választók felvilágosításához mindenki által terjesztéshez közzéteszi:

(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, számos hatásmérési nemzetközi szabadalom feltalálója, az ügyet minisztériumi, országgyűlési és önkormányzati megbízásból is vizsgáló szakértő (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com)

feladó: András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy <magyar.nemzetvedelmi.pjt@gmail.com>

címzett: András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>

másolatot kap: Az Alkotmánybíróság ügyfélkapuja <ugyfelkapu@mkab.hu>;

ferenc.kalmar@mfa.gov.hu;

miniszterelnok <miniszterelnok@me.gov.hu>;

"ME - Érkeztetők (noreply)" <erkeztetok.noreply@me.gov.hu>;

miniszter@hm.gov.hu;

"Érkeztetők (ME)" <erkeztetok@me.gov.hu>;

Orbán Viktor <orbanviktor@orbanviktor.hu>;

Balog Zoltán <zoltan.balog@parlament.hu>;

Elnok@kuria.birosag.hu;

"Prof. Dr. Papp Lajos" <szivvel.lelekkel.pl@gmail.com>;

MVSZ Patrubányi Miklós <elnok@mvsz.hu>;

"dr. Lehmann György" <lehmann@gmail.com>;

drabikjanos <drabikjanos@gmail.com>;

"weixl.varhegyi.laszlo" <biolaci47@gmail.com>;

Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orkf.police.hu>

titkos másolat:

dátum: 2018. február 19. 9:14 tárgy: Re: Közérdekű bejelentés Orbán Viktor miniszterelnökhöz: BŰNSZERVEZET A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TUDOMÁNYETIKAI BIZOTTSÁGA (Kód:

MTAetikaibizottsagi180216)küldő: gmail.com

feladó: **Érkeztetők (ME)** <erkeztetok@me.gov.hu>

címzett: András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy <magyar.nemzetvedelmi.pjt@gmail.com>

dátum: 2018. február 19. 9:14

tárgy: Válasz

küldő: me.gov.hu

biztonság: A(z) gov.hu nem titkosította az üzenetet [További információ](#)

Tisztelt Levélíró!


Elektronikus levele megérkezett a Miniszterelnökségre.

Üdvözzettel:

Miniszterelnökség

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.

BÜNSZERVEZET A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TUDOMÁNYETIKAI BIZOTTSÁGA

Az általam vezetett Agroanalízis Tudományos Társaság 1980 óta fellép a kálissóval növény-, állat és ember mérgezés ellen. Méréseink szerint ugyanis semmi haszna a káliummal talajműtrágyázásnak. Növeli a költségeket és sokszorosra fokozza az aszálykárt. 1950-ben Nobel díjas és más tudományos kutatók mérései szerint is, a növények káliumműtrágyázással növelt káliumtartalma az állatoknál és embereknél mérgezést, s ezáltal nemzőképtelenséget is okoz (az élelmiszerek akárhogy megnövelt káliumtartalma). Újabban egy izraeli tudós előadta, hamis indokokra hivatkozva, hogy 2050-re a nyugati férfiak nemzőképtelenné válását várják. Én viszont már 2002-ben kértem a Magyar Tudományos Akadémia ún. Tudományetikai Bizottságát, hogy állítsák le az ivartalanító hatású kálium műtrágyázást és mérgező kálissóval ételízécsítést, s magyarázzák meg, s indokolják is, hogy Kína és az iszlám országok miért nem, ill. miért alig alkalmaznak talajtrágyázásra káliumműtrágyát. Kína termőföldjein, lásd a fenti, International Fertiliser Association diagramon, 1986-ban, hektáronkénti éves átlagban, 408 kg nitrogénnel, de 17 kg-nál is kevesebb káliummal műtrágyáztak!!!! A kérésem és probléma felvetésem miatt megrágalmaztak az Akadémiai Közlönyben. „Tudománytalannak” minősítették a nemzetközi hatásmérés tudományi szabadalmaimat, s azokra alapozva elvégzett biológiai hatásvizsgálatokat. Ezért a Közlönnyel félrevezetett valamennyi hazai és nemzetközi tudományos kutatónak javaslom a „kaliummalfajirtanak180215”, és „MTAsszerzoi jogicsalasi per180212” iratjelű mellékletek, s a neves kutatóintézeti, akadémiai és egyetemi professzorok által írt, a honlapomon közzétett szakvélemények tanulmányozását is: <http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/referenciak.htm>.

Belátható, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Tudományetikai Bizottsága bebizonyította magáról az engem és tudományos eredményeimet nemzetközileg rágalmozó 2002-es hamis határozatával, hogy a magyar férfiak izraeliek által 2050-re várt nemzőképtelenné tételében bűnsegédkező terrorista bünszervezet!

Verőce, 2018-02-16.

Jogos (ön)védelemként (Btk.), megbízás nélküli kárelhárítás keretében (Ptk.), bárhol terjesztésre közzétette: Tejfalussy András oknyomozó mérnök feltaláló, korábbi minisztériumi, országgyűlési, önkormányzati és tudományos akadémiai hatás-mérés tudományi szakértő (sz.szám: 1-420415-0215, an.: Bartha Edit), 2621 Verőce, Lugosi u. 71., (www.tejfalussy.com, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, + 36 20 218 14 08)

Cc.: Orbán Viktor miniszterelnök részére, a magyarok mentésében segítségét kérve, mint nyilvános közérdekű bejelentés (A fenti mellékletek majd a www.tejfalussy.com honlap MEHNAM rovatában lesznek közzétéve!)

2./2 Kód: MTAetikaibizottsagi18021email2

feladó: **András Tejfalussy** <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
ferenc.kalmar@mfa.gov.hu;
miniszterelnok <miniszterelnok@me.gov.hu>;
címzett: "ME - Érkeztetők (noreply)" <erkeztetok.noreply@me.gov.hu>;
miniszter@hm.gov.hu;
"Érkeztetők (ME)" <erkeztetok@me.gov.hu>
Orbán Viktor <orbanviktor@orbanviktor.hu>;
Balog Zoltán <zoltan.balog@parlament.hu>;
Elnok@kuria.birosag.hu;
másolatot kap: "Prof. Dr. Papp Lajos" <szivvel.lelekkel.pl@gmail.com>;
MVSZ Patrubiányi Miklós <elnok@mvsz.hu>;
"dr. Lehmann György" <lehmann@gmail.com>;
drabikjanos <drabikjanos@gmail.com>;
"weixl.varhegyi.laszlo" <biolaci47@gmail.com>
titkos másolat: . . .
 dátum: 2018. február 16. 14:46
 tárgy: Közérdekű bejelentés Orbán Viktor miniszterelnökhöz: BŰNSZERVEZET A MAGYAR TUDOMÁNYOS
 AKADÉMIA TUDOMÁNYETIKAI BIZOTTSÁGA (Kód: MTAetikaibizottsagi180216)
 küldő: gmail.com

2 melléklet

feladó: **Érkeztetők (ME)** <erkeztetok@me.gov.hu>
címzett: András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
 dátum: 2018. február 16. 14:46
 tárgy: Válasz
 küldő: me.gov.hu
biztonság: A(z) gov.hu nem titkosította az üzenetet [További információ](#)
.:Fontos a varázsgömbünk szerint.

4./1 Kód: nemzetbiztonsagifeljelentés180219email2

AZ ORSZÁGGYŰLÉS NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGÁHOZ IS FELJELENTÉS POLT PÉTER LEGFŐBB ÜGYÉSZ ÉS TÁRSAI ELLEN

1./A hazai **OÉTI**-s mérések során 0,88 gramm kálium, 2 gramm REDI SÓ, fél liter vízben oldva éhgyomorra egyszerre megítatása **10-ből 10** embernél vesemérgező, a kétszer ennyi pedig **10-ből 10** embernél másfél órán keresztül vérmérgező (hyperkalaemizáló) is volt, vagyis már ennyi is meghaladta a vese kálium eltávolítási sebességét.

2./A Pécsi Orvostudományi Egyetem mérései során a **8** darab Kálium-R tablettától, azzal 4 gramm kálium beszédetésétől, **6-ből 5** embernek fájt a gyomra, és egyiküknél véresre marta a gyomorfalat.

3./Kb. **1960** óta, káliummal műtrágyázással többszörösre növelt káliumtartalmú növények is mérgezik a káliummal műtrágyázó országok lakosságát. (**Kína és az iszlám országok** nem, ill. alig használtak káliumműtrágyát.) Miután a kosok **4. nemzedéke** nemzőképtelen lett a káliummal is műtrágyázott legelőn, a nyugati férfiak, köztük a magyar emberek, végzetes ivartalanodása, kiszámítható, hogy kb. 2050-re várható.

4./Az 1950-ben **Nobel díjat** kapott kutatók biológiai hatásmérései szerint, a patkányokat és embereket is megmérgezi, ha időegység alatt az optimálisnál több káliumot és vagy kevesebb nátriumot esznek, isznak.

5./A kálisóval műtrágyázás maga is nemzőképtelenné degenerálja a nyugati férfiakat. Az étkezési sóként a konyhasó helyett árusított kálisó pedig egyrészt arra szolgál, hogy a mérgezett emberek ne ehessék a kálium mérgezés ellen védő kellő mennyiségű konyhasót, másrészt arra, hogy ezekkel is fokozzák a mérgező kálium bevitelt. Lásd a Parlamentben **1992. december 8-án** három miniszter által előadott **8253.** számú hamis választ, vagy Surján László miniszter hozzám intézett választát, amivel az egy nap alatt akármennyi vízzel, akármilyen gyorsan bejuttatott **70** grammnál kevesebb káliumot „teljesen ártalmatlannak” nyilvánította. Bizonyíthatóan dr. **Bíró György** OÉTI vezető hamis szakvéleményére alapozta. A desztillált ivóvíz is csökkenti a kálium mérgezést, valamint a savanyúság és a cukrozott étel is. Ezeket „mérgezőnek” tüntetik fel, hogy biztosan eredményes legyen a káliumműtrágyával népirtás. (Étkezésnél is a **Ringer** infúzióval több száz év óta alkalmazott desztillált víz, konyhasó- és kálium dózisok lennének optimálisak, de ezeket egészségrontónak hazudják. A Ringer oldattal pl. egy nap alatt 3 liter desztillált vízzel 27 gramm konyhasót és 0,36 gramm káliumot juttatnak be a vérbe. Ez az optimális arány!)

4./2 Kód: nemzetbiztonsagifeljelentes180219email2

6./A REDI SÓ-val kapcsolatos jelentéseket megbízott parlamenti szakértőként, az OÉTI-től szereztem be. A **Kálium-R** tabletta mérgező hatásait ismertető klinikai jelentést pedig az **ORFK** szerezte be, egy általam a büntetőbírószágra tett feljelentés (**13.B.24.211/1993/2.**) alapján az ügyészség által elrendelt nyomozás során. A sikeresnek indult rendőrségi nyomozást azonban leállították.

7./Az általam feljelentett bűnözők napi 6-10 gramm kálisó REDI SÓ akár egyszerre elfogyasztására is felbíztatták a magyarokat. Ma is „legalább 4,7 gramm kálium étkezési pótlása van előírva naponta, holott 1-2 gramm is mérgező volt egyszerre elfogyasztva.! Egészségjavító étkezési sóként kálisót és kálisóval kevert konyhasót árusítanak. Lásd a csökkentett nátriumtartalmú Sara Lee, Horváth Rozi, Bad Ischler, Compact Douwe Egberts, Bonosal sókat, ill. a Redi sót felváltó, „Izrael állami Star **kosher** tanúsítványos **BONSALT** kálisót”.

8./Nyilván ezek okán nyilatkozhatta nemrég **Izraelben** egy, a nemzőképesség alakulását vizsgáló „**izraeli tudós**”, hogy ők **2050-re** a nyugati férfiak teljes nemzőképtelenségét várják. Persze csak hamis, ill. mellékes okokra hivatkozott.

9./WHO, EU, élelmiszer törvény és a sószabvány is engedi a (patkányméreg) kálisó konyhasó helyett étkezési „gyógysóként” árusítását. Lásd a „Nemzeti Stop Só Program, Menzareform és Chips adó” Reformétkezési csalásokat!

10./A honlapomon **közzétett** biológiai hatás mérési bizonyítékokat megküldtem a legfőbb ügyésznek. Ahelyett, hogy vádat emeltetett volna a népirtásban bűnszegédkező miniszterek és szakértőik ellen, a mérési bizonyítékokat átküldette a Pest Megyei Kormányhivatalhoz. Kérve, hogy azok alapján nyilvánítsanak bolonddá. Ez volt a hatodik ilyen irányú ügyészségi kísérlet, de ismét belebuktak. Az **1997-es** próbálkozásuk során a rendőreik **össze is vertek!**


Elsősorban Orbán Viktor miniszterelnök úr és a FIDESZ segítségét kérem az országos érdekű nemzetbiztonsági vizsgálat elrendeléséhez.

Vona Gábor pártelnök úrnak is felajánlom, hogy a Jobbik parlamenti frakciója csatlakozhat az országos érdekű nemzetbiztonsági vizsgálat kezdeményezéséhez.

Természetesen bármelyik más parlamenti párt is csatlakozhat az országos érdekű nemzetbiztonsági vizsgálat kezdeményezéséhez.

4./3 Kód: nemzetbiztonsagifeljelentes180219email2

Melléklet: Aszálystressz vizsgálat során csak a káliumműtrágyázott talajú cserepekből pusztultak ki nagy számban a növények. A növelt káliumdózis éppen így teszi tönkre az állatok és emberek sejtjei stressz tűrését, védekezőképességét is. Nem elhinni kell a biológiai hatásokat, hanem bemérni!



Verőce, 2018-02-19.

Jogos védelemként (**Btk.**), megbízás nélküli kárelhárítás keretében (**Ptk.**), bárhol való terjesztésre közzétette, igényt jelentve be az ügyviteli **munkadíjra**:

Tejfalussy András oknyomozó mérnök feltaláló, korábbi minisztériumi, országgyűlési, önkormányzati és tudományos akadémiai hatás-mérés tudományi szakértő (sz.szám: 1-420415-0215, an.: Bartha Edit), 2621 Verőce, Lugosi u. 71., (www.tejfalussy.com, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, +36 20 218 14 08)

67./36 Kód: Jezushozimadkozasszervezoknek180220mellekletei

4./4 Kód: nemzetbiztonsagifeljelentes180219email2

AZ ORSZÁGGYÜLÉS NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGÁHOZ IS FELJELENTÉS POLT PÉTER LEGFŐBB ÜGYÉSZ ÉS TÁRSAI ELLEN (Kód: nemzetbiztonsagifeljelentes180219)

 **András Tejfalussy** <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>

22:48 (1 perce) ☆



címzett: nbb; ferenc.kalmar; miniszterelnok; ME; miniszter; erkeztetok; Vona; vona.gabor; panasz; Elnok; titkos másolat: kovacs.eniko; titkos másolat: pal. 

Kód: nemzetbiztonsagifeljelentes180219



Mentes a vírusoktól. www.avg.com

3 melléklet



feladó: **András Tejfalussy** <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>

címzett: nbb@parlament.hu

ferenc.kalmar@mfa.gov.hu;

miniszterelnok@me.gov.hu;

"ME - Érkeztetők (noreply)" <erkeztetok.noreply@me.gov.hu>;

miniszter@hm.gov.hu;

másolatot kap: erkeztetok@me.gov.hu;

Vona Gábor <vona.gabor@jobbik.hu>;

"vona.gabor" <vona.gabor@parlament.hu>;

panasz <panasz@ajbh.hu>;

Elnok@kuria.birosag.hu

titkos másolat:

dátum: 2018. február 19. 22:48

tárgy: **AZ ORSZÁGGYÜLÉS NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGÁHOZ IS FELJELENTÉS POLT PÉTER**

LEGFŐBB ÜGYÉSZ ÉS TÁRSAI ELLEN (Kód: nemzetbiztonsagifeljelentes180219)

küldő: gmail.com

feladó: **Érkeztetők (ME)** <erkeztetok@me.gov.hu>

címzett: András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>

dátum: 2018. február 19. 22:49

tárgy: Válasz

küldő: me.gov.hu

biztonság: A(z) gov.hu nem titkosította az üzenetet [További információ](#)

Fontos a varázsgömbünk szerint.

Tisztelt Levélíró!

Elektronikus levele megérkezett a Miniszterelnökségre.

Üdvözléssel:

Miniszterelnökség

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

67./36 Kód: Jezushozimadkozasszervezoknek180220mellekletei

Azonosító: AllianceIsraeliteeFelhivas1910

A HÍDFŐ Baráti Köre (Fabó László, 22 Hancock Street, San Francisco, CA 94114, U.S.A.) „**Országhódítók**” c. kiadványából kimásolt országrablási terv:

Russischen Invaliden (1910 dec. 30, 285. szám). Ebben jelent meg az Alliance Israelitée felhívása, amelyet a magyar lapok is közöltek. A Weimaier Hist.-Gen. Taschenbuch, S. XII. fordítása szerint a következőket tartalmazta:

„Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem, amelyet könnyebben leigázhatnánk, mint Galíciát és Magyarországot. E két országnak mindenképpen a miénknek kell lennie, mert számunkra ott a legkedvezőbbek a körülmények. Ti, zsidó testvérek fáradozzatok minden erőtökkel azon, hogy mindkét országot teljesen birtokotokba vehessétek, fáradozzatok, hogy minden keresztényt elűzzetek és teljesen úrrá legyetek. Törekedjetek, hogy mindent, amit ott a keresztények birtokolnak, teljesen a kezetekbe vegyetek. Ha erre nem volna elegendő anyagi eszközötök, a párizsi szövetségünk minden erővel segíteni fog titeket. Erre a célra a szövetségünk már is gyűjtéseket rendez és az adományok váratlan bőséggel folynak be a pénztárunkba azzal a céllal, hogy a galíciai és magyarországi területeket a galíciaiak és magyarok kezéből kiragadjátok és hogy azok kizárólag zsidó kézre kerüljenek. Az egész világ tőkései erre a célra nagy összeget áldoznak s egyesülnek, hogy ezt a célt a legrövidebb idő alatt elérhessétek.”

POZSGAY AZ ANTISZEMITA

Izraelben járt tudósítónk jelenti az alábbiakat:

„Pozsgayval egyidőben jártam Izraelben és az ottani „arisztokraták” magyarul beszélnek. Így könnyű volt megtudnom, hogy Pozsgay megállapodott az izraeli kormánnyal abban, hogy az orosz–ukrán nemzeti öntudat rohamos növekedése és erősödése következtében veszélyeztetett oroszországi zsidók Magyarországon tudjanak végleges hazát találni és végleg letelepedni.”

Eleinte magam is hihetetlennek tartottam, de amikor elolvastam az újságokban megjelent tudósításokat az orosz „PAMJATY” nevű – nemzeti szocialista – mozgalomról és szervezetről, akkor észrevettem, hogy valami baj van az oroszországi és az ukrán zsidókkal.

Ugyanis ez a PAMJATY mozgalom nemcsak a régi orosz nemzetiszínű zászlót lobogtatja, hanem a cári, orosz tradíciók alapján – igen erős nemzeti öntudatot hirdet és az eddigi kommunista orosz népnek csaknem elvesztett identitását érezhetően nemzetivé formálja. Követeléseiben első helyre teszi a zsidó-

*Tejfalussy András
megjegyzése: a
cikk írója aljasul
uszítani próbálja
a magyar népet a
cigány nép ellen!*

ság felelősségre vonását, mondván, hogy a cárizmust, az 1917-es forradalommal, tulajdonképpen a külföldi zsidók döntötték meg, mert az ő pénzüikkel dolgoztak Oroszországban a külföldről beszivárgott zsidó, kommunista ügynökök. Tekintve, hogy az uralkodó kommunista párt vezetésében is igen sok zsidó található, akik – mint írják és hirdetik – „a kiűzörszített és lezüllesztett orosz nép verejtékéből meggazdagodtak” – ezek a vezető állású zsidók sem kívánatos elemek és – a zsidók szerint – „az orosz antiszemitizmus rohamosan növekedik és ez a jelenlegi moszkvai tüntetések indítéka is.”

A Pozsgay–izraeli megállapodás tehát ezeket és a többi, mint mondják – kb. egy millió zsidót – fog Magyarországra telepíteni. → A cigányesd után most éppen ez hiányzik otthon.

Azt szeretnénk kérdezni, hogy a választások után megalakuló „új” kormány el fogja-e ismerni ezt a megállapodást és Jehova ajándéka-ként megkapjuk-e az egymillió orosz zsidót...? A Rákositól–Kádárig terjedő „elavult” és a reformok emlegetésével nemzetiszínű zászlót lengető, de lényegében és eszközeiben változatlan rendszerű korszakok örökségeként MAGYARORSZÁGON MA MINDEN LEHET-SÉGES.

Szent Korona, 1990. V. 16.

Konkrét hatás mérési bizonyítékok az izraeli kutatók által a „nyugati férfiak” 2050-re jósolt teljes ivartalanodásának eltitkolt okáról, ami a mérgező kálium

EMAIL KÖNYV 101.

All Rights Reserved!

Változatlan formában szabadon terjeszthető!

Budapest, 2017. november 20.

**Összeállította: Tejfalussy András okl. vill. mérnök
(volt) minisztériumi, országgyűlési, önkormányzati
és tudományos akadémiai hatás-méréstani szakértő
jogos védelemként és megbízás nélküli kárelhárító
ügyvivőként Orbán Viktor miniszterelnök részére**

Magyarország, 2621 Verőce, Lugosi u. 71.

www.tejfalussy.com

+36 20 218 1408

(Azonosító: emailkonyv-101-ivartalanitanak2050re)

Izraeli kutatók szerint 2050-re teljesen nemzéképtelenné válhatnak a nyugati férfiak. Reklám
Izraeli tudósok kutatásai szerint a nyugati férfiak hímivarsejtjeinek száma pár évtized alatt a felére csökkent. Az utóbbi negyven évben a férfiak átlagos hímivarsejtjeinek koncentrációja, mely nagy mértékben hozzájárul a sikeres megtermékenyítéshez, közel felére csökkent a nyugati világban. A kutatásai eredmények háttérében álló okok kétséget kizárólag mindmáig tisztázatlanok. Egy azonban biztos: valami rendkívül drámai dolog megy végbe a férfiak reprodukciós képességeit illetően. A férfiak szaporodási képességeit nagy mértékben befolyásolják a külső faktorok, hangsúlyozta dr. Hagai Levine, a jeruzsálemi Héber Egyetem oktatókórházának epidemiológusa. A termékenységhez, a nemzőképességhez az új élet létrehozásához nyugodt, biztonságos környezetre van szükség, ami a szervezetünknek is jelez, hogy érdemes új életet hozni a világba – mondta a kutatóorvos. Megdöbbentő adatok Dr. Levine volt a vezetője annak a kutatócsoportnak, amely mind ez idáig a legátfogóbb munkát végezte a férfiak nemzőképessége kapcsán, még 2015-ben. A csapat résztvevői mintegy 7500 különböző tudományos kutatást vizsgáltak át, és ebből 185 eredményeit tudták felhasználni. Ezeket speciális kritériumok alapján elemezték. Az összesen mintegy 43 ezer fős minta alapján kijelenthető, hogy 1971 óta a milliliterenkénti hímivarsejtkoncentráció 52 százalékkal csökkent, míg ennek az ondó mennyiségével arányosított száma közel 60 százalékkal. Negyven évvel ezelőtt milliliterenként 99 millió hímivarsejtet regisztráltak átlagosan, ez a szám mára 47 millióra esett vissza. A kutatócsoport azóta folytatott vizsgálatait alapján egy folyamatosan romló trendről beszélhetünk. Ha ugyanebben az ütemben folytatódna a csökkenés 2050-re teljesen nemzéképtelenné válnának a nyugati férfiak. Ez a riasztó feltételezés azonban nem egy előrejelzés, és nincs tudományosan alátámasztva, emlékeztetett a kutató. Se Afrikában, se Ázsiában nem tapasztaltak hasonló visszaesést Dr. Levine kutatásai szerint se Afrikában, se Ázsiában nem tapasztaltak hasonló visszaesést, ám ez lehet a megfelelő számú mintavétel és az ezeket feldolgozó tudományos munka hiánya. Ugyanakkor rámutatott: egy kínai és egy japán tanulmány hasonló eredményeket regisztrált a közelmúltban. A kutatások során feltárt folyamatok az orvosokat is meglepték, akik kezdetben szkeptikusak voltak az eredményekkel kapcsolatban, de végül igazoltnak láttak az azok alapján megfogalmazott állításokat. Levine doktor egy ébresztő jelnek tartja a a feltártakat. Úgy véli, hogy az emberiségnek sürgősen válaszokat kell adnia erre a problémára. Elképzelhető, hogy a globális felmelegedésnek is köze lehet a spermaszám visszaeséshez, mivel a túlzott meleg bizonyítottan csökkenti a nemzőképességet. Az olyan civilizációs változások, mint az egyre több műanyag használata, a tartósítószerrel tartalmazó élelmiszerek fogyasztása, vagy akár a nadrágzsebben hordott mobiltelefonok szintén kihathatnak a megtermékenyítőképessegre. Emellett komoly problémát jelent még a növényvédő-szerekkel kezelt zöldségek és gyümölcsök fogyasztása is. Izraeli kutatók a boltokban forgalmazott tehéntejet is alapos vizsgálat alá vetették a reproduktív egészségre gyakorolt hatása okán, mivel azt sejtik, hogy ez is negatívan befolyásolhatja a spermiumok számát. A kutatás eredményeit azonban egyelőre még nem hozták nyilvánosságra. A tudósok szerint a reproduktív egészség megőrzése érdekében a férfiaknak csökkentenie kell a hőforrásokat a nemi szervük környékén, így a zsebben tárolt mobiltelefon, és az öلبen elhelyezett laptop használatát, valamint a szűk nadrág és alsónadrág viselését. Emellett a rendszeres sportolás is jó hatással van a hímivarsejtek képződésére. (Híradó - Haárec)
Forrás: <https://kuruc.info/r/4/179568/>

Cáfolatként, a HIHETŐMAGAZIN, www.tejfalussy.com honlapon közzétett hatás mérések alapján:

AZ IVARTALANODÁS TÉNYLEGES OKA A MÉRGEZŐ KÁLIUM MŰTRÁGYA ÉS AZ ÉTKEZÉSI SÓKÉNT „IZRAEL ÁLLAMI STAR KOSHER TANÚSÍTVÁNYAL” IS ÁRUSÍTOTT KÁLISÓ! A mérgező kálium tartalmú élelmiszerek izraeli kutatók által is észrevett ivartalanító hatását a mérgező kálium használatáért felelős izraeli tudósok mellékes és hamis okokra fogták rá!

Budapest, 2017. november 19.

*(nemes Sydo) Tejfalussy András András Béla Ferenc
oknyomozó mérnök, számos nemzetközi hatásmérés
tudományi szabadalom feltalálója*

IVARTALANÍTNAK A MÉRGEZŐ KÁLIMUMMAL!

Új Szó, 1988. IX. 16.

Túl sok a kálium

Új szempontok a műtrágyázásban

A termőterületek műtrágyázásával, illetve a terméseredmények szempontjából a káliumoptimális mértékével és ennek környezeti hatásaival nem egy szakosk értekezés, vagy halászszerelés foglalkozik a sajtó hasábjain. A műtrágyázás egyik különösen negatív hatásaként a zöldségfélékben és egyéb növényi termékekben feltehető nitrógen-származékokkal nevezik meg, s ezzel összefüggésben felhívják a figyelmet a nitrógentartalmú műtrágyák túlzott alkalmazására.

A Szlovák Tudományos Akadémia Kísérleti Növénykörtani és Rovartani Intézetében elért legújabb eredmények azonban egy másik „bűnösre” mutatnak rá, amely részt vállal a modern mezőgazdaságban mutatózó negatív jelenségek színle mindéggyéből. Ez a figyelemre és főleg ellenőrzésre méltó elem – Ján Kráľovičnak, az említett Intézet munkatársának véleménye szerint – a kálium, amelynek problémájával már évtizedek óta foglalkoznak.

Gond a tejfel

A probléma bevezetőjében el kell mondani, hogy a csehszlovák mezőgazdaság a műtrágya-felhasználása, a gyom és rovarirtószerek alkalmazása területén is túl van azon a határon, amit a termelés mennyisége és minősége szempontjából optimálisnak nevezhetünk. Általánosan elterjedt nézet – mivel a termékekben magas a nitrátok aránya – hogy a talaj nitrógenrel van túlterhelve. A nitrátok problémája természetesen komoly és aktuális, de a legújabb eredmények arra engednek következtetni, hogy ebben is a túladagolt kálium, illetve néhány helyen foszfor hatását kell látnunk.

Közlött, hogy viszonylag magas szilvával nálunk a növénytermesztés, de problémánk vannak az állattenyésztésben, ahol a világ tejlelt országaival való összehasonlítás nem éppen hízelgő a számunkra. Ez leginkább a tömegtakarmányok minőségével kapcsolatban ütközik ki. A tejtermeléshez például sokkal több erőtakarmányt használunk fel, mint más tejlelt szarvasmarha-tenyésztéssel rendelkező országok, mivel tömegtakarmánnyal nem tudjuk elérni a kívánt tehozamot. A szárazított tömegtakarmány ugyanis nálunk 25-30 gramm káliumot is tartalmaz kilogrammonként, noha az optimális mennyiség 10-15 gramm között lenne. De ugyanígy probléma a burgonya keményítőtartalma, illetve a cukorrépa cukortartalma, sőt még a gabona korai érése is, amely utóbbi loga-

lább feltételek veszélyeségeket okoz hektáronként. Minélz Kráľovič említi, hogy a kálium-tartalmaira vezethető vissza.

Hányzó mikroelemek

A kálium az az alapvető elem, amely a növényekben az ionok felvételéről dönt. Bizonyos koncentrációig harmonikusan felvesz mindenféle iont, de egy határon túl blokkolni kezd a kalcium és a magnézium felvételét. Ezek az ember és az állat ásványi


lápálékának alapelvei. Hányuk csontlággyulás, csonttrikulák, ízületi gyulladásokat okozhat, és manapság ezek a betegségek, az erre való hajlam már fiatal korban is sok esetben megfigyelhető. A kalciumot és a magnéziumot a növényi láplálékok, például a zöldség juttatják a szervezetbe, vagy a tej, de ha ezekből hiányzik, akkor természetesen más úton kellene és súlyosabb esetben kell pótolni. De ez csak két elem. A talaj magasabb káliumszintje más mikroelemek felvételét is akadályozza, például a légzés szempontjából fontos CO_2 , vagy a már említett nitrátok lebontásához szükséges molibdén, mangán és cink felvételét. Ha ezek a mikroelemek ott vannak a szervezetben, akkor a nitrátokat ammóniákra bontják, és az átválik a szervezetből. Ha hiányoznak, akkor ez a szintézis nem megy végbe, csak gátlék vagy egyéb nitrógen-származékok, például nitrózaminok keletkeznek, s mivel ezek karcinogén anyagok, betegségeket idéznek elő. A talajban lévő kálium a cink felvételnek blokkolásával a gazdasági állatok reprodukcióját is veszélyezteti. = MEGDOVE TESZ ÖNET IS

Deformálja a sejteket

Mivel a kálium nem engedi meg, hogy a növény elegendő kalciumhoz és magnéziumhoz jusson, ezzel blokkolást a sejteket, és enni nem növekszik a növények érzékenysége. A sejteket könnyen megáramodják a mikroorganizmusok, egyéb kórokozók, s mivel a talaj sejtszerkezeti elősegíti a szabad ammóniák felvételét – amelyek a mikroorganizmusoktól láplálják – így azok elszaporodnak, a növényeken betegségek jelennek meg.

Kedvező körülmények alakulnak ki a káliumot korlátozó gyomok számára is, s ezek már nagymértékben elszaporodtak. Ha körülnézünk a földeken, ahol egyébként egyre több gyomirtót használunk, bizonyos fajta gyomok eltűnnek, mások viszont állandóan terjednek. Ekkor ugyan a körköt, amelynek nem kedvez a kálium, de van helyette libatop és partagi tüske minden mennyiségben. Ezek ellen újra herbicideket használunk, ami gátolja a fotoszintézist, tehát megint csak elősegíti

a kálium felvételét. Ez újra lazábbá teszi a sejtek kötését, s csökkenti a kórokozók által okozott ellenállósságot, amelyet természetesen rovarirtóval kezelünk. Ez újra megindítja a problémák láncolatát, és a kör bezárult. S mindezekben a folyamatokban, amelyek bonyolultabbá teszik és drágítják a termelést, romlik a termékek minősége, alapvető okként ott találjuk a káliumot.



A burgonya keményítőtartalmának és a cukorrépa cukortartalmának alakulása a talaj káliumtartalmának függvényében

De nemcsak a növények ellenállóképességét, illetve a mezőgazdasági termékek tápanyagtartalmát befolyásolja, hanem közvetlen károsítással van a gazdasági haszonra is. A burgonyában valamikor a hatvanas évekig még 20-21 százalékos volt a keményítőtartalom, amely mára 13-14 százalékra csökkent, s ugyanez a helyzet a cukorrépánál is, ahol a hatvanas évekig 18-20 százalékos cukortartalom mérhető, s mára az átlag 14,6 százalék. Ehhez tudunk kell, hogy az ötvenes években a talaj káliumtartalma kilogrammonként még körülbelül 90 milligrammnyi szinten volt, s mára már 250 körül értékel is mérhető.

Csökkenteni kell

Ahhoz tehát, hogy a fentebb felsorolt problémákat kiküszöböljük – az SZTA Növényórta és Rovartani Intézetének eredményei szerint – a legfontosabb feladat a talaj káliumtartalmának csökkentése. Ez nemcsak jobb terméseredményeket hozhat, hanem ami lényeges, javítja annak minőségét, és csökkentheti az egyéb műtrágyák, a növényvédő és rovarirtó szerek felhasználását is. Évek óta végzik a kálium és a nitrogén arányának a terméseredményekre való hatásait vizsgáló kísérleteket. Bebizonyosodott, hogy a legnagyobb terméseredményeket akkor érik el, ha a talaj káliumtartalma 90 mg mennyiségű káliumot tartalmaz, és hogy a terméseredmények 200 milligrammnál, különböző években 16-24 százalékkal is csökkenhetnek. Ez a 200 mg a jelenlegi átlagos szint.

A talaj káliumtartalmának csökkentése megoldaná a nitrátproblémát is. Bebizonyosodott ugyanis a kísérletek során, hogy a nagyobb mennyiségű termés elérése érdekében magas káliumtartalom mellett háromszor-négyszer nagyobb mennyiségű nitrogént kell felvennie a növénynek. Ezen kívül a talaj káliumtartalmának csökkentése még egy más probléma megoldásában is segítsen és egyszerűbbé lenné – természetesen olcsóbb is – a mezőgazdasági termelés. Ehhez a tudományos dolgozók véleménye szerint szükséges, hogy mindenütt pontosan megállapítsák a talaj összetételét és kidolgozzák a műtrágyák szükséges adagolásának arányát. Ezeknek a méréseknek az elvégzésére az agrárkémiai vállalatok minden nagyobb befektetés nélkül képesek, tehát elsősorban a mezőgazdaság dolgozóin múlik, hogyan közelednek a felvetett problémákhoz.

(Szénási)

Tejfalussy András emlékeztető a 1923-as mezőgazdasági kiállításról. A kiállításról a Péter Béni emlékeztető is írt.

Megjegyzés: A 90 mg/kg a talajnak a vízben oldódó káliumtartalma. Ez nem a „talajnak a káliumtartalma”. A hazai talajok összes káliumtartalma sokkal, nagyságrenddel több mint a 90 mg/kg! Általában 1 és 6% között van! Ebből automatikusan (ingyen is) pótlódik a növények által felvett vízdoldott kálium! Vagyis automatikusan helyreáll az optimális 90mg/kg vízdoldható kálium tartalom! Felesleges és káros a talajok vízdoldható kálium tartalmát káliumműtrágyákkal növelés! Bp. 2017. 11. 13. Tejfalussy András

A mérgező kálium Nobel díjasok által (1950 előtt!) bemért fajirtó hatásai:

NOBEL-DÍJAS KUTATÓK MÉRÉSEI IS BIZONYÍTJÁK, HOGY SZÁMOS BETEGSÉG NAGYSÁGRENDI MEGSZAPORODÁSÁNAK A HAGYOMÁNYOS („FIZIOLÓGIÁS”) SÓZÁSSAL ELLENTÉTES ELVEKRE ALAPOZÓ „ÉTKEZÉSI SÓREFORM” A FŐ OKA

A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában, „A biológia aktuális problémái” főcím alatt található „A mellékvesekéreg biológiája” c. fejezet. Aki írta, az akadémiai nívódíjas Dr. Szabó Dezső azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek alapján Kendall, Reichstein és Hench 1950-ben Nobel-díjban részesültek „a mellékvesekéreg-hormonok és szerkezetük és biológiai hatásuk” felfedezéséért. Az összefoglalás jellegű leírás emellett további 61 tudományos publikáció mérési eredményeire is hivatkozik. (Az alábbiakban zárójelben jelzem, hogy a könyvből itt idézett megállapítások a könyv mely oldalain találhatók.)

EZEK A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK EGYBEHANGZÓAN BIZONYÍTJÁK AZT, HOGY A NÁTRIUMHIÁNYOS ÉS **KÁLIUMDÚS DIÉTÁN** TARTOTT EMBEREK ÉS PATKÁNYOK MELLÉKVESEKÉRGÉ HORMONTERMELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A TUDOMÁNYOS KUTATÓK VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEKKEL RENDELKEZNEK (134), AMELYEK SZERINT A NÁTRIUMHIÁNYOS VAGY KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT ÁLLATOKON (PATKÁNYOKON) ÉS EMBEREKEN IS MELLÉKVESEKÉRGÉ-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK BE, MIKÖZBEN A SZERVEZET ELETROLIT-HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)

Ezek későbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrövidítő, ivartalanító stb. hatások például konkrétan a következők:

1./ A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik (140)

2./ A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás alakul ki. (167)

3./ A különböző stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)

4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsősorban a vesesejtekénél, de a verejtékszejtekénél és az emésztőrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez ha hosszabb ideig tart, törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet:

5./ Idővel nátrium-hiány jön létre (168)

6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)

7./ Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168)

8./ Romlik a keringés. (168)

9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szűrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)

10./ Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168)

11./ A bőr és a nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)

12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)

13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)

14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)

Hiányos nátrium-pótlásnál és/vagy kálium-túladagolásánál kialakulnak fő tünetként:

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)

20./ A vérbesűrűsödés miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést, renintermelő vesedaganatok jönnek létre. (169)

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait is okozza („pszeudohermafroditizmus”):

21./ Leánymagzatok nemi szerveinek a fejlődési zavarait, pl. szeméremajkak összenövését, klitoris-megnagyobbodást. (169-170)

22./ Lánygyermeknél klitoris-megnagyobbodást, idő előtti menstruációt. (170)

23./ Felnőtt nőknél: klitoris-megnagyobbodás, test- és arcszőrösödés, kopaszodás, érdes hang, a menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)

24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erőteljes izomzat kifejlődést, a testnövekedés gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszőrzet idő előtti megjelenését, korai szakáll-növekedést, hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)

25./ Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermeknél és férfiaknál emlő-megnagyobbodást okoz. (170)

26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztaták) növekedését serkenti. (170)

Közismert, hogy egyesek ezeket a betegségeket mindenféle más okra vezetik vissza, miközben ezt a két legfőbb okot részint elhallgatják, részint ellenkező hatásúnak tüntetik fel. Az élettani optimum szerinti (fiziológiás mértékű) sópótlást, a vérszérum elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelő étkezést „elavultnak” hazudják, pedig a fiziológiás sópótlás helyességét nem csak a tengervíz, a magzatvíz és a vér és a fiziológiás infúziós Ringer oldat azonos nátrium és kálium aránya igazolja, de az is, hogy kálium túlfogyasztás esetén torzul az EKG = romlik a szív működés!

A fenti idézett publikáció teljes szövege is megtalálható a HIHETŐMAGAZIN, www.aquanet.fw.hu honlapon!

A növekvő füvekben (pl. búzafű stb.) mérgezően sok a kálium. Megbetegíti a teheneket és lovakat, az alábbi amerikai állatorvosi könyv tanúsága szerint:

Handbook of Veterinary Drugs

*A Compendium for
Research and Clinical Use*

Irving S. Rossoff

1977

with a Foreword by
H. Hugh Dukes, D.V.M.



Springer Publishing Company
New York

As soil temperatures rise and spring grasses grow lush, their potassium content may increase. An increase in the ratio of K:Ca and Mg can promote tetany in cattle. This may be the cause of so-called wheat poisoning in cattle. Additional dietary potassium may reduce the incidence of calculi and improve feed conversion of cattle in cotton and milo areas. Fatigue and anorexia in horses on nearly exclusive oat diets may be due to decreased serum levels of potassium.

Különösen mérgező a nagy mennyiségű, ötszörös káliumtartalmú tönkölybúzafűlé:

A MÁJMÉRGEZŐBB BÚZAFŰ, MINT NÖVÉNYNEMESÍTÉSI EREDMÉNY?

A közönséges búzafű és búzafűlé nagy káliumtartalma is májmérgező, ámde a Tönkölybúzafű és az abból készített búzafűlé ötszörösen nagyobb káliumtartalma még sokkal mérgezőbb.

Zöld búzafű, lő és rost vizsgálati adatok

Tulajdonság	Mértékegység	Közönséges búza			ÓKO 10 tönköly		
		búzafű	lő	rost	búzafű	lő	rost
Szárazanyag	%	88,35	5,35	93,47	93,28	10,24	92,32
Nyers fehérje	%	32,60	30,00	26,10	38,80	55,30	24,30
P	%	0,73	0,094	0,50	0,76	0,142	0,39
K *	%	0,91	0,144	0,57	5,00	0,814	2,05
Ca	%	0,27	0,039	0,29	0,34	0,067	0,22
Mg	%	0,24	0,036	0,18	0,36	0,046	0,18
Mn	ppm	25,40	3,50	23,40	41,00	5,00	28,00
Zn	ppm	28,00	5,20	30,00	32,00	5,00	32,00
Cu	ppm	13,60	2,20	21,60	17,00	8,70	14,60
Fe	ppm	149,00	10,00	89,00	75,00	36,50	149,00
Na **	ppm	250,00	31,00	116,00	1460,00	280,00	660,00

a búzafű jelzés alatt a zöld növényből szárított anyag értendő

* A közönséges búzafű is mérgezi a lovakat és teheneket, a túl nagy káliumtartalmával. Kálisóval műtrágyázva még több a kálium. De a Tönkölybúza fűben ennél is 5x több a kálium, s a belőle készített fűlében is!

** A búzafűben veszélyesen, kb 30x kevesebb a nátrium, mint a kálium!

Verőce, 2009. 05. 19.

Tejfalussy András dipl. mérnök,
méréstani szakértő

TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT

Kód: BuzafuvelMajmergezok090519

E M L É K E Z T É T

Code: MTA-empl.sum

A "nátriumhiányos vagy káliumdús táplálás", a "sócserek" kárainak az elhárítása és tudatosítása szükségességéről a Magyar Tudományos Akadémia Elnöki Titkárságán 2001. december 5-én megbeszélésekről.

Jelen vannak:

- Dr. Pannonhalmi Kálmán, az MTA Elnöki Titkárság vezetője, élettan tanár;
- Tejfalussy András okl. mérnök, az AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja PJT elnöke;
- Varjas András okl. fizikus, a GRADIENS INNOVÁCIÓS LABOR Tudományos Szolgáltató PJT igazgatója.

Jelenlévők dr. Szabó Dezsőnek "A mellékvesekéreg biológiája". c., 81 korábbi tudományos értekezést alapként hivatkozó, összefoglaló tanulmányában is (TECHNIKA A BIOLÓGIÁBAN 8. kötet. Szerkesztette: Dr. Csaba György; Medicina Könyvkiadó, Budapest) további adatokat találtak, hogy a kálium túladagolása erősen káros az egészségre.

A Dr. Szabó Dezső által közölt mérési eredmények szerint ugyanis: mind a patkányok, mind az emberek mellékveséje tönkrement, amikor ételleik rendszeresen nátriumhiányosak vagy káliumdúsak voltak. E tanulmány hangsúlyozza azt, hogy a nátriumhiányos vagy káliumdús étrendtől "A különböző stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik".

Az általa leírt egészségkárosodás menete és tünetei a következők:

"... A mellékvese károsodása a kiváltó okra való tekintet nélkül elsődleges mellékvese-elégtelenséghez vezet...

.... A csökkent glukokortikoid-termelés következtében kialakul a glukózképzés zavara, mely elégtelen zsír- és cukorfelhasználással párosul. idővel nátriumdeficit jön létre. A kialakuló elektrolitzavar a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet. Az extracelluláris (sejten kívül lévő) térből víz vándorol a sejtekbe. Dehidráció (kiszáradás, víztelenedés) következtében csökken a keringő vérmennyiség, a vér viszkozitása (a vér, mint folyadék belső aurlódása, sűrűsége) növekszik. A keringés romlik, majd a vese véráramlásának zavara a glomerulusfiltráció (a vese kéreg-állományán átszűrődés) csökkenéséhez, végül a veseműködés elégtelenségéhez vezet. A mellékvese-károsodás miatt elégtelen kortikoszteroid-termelés következtében részben az ismertett mechanizmusok alapján alakulnak ki az Addison-kóros betegek tünetei. A felsoroltakhoz még a bőr és a nyálkahártyák fokozott pigmentációja (festőanyag képződése) járul.

... Primer aldosterizmusban (Conn-szindróma) esetén elsődleges a fokozott aldosteron-szekréció (az aldosteron hormont termelő mirigy aldosteron termelése), melynek hátterében leggyakoribb a magánosan vagy többszörösen előforduló mellékvese adenóma (mirigyhámból kiinduló "jóindulatú" daganat)...

... A klinikai képet magas vérnyomás, szív- és veseelváltozások, izomgyengeség jellemzi. Nátrium visszatartás, fokozott kálium-ürítés ... a leggyakoribb laboratóriumi leletek.

.... Az extracelluláris folyadékmennyiség csökkenése, a plazma-térfogat csökkenése, a vénás pangás ugyancsak a vese vérrellátásának csökkenéséhez, ezen keresztül fokozott renintermeléshez, majd

Code: Em.MTAsum1a . / .

fokozott aldosteron-szekrécióhoz (aldosteron túltermelődéshez) vezethet. Renin: a vérellátásban károsodott vese kering-állományában képződő proteolitikus /rothadással járó/ enzim!

- II/. Jelenlétük szerint a fentiek megfelelnek az általuk korábban megvizsgált klinikai és növényélettani tolerancia mérések adatainak:
- 1/. Az "EMLÉKEZTETŐ a káliumleadással kapcsolatos (államigazgatási mérési adatok MTA-nál való közös megtekintésén alapuló) tanácskozásról" tárgyú (E-285/1998 MTA.Kln.Titk. sz.) dokumentum, a káliumtúladozás hatását ellenőrző klinikai mérések szerint, a kálium vizes oldatának bevitelénél, 0,8 gramm káliumleadás felére korlátozza a veseműködést. A kálium tablettával bevitele esetében pedig az ennél sokkal kevesebb is nagy gyakorisággal gyomorfájást és gyomornyálkahártya-károsodást idézett elő a klinikai ellenőrző mérések alkalmával.
 - 2./ A Magyar Tudományos Akadémián 1999. április 30. felvett EML7.MTA EMLÉKEZTETŐ tárgya: Az Antirandom-módszerrel végzett műtrágyázási káliumhatásvizsgálati egyetemi műtrágyakísérlet jelentésének (MTA 458/82/4.1.) eredeti mérési adatok alapján, mérési szempontból felülvizsgálata volt. Ezen mérés eredeti módszertani és technikai vezetője, jogosult kiértékelője, Tejfalussy András javaslatára. A tolerancia-mérési adatok ellenőrzése alapján az MTA szakértői azt állapították meg, hogy a kálissal "táplálással" káliumdúsá tett növények saját maguk is képtelenné lettek a táplálékkal és/vagy a környezetük megváltozásával előidézett stresszhatások kivédésére.

- III/. Az emlékeztetővel az aláírók felhívják az illetékesek figyelmét a következőkre: a./ a bebizonyosodott mérgező hatásai miatt, "mérgező kategóriába" célszerű sorolni minden talajkezelési vagy étkezési célú kálium vegyületet. b./ Be kell tartatni az MSZ-01-10007-82. magyar szabványt, ami minden étkezési célú sóban tiltja a kálisót. c./ Különleges ételízesítőként, "gyógytápszerként" sem engedhető a "sócsere" (az, hogy az étkezési konyhasót részben vagy egészben kálissal helyettesítik). d./ Célszerű jelen emlékeztetőik alapján a tananyagokat és szakmai kiadványokat is megfelelően korrigálni. e./ A nagyszámú egybehangzó mérési-eredmény bizonyítja, hogy téves volt egyes tudományos körökben az a vélelem, hogy ellenkező hatás érhető el a nátriumhiányos vagy káliumdús táplálékkal; felül kell vizsgálni kalibráltság, ill. megbízhatóság szempontjából mindazon méréseket, amelyek a téves vélelmet megalapozták. Valószínűleg az ún. (mezőgazdaságban elterjedt) "random mérési elrendezések" zavaró hatása okozta a műtrágyázási mérések hibás értékelését (a tévedés lehetősége a random kezelési elrendezésű parcellák egymásra való zavaró áthatása miatt gyakori). Emiatt az emlékeztető aláírói azt szorgalmazták, mint korábban is, hogy a kutatóintézetek térjenek át a nemzetközi szabadalmat elnyert biztosabb antirandom mérésekre, és annak tolerancia-optimum-kiszámítási programjai alkalmazására.

IV. Miután a kálisó hatásai ellenőrzésénél az AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG a Környezetvédelmi Minisztérium jogelődje I-1077/90.KTM. sz. megbízása és a korábbi Országgyűlés Szociális és Egészségügyi Bizottság felkérése alapján folytatta jelen kárelhárítási munkát, a Ptk. 484-487. alapján jelen emlékeztetőt megküldi a szervezetek részére tájékoztatásul, s fent javasolt intézkedések szorgalmazása végett. Emellett az internetes AGROANET.FW.HU honlapon közzéteszi.



Vargha András

Dr. Pannonhalmi Kálmán

Code: emimtasum1b

8/8



MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
ELNÖKI TITKÁRSÁG

1051 BUDAPEST, ROOSEVELT TÉR 9.
TELEFON: 332-7176 FAX: 332-8043

Budapest, 1998. május 14.

E-285/98

Balázs

Dr. Baraczka Pál Főigazgató úrnak
Igazságügyi Orvosszakértői Intézet
Budapest
Gyorskocsi u. 25.
1027

Tisztelt Főigazgató Úr!

Tejfalussy András úr kezdeményezésére 1998. április 1-jén megbeszélést hívtam össze a káliumleadási határértékekre rendelkezésre álló hivatalos mérési adatok és az ezen alapuló kálisó tabletták alkalmazásával járó kockázatok megvitatására. Az eszmecserén — véleményem szerint — fontos megfigyelésekre derült fény.

Mellékelten küldöm a megbeszélésről készült emlékeztetőt, szíves figyelmébe ajánlva az abban foglaltakat.

Tisztelettel:


Pannonhalmi Kálmán

Code: Eml.MTA1c

EMLEKEZTETÉS a káliumleadással kapcsolatos (államigazgatási mérési adatok MTA-nál való közös megtekintésén alapuló) tanácskozásról .

Résztvevők:

- Dr. Karádi István methabil, egyetemi docens, a Kútvölgyi Klinikai Tömb igazgatója, SOTE III. sz. Belklinika;
- Dr. Nagy Elemér akadémikus, fizika professzor;
- Dr. Pannonhalmi Kálmán, az MTA Elnöki Titkárság vezetője;
- Tejfalussy András okl. mérnök, az AGROANALIZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja GMK elnöke;
- Varjas András okl. fizikus, a GRADIENS INNOVÁCIÓS LABOR Tudományos Szolgáltató GMK igazgatója.

1. Az államigazgatás által elvégzettetett , ad.4111/84. DÉTI számú mérések adatai a következő egyszerű kálium-hatásokat mutatják :

A szájon át bevitt 0,88 gramm oldott káli^{um} egészséges felnőtt ember esetén a bevitel utáni 1-4 órában, jól láthatóan a felére csökkentette a vesék vízelet-kiválasztását. Emiatt az ivott 500 milliliter víznek (a kálió ebben volt feloldva) kb. a fele , a klinikai kísérletnél az emberek szervezetében maradt. A szájon át ugyanennyi vízzel bevitt 1,76 gramm oldott kálium még fokozottabb mértékben korlátozta a veseműködést. Láthatóan, emiatt nőtt meg kb. 3/4 óra múltán és kb. 1 teljes órán át tartóan a vérérum-kálium-koncentráció az 5 mmol/liter (hyperkalaemiát okozó) szint fölé . A mérési adatok ezt mind a 10 felnőtt egészséges emberből igazolták. A mérési ismétlések közötti egyéni eltérések (jól láthatóan) sokkal kisebbek a mért kálium-hatásoknál.

2. Az államigazgatás által elvégzettetett (a Pécsi Orvostudományi Egyetem Belgyógyászati Klinikán 1983. nov. 1-én aláírt hivatalos jelentés összefoglaló értékelése szerinti) mérés adatai a következőt mutatják:

A szájon át bevitt tablettázott kálió (a gyomor-bélrendszerben kb. 8 óra alatt oldódó, káliumchlorátum hatóanyagú) tablettái kb. 0,32 gramm káliumot tartalmaztak. A 8 vagy több db. tablettától 6-ból 5 embernek fájt a gyomra és egyikük gyomrának nyálkahártyáján "akut gyomornyálkahártya erózió" keletkezett . Krónikus kezelés során 40 beteg közül 3 jelzett gyomorfájást . Valószínűsítették , hogy a gyomorfájdalom fellepte összefüggésben van az egyszerre alkalmazott dózis nagyságával . A radiológiai vizsgálatok során megállapították , hogy a tabletták útját általában 12 órán át tudták követni a gyomor-bél rendszerben és ezalatt 4 esetben néhány óráig "kitapadtak" a tabletták a gyomor-bélrendszerben.

A kétféle mérés adatainak összevetéséből, mérlegelés nélkül is, megállapíthatók a következők:

a./ oldatban , szájon át egy adagban bevitt 0,88-1,76 gramm káliumnál vagy többnél , veseműködés korlátozással és emiatti hyperkalaemizálódással kell számolni .

b./ Ha a lassabban oldódó anyag (KALIUM-R tabletta) vitte be szájon át a káliumot , a tabletta felületén jelentkező koncent-

Code: Eml.MTA1a

rált káliumleadás gyomorfájdalmat okoz . Ez 0,04-0,08 gramm/óra káliumleadásnál kb. 12%-os gyakorisággal és 0,32 gramm feletti káliumleadásnál mindegy 83%-os gyakorisággal következett be és 28 %-os gyakorisággal mutatkozott a felületi káliumleadás túlzott mértékére visszavezethető akut gyomornyálkahártya erózió. (A tabletta méretéből kiszámítható felületeten történt a káliumleadás és ez okozhat "helyi hyperkalaezmizálódást" .)

Közös javaslat: A szájon át különböző formában bevitt kálium mennyiségeknek a bevétel közeg , felszívódási felület, felszívódási gyorsaság egyaránt meghatározó , tehát ezeket mindig definiálni kell . Erre célszerű az Igazságügyi Orvosszakértői Intézet kijelölése. Főigazgató: dr. Baraczka ^{Béla} _{Béla}, Címe: 1027 Gyorkoci u. 25.

Budapest, 1998. IV. 1.



Code: Eml.MTA1a

Balékeztető

A kálium leadó ételek és italok után a fogyasztókba bekerülő mérgező kálium-koncentráció határértékezésének ellenőrzéséről, a Magyar Tudományos Akadémia Elnöki Titkárságáról, E-285/1998. ikt.szám alatt, az Igazságügyi Orvosszakértői Intézet vezetője részére megküldött mérési megállapítások alapján tartott vélemény-cseréről.

1. A megbeszélésre előre egyeztetett időpontban, 1998. szeptember 7-én, 11 órakor került sor, az Igazságügyi Orvosszakértői Intézetben, annak vezetője, dr. Baraczka Balázs igazgató, és az E-285/1998. ikt.számú íráshoz tartozó tanácskozási balékeztetőt /Eml.Mta, 1998.IV.1./ aláíró egyik szakértő, Tejfalussy András, az AGROANALIZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja gk elnöke között.
2. Résztevők egyetértenek abban, hogy az MTA-tól megküldött E-285/1998. ikt.számú írat mellékletében leírt mérések alapján szükséges a javasolt kálium-leadó ellenőrzés, mivel a jelenleg optimálisnak vélt napi 2-8 gramm /átlagosan: 3,5 gramm/ káliumleadás mellett nincs meg a mérgezési veszély kontrollálásának a lehetősége.
3. Résztevők abban is meg állapodnak, hogy a kálium-leadó határértékezéséhez előzetes figyelembe venni az Országos Mérésügyi Hivatal főosztályvezetői szintű, a határértékezés alapkövetelményeit rögzítő állásfoglalását, a 4783/94. Országos Mérésügyi Hivatali ikt.számú, 1994. október 4-i íratban, és ahhoz tartozó, abban hivatkozott, az 1994. szeptember 29-én, az Országos Mérésügyi Hivatalnál tartott megbeszélést rögzítő, OMHkál4.csal jelű Balékeztetőben leírtakat.
4. Tejfalussy András átadja, dr. Baraczka Balázs átveszi a 3. pontban hivatkozott 4784/94. ikt.számú íratot, valamint az OMHkál4.csal jelű Balékeztetőt.
5. Tejfalussy András tájékoztatást ad arról, hogy szeretne pénzügyi háttérrel teremteni, de ehhez tudnia kell, hogy ki kérheti fel az Igazságügyi Orvosszakértői Intézetet. Dr. Baraczka Balázs tájékoztatja, hogy "Bárki" i.ú. orvosszakértői véleményt kérhet az adott ügyben /lásd fent/, mint "megénfél".
6. Tejfalussy András vállalja, hogy jelen írat alapján tájékoztatja a Magyar Tudományos Akadémia Elnöki Titkárságának vezetőjét, dr. Pannenhalmi Kálmán urat ezen megoldási lehetőségről.

.....
Tejfalussy András/



.....
/dr. Baraczka Balázs /

Code: Eml.MTA1d

EMLÉKEZTETŐ

a BME Műszer- és Méréstechnika Tanszéken 1994. november 21.-én tartott méréstani egyeztető megbeszélésről.

Tárgya: az Egészségügyi Tudományos Tanács Igazságügyi Bizottsága 1994. március 2.-ai, I-908/1993 hivatkozási szám alatti 10-175/ETT/IB/1993. iktatási számú szakvéleményének kiértékelése méréstani szempontból.

Jelen vannak: Tejfalussy András, az AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja gmk elnöke
dr. Péceli Gábor egyetemi tanár, a BME Műszer- és Méréstechnika Tanszék vezetője

I.

Előzmények: Jelenlévők a Mérésügyi Törvény módosítására vonatkozó javaslatok kidolgozása során példaként hozták fel a kálium-használati ellenőrzési határértékek ellentmondásait, és ennek alapján a Parlament több ponton módosításokat szavazott meg.

A szakvéleményt, valamint annak hivatkozásait áttekintve megállapíthatók a következő szakértői önellentmondások:

1. Az ún. REDI só, amely kálium klorid (55%), és kálium citrát (43%) kompozíció, a szakvélemény szerint grammonként 1,443 gramm káliumot tartalmaz. Ez lehetetlen, mert a só tömege nem lehet kevesebb, mint egyik komponenséé.
2. A szakvélemény a kálium közismert magasvérnyomás csökkentő hatására hivatkozik. Elemelve a Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézetben elvégzett mérésekről szóló, az OÉTI-nek készült jelentést, amelyre a Dr. Kovács Pál és Pap János interpellációjára a Parlamentben elhangzott 8253. számú miniszteri válasz is hivatkozott, a következőket állapítjuk meg:
A kísérletet végző orvosok megállapítása szerint a kálium etetésnek semmiféle mérhető vérnyomáscsökkentő hatása nem volt, de nem is volt várható. A jelentés 12. ábráján bemutatott, REDI só etetés előtti, ill. utáni vérnyomás értékek különbsége (a vérnyomás csökkenése) a hagyományos vérnyomáscsökkentő gyógyszerek egyidejű alkalmazására vezethető vissza.
3. Az, hogy csak az egyszerre bevitt 18 gramm káliumnak lehet mérgező hatása ellentmond a szakvéleményben idézett Magyar-Petrányi belgyógyászati tankönyv azon állításának, hogy nem csak a 18 gramm egyszerre bevitt kálium (40,6 gramm REDI só) okozhat hyperkalémiát, hanem 24 óra alatt, a szájon át beadagolt, (napi) 5-8 gramm szedése is. A T-hullám magasodik egészséges emberen is, különösképpen azonban myxoedemában és familiaris periódusos paralysis esetében. A hyperkalémia fokozódására az R-lengés

alacsonyodik, a QRS kiszélesedik és a pitvarok megállnak, ill. idegrendszeri tünetek is támadnak. Vagyis ha gyors, pl. egy óra alatt történt kálium felszívódást értünk "egyszerre, hirtelen bevitt káliumon", ilyen esetben már a szív pitvarai megállhatnak (halál).


4. A 10-175/ETT/IB/1993. szakvélemény elfogadja, hogy 0,88 gramm/óra az egészségügyi határértéknek tekintendő kálium-dózis, és egyben megjegyzi, hogy a Varga P. és tsi szakirodalom megadott 0,8 gramm/óra (20 mval) toxikus kálium határérték az intravénás káliumbevitelre vonatkozik. Mindezeket összevetve azzal, hogy a kálium-felszívódási ráta 0,9, a korrigált határérték 0,88 gramm/óra.
5. A Varga P. és munkatársai által közölt mérések szerint a napi dózis, mely már veszélyes hyperkalémiát okozhat, intravénás infúzió esetén 11 gramm (280 mval). Ennek szájon át bevitelre korrigált értéke nagyobb, de még ez sem 18 gramm, hanem csupán 12,22 gramm/24 óra. Ebből az a következtetés vonható le, hogy egymás utáni káliumbevitelnél nem 0,88 gramm/óra a toxikus kálium dózis határértéke, hanem 0,51 gramm/óra.
6. Mivel a kálium toxikus dózis az összes kálium bevitellel, és nem egyenként, az egyes komponensekkel bevitt káliummal kapcsolatos, az élelmiszerek káliumtartalmát összegezve kell a bevitelt (együtt ehető és iható) élelmiszerek mennyiségét a kálium szempontjából korlátozni.

A fenti határértékek egészséges, felnőtt (70 kg-os) személyekre vonatkoznak, ezért fel kell hívni a lakosság figyelmét arra, hogy kisebb súlyú személyek (és betegek!) esetében kevesebb kálium is toxikus lehet!

II.

A jelen emlékeztetőt a megfelelő kálium-korlátozó egészségügyi, és tisztiorvosi intézkedések megtételéhez Tejfalussy András megküldi az időközben népjóléti miniszterré választott Dr.Kovács Pál úr szakértőjének, Dr.Szentgyörgyi Istvának az előzményiratokkal, ill. a hivatkozott dokumentumokkal, az Országos Mérésügyi Hivatallal felvett emlékeztetővel, és annak kiegészítésével.

k.m.f.



(Dr.Péceli Gábor)
egyetemi tanár



(Tejfalussy András)
elnök

renális veszteségek. A se-K értéke ugyan nem mindig mutatója a sejt K-tartalmának, súlyos mérvű hypokalaemiák esetében azonban ennek csökkenését is biztosra vehetjük.

A K-vesztéshez vezető leggyakoribb körülmények az akut és krónikus vesebetegség, valamint a diabetes mellitus polyuriás szakja, a fokozott gastrointestinalis nedv veszteség, szaluretikumok, corticosteroidok, hashajtók K-védelem nélküli adagolása.

Önálló kórkép a familiaris paroxysmalis periodikus bénulás, melynek feltételezett kiváltója valamilyen enzim-zavar. Következmenye, hogy az EC és IC tér közötti K-megoszlás a sejtek javára tolódik el. Ez a kórkép a K-eloszlás azon ritka zavara, ahol a plasma-érték extrém mértékben alacsony, a sejt K-tartalma viszont megnövekszik, éppúgy, mint insulinnal kezelt diabeteses ketosisban. Hasonlóan enzim-zavarra vezethető vissza a káliumvesztő vese körülménye, ez esetben a tubulusok K-visszaszívó képessége csökken.

K-hiányt okoz a savi jellegű anyagok felszaporodása is, mivel a savi anionok egy része K-hoz kötötten ürül ki. Átmeneti hypokalaemiához vezet a fehérjeanabolizmus, illetve a glikogénképzés: mindkét folyamat K-igényes.

K-mentes oldatok hígítással csökkentik a K szintjét; a cukor a K-nak sejtbe való beépülése, a Na pedig antagonizmusa miatt a vesék útján fokozza a K kiválasztását.

A klinikai kép előterében a neuromuscularis ingerületátvitel zavarai állanak; az izomgyengeség bénulásig fokozódhat. A belek simaizmainak működészavara gyomor-bél atóniához vezet, a légzőizmok gyengesége nehezíti a légzést, gátolja az expectoratiót. A szívizom funkciózavarát jól mutatja az EKG; a ritmus zavarait, a T hullám ellapulását, a T hullámokkal összeolvadó U hullámokat, az ST szakasz süllyedését, és időnként a Q—T idő megnyúlását láthatjuk. Súlyos hypokalaemiában szívmegállás vethet véget az életnek (l. 18-3. ábra).

A hypokalaemiával együtt járó metabolikus alkalosis oka az, hogy a K-szint csökkenése H és Cl-vesztéssel jár.

A vese fiziológiás K-kiválasztása: 35—90 mmol/nap. Hypokalaemiában csökken, de

nem szűnik meg; a vesék K-megtakarító képessége csekély. Fokozott az ürítés Conn-syndromában, diabeteses acidosisban, némely vesebetegségben, diuretikumok, steroid hormonok terápiás alkalmazásakor. Csökkent az ürítés Addison-kórban, oligo-anuriákban, hypokalaemiában. A széklettel, átlagos K-bevitel mellett, 5 mmol mennyiség ürül naponta.

Calcium. A szervezetben levő átlagosan 1000—1200 g Ca legnagyobb része, mintegy 99%-a, a csontokban azok vázát alkotja. Az EC folyadékban kb. 0,3 g van. Anyagcserejét a mellékpajzsmirigy szabályozza. A plasma Ca-tartalma 4,5—5 mval/l, ennek közel 2/3-a ionizált. A klinikai tüneteket a plasma csökken, illetve emelkedett Ca-szintje szabja meg. A táplálékkal bevitt Ca a vékonybélben szívódik fel, e folyamatot a többi között a D-vitamin, valamint a vékonybél tartalma vegyhatása szabályozza. A Ca-nak a vérárvadás mechanizmusában, az izom-ideg tevékenységben és a sejtmembrán-permeabilitás fenntartásában van jelentős szerepe.

A hypercalcaemia leggyakoribb okai a Ca vagy/és a D-vitamin túladagolása, a parathyreoidea túlműködése. Myeloma multiplex, sarcoidosis, krónikus nephritis, csonttörések, csont-metastasisokkal járó tumorok és a respirációs alkalosis egyes esetei járhatnak még emelkedett se-Ca-értékkel.

Klinikai tünetek: gyengeségérzet, szomjúság, étvágytalanság, hányinger, hányás, polyuria. Jellemző a neuromuscularis ingerlékenység csökkenése, a szívizomzat fokozott contractilitása, kamrai ES-ék, ritmuszavarok. Extrém foka kamra-fibrillációhoz, systolés szívmegálláshoz, hypercalcaemiás comához vezet.

Hypocalcaemiát a felvétel elégtelensége, a felszívódás zavara, a megnövekedett igény, illetve a fokozott kiválasztás okozhat. A parathyreoidea csökkent működése, illetve eltávolítása, a D-vitamin hiánya lehetnek kiváltói. Tömeges ACD konzervvér transzfúziójakor a citrát Ca-ot köt meg, és így hypocalcaemiát okozhat. A hypocalcaemiát a foszfor szintjének emelkedése kíséri.

A klinikai tüneteket a neuromuscularis ingerlékenység fokozódása, tetaniás és hasi görcsök, kettős látás, stridor, dyspnoe jellemzik.

A mérgező kálium tartalmú élelmiszerekkel túladagolt kálium mérgező hatását csökkentő anyagok, melyekről folyamatosan lebeszélnek!

Csőd 11 fő oka

Hazánk mai egészségi- és gazdasági csődjének a 11 (tizenegy) alapvető fő oka, amelyeknek az eltávolítása is hazaárulás!

- 1./ Konyhasóval (NaCl-dal) műtrágyázással mérgezik a magyar termőföldeket.
- 2./ Tudatosan akadályozzák a konyhasó fiziológiás mértékű optimális étkezési pótlását (a Ringer oldatban lévénél sokkal kevesebb konyhasót pótlás életrövidítő + ivartalanító hatású).
- 3./ Timsó, kálisó stb. káliumvegyületekkel mérgezik az élelmiszereket (a kálium túladagolás is életrövidítő + ivartalanító = népirtó hatású).
- 4./ Tudatosan rákényszerítenek a káliumot mérgezően túladagoló életrövidítő és ivartalanító étkezésre (kb. a negyedik nemzedéknyi férfilakosság lesz miatta teljesen nemzőképtelen).
- 5./ Tudatosan akadályozzák az egészséget védő és gyógyító hatású desztillált ivóvízzel vízpótlást, helyette fertőző vírusos ürüléket és mérgező vegyszereket tartalmazó vezetékes vízzel itatják a népet, s az ürülék helyett a mérgező káliummal műtrágyázásra kényszerítik.
- 6./ 1-5. folytatásához tudatosan meghamisították a laboratóriumi adat értékeléshez és egészségügyi előírásokhoz alapul vett (határérték) számokat.
- 7./ Kb. 300%-kal több adó + járulék sújtja a magyar termelők termékárát, mint azonos piacon árusító külföldiek (szlovákok stb.) termékárát. Emiatt a magasabb árú hazai termékek eladhatatlanok és a magyarországi termelők beszüntetik a termelést, s megszüntetik a termelő üzemi munkahelyeket.
- 8./ Tudatosan akadályozzák az áramtermelő erőművek geotermikus (magma)hővel fejlesztett olcsó nagynyomású gőzre történő átállását, s az erre alkalmas, a Potter Drilling cég által kifejlesztett kőzetátolvasztásos, olcsóbb mélyfúrás alkalmazását.
- 9./ Magyarországnak azért is lett a korábbinál is sokkal nagyobb külföldi adóssága, mert a kormányok, e hitelek törlesztésére pénzszerzés címén külföldieknek eladott magyar területekért, vállalatokért, ingatlanokért beszedett összegnél többet, sok ezermilliárd forintot elpazaroltak, elpazarolnak a vidéki szennyecsatornák számának növelésére, hogy az ivóvíz szolgáltató folyókba a vezetékes ivóvízbe átjutó fertőző vírusokat, fogamzásgátló stb. népirtó anyagokat juttassanak.
- 10./ Az infúzióknál és étkezésnél is optimális Na : K = 30 : 1 arány helyett az Na : K = 1 : 1 gyilkos arányt alkalmazó kormányok, az általuk ezúton ivartalanított és lerövidített életű magyarok megüresedett ingatlanait eladják külföldieknek, s eltulajdonítják a kipusztított magyarok nyugdíjra befizetett pénzét.
- 11./ 1-10. Főleg a korrupt tudományos- és törvénykezési bűnözők bűne.


(11 csodfóok)



AGROANAL PJT

1036 BUDAPEST
Lajos u. 115. III. 18.
Tel.: 682-532

Az "antirandom" elrendezésnél a mért objektumok a "szomszédjaikat" nem zavarva, azok közé harmónikusan illeszkedve vesznek részt a mérésekben, így a "kezelések" / az objektumokat befolyásoló hatások / optimuma zavartalanul mérhető és pontosan beállítható, / nagyüzemileg is / jól reprodukálható. Emiatt - más rendszerekhez képest - a hatékonyság többszörös. / Az értelmetlenül zavarosított "szomszédviszony": "random-elrendezés" /. A "vonal menti" antirandom elrendezésnél az egyes "kezelések" megfelelő "tényezők" különböző intenzitású hatásai folyamatosan / vagy folytonos lépcsőzetességgel / követik egymást, egy vagy több ismétlésben:




Több irány, sík- és térbeli / valamint időbeli / tényező-kombinációkkal.

szántóföldi
'mérőter'



gradiens-fókusz-os
'fókusz'
rendszerek


A "szomszéd" objektumokon mért adatokat a speciális értékelés oly módon egyezteti egymással, hogy minden "irányban" meghatározza a "függvény menetek" és a függvényt alkotó egyes "érték-kombinációk", és ezek különböző csoportjai illeszkedését egy-egy függvényről és ezt követően egymáshoz képest.



GRADIENS "irányok"

Az optimum 'mérete' / tömege /, az optimum behatárolási pontosság, gradiens-csökkenéssel és felosztás-növeléssel tetszés szerint növelhető.

Aszomszédos objektumok adatai statisztikailag összesíthetők, külön minden "tényező-kombináció"nál, egyetlen "mértéktér"ből.



Minden "kombinációnál" az összes többi is statisztikailag figyelembevehető. / megtakarítások /.

Handwritten signature

ANTIRANDOM ALKALMAZÁS-TECHNIKA-SZOLGÁLTATÁS

TGR-103/12

Az "antirandom" mérőtereket *mérés tervező, mérési adat gyűjtő és optimum határ-érték összefüggés mérő* készülék rendszerek egészítik ki, amelyekkel az eredmény adaptációk is elősegíthetők. Az egymást nem zavaró szomszéd objektumokon mért adatok egymással való megfelelő egyeztetésével sok növényi stb. objektum (és mérése) megtakarítható a statisztikai kiértékeléseknél is.

Ennek megfelelően az *összes eddigi mérés és kiértékelés is elvégezhető*, jelentős anyag-, energia-, vizsgálati kapacitás valamint hely- és idő szükséglet csökkentés és ezeknek megfelelő vizsgálati *költség csökkenés* elérésével.

A nagyobb hatékonyság az eddigi (random) módszer mérési elrendezésével *ellentétes* (harmonikus) *antirandom* kezelésekben és méréseken valamint értékeléseken és *eredmény adaptációkon* alapul. /random: RANDOM HOUSE, Israel/

Az AGROANAL PJT antirandom mérési elrendezés *optimum szabályozó* technológiai, különböző mérőtér mérettel, helytakarékosan és energia takarékosan, a *mérési kapacitások* és a számítógépes értékelési lehetőségek jó kihasználásával több különböző /ipari, mezőgazdasági és tudományos/ területen is *megtöbbszörözik a teljes kutatási és innovációs folyamatok* hatékonyságát.

ANTIRANDOM

tudományos gradiens szuperpozíciós nagyüzemi termesztés technológiai

*optimalizáló
irányító-rendszer*

*közvetlen technológia
optimalizálás*

*Új tudományos
optimum-szabályozás*

*soktényezős
rendszer*

*0-90 cm-es talajt 6 rétegben mintázó
folyamatosan haladó talajmintavevő gép*

*hatékonyabb
energia-takarékos
rendszer*

*folyamatos
mérés*

*betakarításkor talajmintát szedő
adapter az üzemi kombájnokhoz*

üzemi gépekkel

rádió-rendszer

*távvezérlés
távadatgyűjtés*

*nagy táblás
gazdaságossági
optimum*

*elektronikus mérlegek, mérleg adapterek
termés mérésekhez*

*nagyüzemi gépesítés
termésoptimum*

fejlesztés

*harmonikus-permetező
harmonikus-műtrágyázó*

*permeté-összetétel optimalizálás
folyékony-műtrágya optimalizálás*



készülékgyártás

*többgradiensű optimum fitotron
mágneses sarokpont*

ANTIRANDOM fitotron

légifutó

mérési-tervezési software

*összehangoló
számítógép*

Üzemi mérés alapú konzultációs szaktanácsadási számítástechnika, vezetőknek / Optimum-analizátorok, döntés-egyeztető program csomaggal, amely az agronómus tapasztalatait beépíti a mérési adatrendszerbe az optimalizálásoknál/

*korrekt kísérletvezések és
kalibrált talaj-növény- és energia mérések adatai alapján
nyereség-optimalizálás*

*Mezőgazdasági
kísérlet-analízis*

szolgáltatás, értékesítés:

AGROANAL PJT

Teljes know-how

**1036 BUDAPEST
Lajos u. 115. III. 18.
Tel.: 682-532**

A mérgező kálium sokszorosra fokozza az aszálykárt, ami vésszen eladósítja a mezőgazdasági termelőket a termőföldek magyar tulajdonosait, hogy a hitelező bankok elérverezhessék a termőföldeket a pénzes, többet fizető külföldi cégeknek :



A Budapesti Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Zöldségtermesztési Kutató Intézetében, szabadföldi ANTIRANDOM MÉRŐTÉR.
A paprika a magas környezeti hőmérsékleten egy fóliaházban ritkult ki előzőleg. Ott pusztult ki fokozottabban, ahol a talaj kálisó-műtrágyát is kapott. (1983) ANTIRANDOM Software All Rights Reserved by inventor dipl. ing. A. Tejfalussy, Budapest. (Code: paprikasoroksar)



J e g y z ő k ö n y v

Felvéve ATT Verőcsevárosi kísérleti Állomásán, 1992. szeptember 9-én, az izraeli káliumnitrát élővilágvédelmi ellenőrző mérésének az együttes értékelése alkalmával.

Az értékelésen jelen vannak:

Tejfalussy /Sydo/ András ATT elnök

Böröcz Zsuzsanna antirandom gmk vezető

Felczéder Tibor növényvédelmi szakértő

Dr. Bicsók Gyula KTM-OTvH főosztályvezető

Dr. Vajna Tamásné a KTM-OTvH ^{mezőgazdasági felügyelő} élővilágvédelmi szakértője

Rosta László, mint a KTM-OTvH ^{Élővilágvédelmi Főosztály főmunkatársa} talajtani és növényvédelmi szak-
értője

A mérőtér elrendezésének és az értékelési módszernek /léd. hátoldali segédlet/, a jelenlévők mindegyike közvetlenül ki tudja olvasni a növényzet látható jellemzőiből /termésmennyiség, levél-elzsineződés, megdőlés/ annak interferencia képei alapján /Interaction Interference Test: IIT/ a következő kalibrálási eredményeket:

Kettő növény-/paprika-/fajtánál is mutatja a mérőtér növényzetének a strukturálódása, hogy az izraeli káliumnitrát csak abban az egy esetben károsítja kevésbé /kevésbé, mint a káliumklorid/ a növényeket, ha erősen áztatott talajban használják. Egyébként, a korábban nem trágyázott, ill. még nem műtrágyázott talajon is, a kálium mindkét főfában történt adagolása erőteljesen csökkentette már kis, 25-60 kg/hektár dózisainál is, a növényzet alkalmazkodó és különösen a stressz-tűrő képességét. Ez mind a foszfát, mind a nitrogén, mind a fajta paraméterek perturbáló hatása esetén jól láthatóan megmutatkozott. Erőteljesen csökkent a káliumos műtrágyázás a növényzet asszilyelviselését. Növeli a nitrátfelvételi veszteségeit, több káliumnál ugyanolyan termés és zöld levél szín nagyobb nitrogén műtrágya adagokhoz kapcsolódott /vízmérgező hatás/. A foszfát műtrágyakomponens 25-80 kg/hektár dózisok között növelte a növényzet alkalmazkodó és tűrőképességét és produkcióját, száraz körülmények között a nitrogén már 75-125 kg/hektár dózis között is pozitívította a növényzetet, növelte az asszilykárt. Kálium nélkül a növények mindenhol - a vízmennyiségtől függően - kevés műtrágyával is egészségesek, jól produkáltak.

K.m.f.

..... Tejfalussy /Sydo/ András	 Böröcz Zsuzsanna	 Felczéder Tibor
..... Dr. Bicsók Gyula	 Dr. Vajna Tamásné	 Rosta László

AMIT AKARNI KELL:

- 1. Valódi jogállamot**
- 2. Okos és becsületes legjobb szakember vezetőket**
- 3. Igaz tudományon alapuló oktatást és kutatás-fejlesztést**
- 4. Ökoszisztéma egyensúlyt biztosító termelést és fogyasztást**
- 5. Teljeskörű nyílt demokratikus tájékoztatást**
- 6. Az elvégzett munka társadalmi hasznosságával arányos, nemzetközi átlagnak megfelelő, igazságos munkadíjakat és egészségbiztonságot**
- 7. Szeretet alapú igaz emberséget és barátságot**

www.aquanet.fw.hu

Code: 7pontN

Jelenleg még sokan elhiszik a **Ringer** infúzió szerinti konyhasó és kálium dózisok és a tiszta desztillált víz étkezésnél ártalmasságát. Valószínűleg emiatt szaporodik a betegek és rövidült életűek száma, s ezek okán csökken tragikusan a férfi spermium szám. Ugyanis mérgező a sokkal több kálium (1). Ártalmas a sokkal kevesebb konyhasó (2). Veszélyes a hiányos tisztítású ivóvíz (3). Vegyi fegyverként hatnak: 1 és 2 elrontja a vért. A 3 mérgeket és fertőző vírusokat juttat a véredbe. Étkezési védekezés: a gyógyításra több száz év óta alkalmazott Ringer infúziós oldat szerinti tiszta desztillált ivóvíz, konyhasó és kálium dózisok. Ehhez megtekintheted „Az eltitkolt kezelési mód; Weixl Várhegyi László” videót, természetgyógyással történt beszélgetést (You Tube), és letöltheted a gyógyító víz-, konyhasó- és kálium pótlást leíró [Helyesen sózás, és tiszta ivóvíz](#) című könyvet az internetről, a Google megtalálja! **Terjesszed!**

(Kód: Te-is-terjesszed!!!)

Jelenleg még sokan elhiszik a **Ringer** infúzió szerinti konyhasó és kálium dózisok és a tiszta desztillált víz étkezésnél ártalmasságát. Valószínűleg emiatt szaporodik a betegek és rövidült életűek száma, s ezek okán csökken tragikusan a férfi spermium szám. Ugyanis mérgező a sokkal több kálium (1). Ártalmas a sokkal kevesebb konyhasó (2). Veszélyes a hiányos tisztítású ivóvíz (3). Vegyi fegyverként hatnak: 1 és 2 elrontja a vért. A 3 mérgeket és fertőző vírusokat juttat a vérredbe. Étkezési védekezés: a gyógyításra több száz év óta alkalmazott Ringer infúziós oldat szerinti tiszta desztillált ivóvíz, konyhasó és kálium dózisok. Ehhez megtekintheted „Az eltitkolt kezelési mód; Weixl Várhegyi László” videót, természetgyógyással történt beszélgetést (You Tube), és letöltheted a gyógyító víz-, konyhasó- és kálium pótlást leíró [Helyesen sózás, és tiszta ivóvíz](#) című könyvet, az internetes Google kereső program megtalálja! **Te is terjesszed!**

Jelenleg még sokan elhiszik a **Ringer** infúzió szerinti konyhasó és kálium dózisok és a tiszta desztillált víz étkezésnél ártalmasságát. Valószínűleg emiatt szaporodik a betegek és rövidült életűek száma, s ezek okán csökken tragikusan a férfi spermium szám. Ugyanis mérgező a sokkal több kálium (1). Ártalmas a sokkal kevesebb konyhasó (2). Veszélyes a hiányos tisztítású ivóvíz (3). Vegyi fegyverként hatnak: 1 és 2 elrontja a vért. A 3 mérgeket és fertőző vírusokat juttat a vérredbe. Étkezési védekezés: a gyógyításra több száz év óta alkalmazott Ringer infúziós oldat szerinti tiszta desztillált ivóvíz, konyhasó és kálium dózisok. Ehhez megtekintheted „Az eltitkolt kezelési mód; Weixl Várhegyi László” videót, természetgyógyással történt beszélgetést (You Tube), és letöltheted a gyógyító víz-, konyhasó- és kálium pótlást leíró [Helyesen sózás, és tiszta ivóvíz](#) című könyvet, az internetes Google kereső program megtalálja! **Te is terjesszed!**

Jelenleg még sokan elhiszik a **Ringer** infúzió szerinti konyhasó és kálium dózisok és a tiszta desztillált víz étkezésnél ártalmasságát. Valószínűleg emiatt szaporodik a betegek és rövidült életűek száma, s ezek okán csökken tragikusan a férfi spermium szám. Ugyanis mérgező a sokkal több kálium (1). Ártalmas a sokkal kevesebb konyhasó (2). Veszélyes a hiányos tisztítású ivóvíz (3). Vegyi fegyverként hatnak: 1 és 2 elrontja a vért. A 3 mérgeket és fertőző vírusokat juttat a vérredbe. Étkezési védekezés: a gyógyításra több száz év óta alkalmazott Ringer infúziós oldat szerinti tiszta desztillált ivóvíz, konyhasó és kálium dózisok. Ehhez megtekintheted „Az eltitkolt kezelési mód; Weixl Várhegyi László” videót, természetgyógyással történt beszélgetést (You Tube), és letöltheted a gyógyító víz-, konyhasó- és kálium pótlást leíró [Helyesen sózás, és tiszta ivóvíz](#) című könyvet, az internetes Google kereső program megtalálja! **Te is terjesszed!**

Jelenleg még sokan elhiszik a **Ringer** infúzió szerinti konyhasó és kálium dózisok és a tiszta desztillált víz étkezésnél ártalmasságát. Valószínűleg emiatt szaporodik a betegek és rövidült életűek száma, s ezek okán csökken tragikusan a férfi permium szám. Ugyanis mérgező a sokkal több kálium (1). Ártalmas a sokkal kevesebb konyhasó (2). Veszélyes a hiányos tisztítású ivóvíz (3). Vegyi fegyverként hatnak: 1 és 2 elrontja a vért. A 3 mérgeket és fertőző vírusokat juttat a vérredbe. Étkezési védekezés: a gyógyításra több száz év óta alkalmazott Ringer infúziós oldat szerinti tiszta desztillált ivóvíz, konyhasó és kálium dózisok. Ehhez megtekintheted „Az eltitkolt kezelési mód; Weixl Várhegyi László” videót, természetgyógyással történt beszélgetést (You Tube), és letöltheted a gyógyító víz-, konyhasó- és kálium pótlást leíró [Helyesen sózás, és tiszta ivóvíz](#) című könyvet, az internetes Google kereső program megtalálja! **Te is terjesszed!**

Jelenleg még sokan elhiszik a **Ringer** infúzió szerinti konyhasó és kálium dózisok és a tiszta desztillált víz étkezésnél ártalmasságát. Valószínűleg emiatt szaporodik a betegek és rövidült életűek száma, s ezek okán csökken tragikusan a férfi spermium szám. Ugyanis mérgező a sokkal több kálium (1). Ártalmas a sokkal kevesebb konyhasó (2). Veszélyes a hiányos tisztítású ivóvíz (3). Vegyi fegyverként hatnak: 1 és 2 elrontja a vért. A 3 mérgeket és fertőző vírusokat juttat a vérredbe. Étkezési védekezés: a gyógyításra több száz év óta alkalmazott Ringer infúziós oldat szerinti tiszta desztillált ivóvíz, konyhasó és kálium dózisok. Ehhez megtekintheted „Az eltitkolt kezelési mód; Weixl Várhegyi László” videót, természetgyógyással történt beszélgetést (You Tube), és letöltheted a gyógyító víz-, konyhasó- és kálium pótlást leíró [Helyesen sózás, és tiszta ivóvíz](#) című könyvet, az internetes Google kereső program megtalálja! **Te is terjesszed!**

Jelenleg még sokan elhiszik a **Ringer** infúzió szerinti konyhasó és kálium dózisok és a tiszta desztillált víz étkezésnél ártalmasságát. Valószínűleg emiatt szaporodik a betegek és rövidült életűek száma, s ezek okán csökken tragikusan a férfi spermium szám. Ugyanis mérgező a sokkal több kálium (1). Ártalmas a sokkal kevesebb konyhasó (2). Veszélyes a hiányos tisztítású ivóvíz (3). Vegyi fegyverként hatnak: 1 és 2 elrontja a vért. A 3 mérgeket és fertőző vírusokat juttat a vérredbe. Étkezési védekezés: a gyógyításra több száz év óta alkalmazott Ringer infúziós oldat szerinti tiszta desztillált ivóvíz, konyhasó és kálium dózisok. Ehhez megtekintheted „Az eltitkolt kezelési mód; Weixl Várhegyi László” videót, természetgyógyással történt beszélgetést (You Tube), és letöltheted a gyógyító víz-, konyhasó- és kálium pótlást leíró [Helyesen sózás, és tiszta ivóvíz](#) című könyvet, az internetes Google kereső program megtalálja! **Te is terjesszed!**

(Kód: Te-is-terjesszed!)

Amit az étkezési sóról tudni kell



Mindenki számára nagyon fontos, hogy étkezési során tiszta NaCl konyhasót egyen. A kereskedelemben kapható sók egy része ismeretlen mennyiségű kálisót tartalmaz, pedig ez nagyon veszélyes. Az **MSZ 11007:2013** (Magyar Szabvány) szerint minimum 97% NaCl konyhasót kell tartalmaznia mindegyik étkezésre szánt sónak, de KCl kálisó nem szerepel a fennmaradó maximum 3%-nyi egyéb komponensek között. Bővebb leírást a **www.tisztaso.hu** oldalon a dokumentumoknál találasz.

2013. NOV. 18.



Ha tiszta, kétszeres minőségellenőrzési vizsgálatot felügyelt, minimum 99,5% NaCl tartalmú konyhasóra (nátrium-kloridra) van szükséged, akkor a **www.tisztaso.hu** weboldalon keresztül beszerezheted. Az 1kg-os NaCl konyhasót a patikák által használt gyógyszerkönyvi tisztaságú konyhasó 25kg-os zsákból csomagoltuk át.

Megkérlek mindenkit, hogy ezen írást továbbítsa minden ismerősének, és kérje meg őket is, hogy továbbítsák az alábbiak miatt:

EGÉSZSÉGVÉDELEM

Tejfalussy András mérési tanár szakértő és Weixl Várhegyi László csk. természetgyógyász, ny. rendőrelvezredes állásfoglalása a **www.tejfalussy.com** honlapon dokumentált tudományos mérések és tartózkodások, és Prof. Dr. Papp Lajos nyugalmazott egyetemi tanár akadémiai doktor szakvéleménye alapján:

- Mitől lett ennyire sok magyar ember beteg, rövid életű, és meddő? Miért csökken évi több tízezerrel a létszámunk? Három ritkos főfelelősre mutattak rá az ok-okozat kalibráló élettani mérések:
- 1.: Túltérheli az immunrendszert, ha az ivóvíz mérgező vegyszereket és/vagy klórozásnak ellenálló vírusokat tartalmaz.
 - 2.: Keringéscsökkentő, ha a fiziológiás mérték alá csökkentik a konyhasó pótlást.
 - 3.: Sejtműködés-gátló, keringéscsökkentő és ivartalanító hatású, ha a fiziológiás szükségletnél sokkal több káliumot esznek, isznak.

Megbízható védekezés:

- 1.: Ivóvíz desztillálás,
- 2.: Gyógyszerkönyvi tisztaságú NaCl konyhasóval fiziológiás mértékben sózás,
- 3.: Kálium túladagolás megelőzése.

Ezen anyagok élettanilag optimális, fiziológiás napi dózisaira és beviteli sebességeire étkezésnél is irányadóak a magzatot (aplátó) vérszérum és a magzatvíz, és a csecsemők és felnőttek gyógyítására is alkalmazott fiziológiás infúziós Ringer oldat $H_2O/Na=110$ és $Na/K=30$ optimális arányai.

NYILATKOZAT

A Ringer oldat a testnedvekhez hasonló ionösszetételű folyadék. A Ringer oldat (0,9% NaCl, 0,03% KCl, 0,025% $CaCl_2$, 0,02% $NaHCO_3$, 99% desztillált víz) szerinti nátrium, kálium, klor és víz pótlási arány megfelel a kóros veszteségek esetén, de ugyancsak optimális a napi étkezések során is.


Budapest 2010. január 6.


Dr. Papp Lajos ny. egyetemi tanár, akadémiai doktor s.k."

APLA Best Expert Choice

Automatizált Pszicho-Logikai Analízis

KIKÉRDEZŐMOTOR-SOFTWARE





A TÉMÁBAN MEGTEKINTÉSRE AJÁNLOTT FIMFELVÉTELEK

Weixl Várhegyi László: Lakosság gyérítés állami segédlettel

<https://www.youtube.com/watch?v=zf527ZfXLmw>

Sóval mérgezik a Magyar?- Tomcat

<https://www.youtube.com/watch?v=uFSLjPSvUsY>

Papp Lajos a káliummal mérgezett sóról

<https://www.youtube.com/watch?v=TvDYzBr0l4M>

Az egészségügy Hazánkban- Dr. Marosi Pál gyermekgyógyász

<https://www.youtube.com/watch?v=dudTX4KZcEY&feature=youtu.be>

Tejfalussy András kutatási eredményei

<https://www.youtube.com/watch?v=8lqhSgawGCo&feature=youtu.be>

Ne hidd, mérjed

<https://www.youtube.com/watch?v=uc98NdkH6M0&feature=youtu.be>

A termőföld mérgezése sóval

<https://www.youtube.com/watch?v=S4-K6DprbRI&feature=youtu.be>

A desztillált vízről és a gyógyításról- Tejfalussy András

https://www.youtube.com/watch?v=3j6_HtFeq2I&feature=youtu.be

Weixl Várhegyi László természetgyógyász doktor: Tudjuk meg az igazságot a sóról és a vízről

<https://www.youtube.com/watch?v=pacGasDylGY>

Az eltítkolt kezelési mód

<https://www.youtube.com/watch?v=IEpsZiQ4VNs>

A döntés optimalizálása

<https://www.youtube.com/watch?v=GqTKtA1sjbl&feature=youtu.be>