

MTA-BŰNÖZÉS: MÉRGEZTETÉSI CSALÁS SZERVEZŐ TUDOMÁNYOS AKADÉMIA?

Népirtási célú egészségkárosítást szervezett és fedez, miután a szükségesnél sokkal kevesebb konyhasót vagy sokkal több káliumot fogyasztás is, az 1950-ben Nobel díjat kapott tudományos kutatók patkányokon és embereken végzett konyhasó és kálium dózisvariációs élettani hatás vizsgáló kísérletei szerint, súlyosan egészségkárosító, életrövidítő, nemi jelleg torzító, fajirtó hatású.


Államilag bebeszéltették (Stop Só nemzeti sócsökkentési program, MENZAREFORM, Chipsadó), hogy a napi 5 grammnál több tiszta konyhasót fogyasztás és a legkevesebb tiszta desztilláltvíz is egészségkárosító. Közben a rákbeteg zsidók sikeres gyógyítására használt SALSOL infúzióban csak tiszta desztillált víz és annak minden literében 9 gramm tiszta konyhasó van! Ráfogták a gyógyító desztillált vízre a konyhasópótlás akadályozás egészségkárosító, (vérelektrolit torzító) ártó hatását!!

Államilag bebeszéltették a napi legalább 4,7 gramm kálium pótlás egészségvédő hatását. Miközben tudják (lásd a Ringer infúzió összetételét), hogy a nátrium és kálium pótlás akkor optimális, ha 110-szer több (desztillált) víz jut be a vérbe, mint amennyi konyhasó, és 30-szor kevesebb kálium, mint amennyi nátrium. Azért ez az optimális, mert az egészséges ember vérszérumában ez a természetes arány (víz:konyhasó=110, kálium:nátrium=1/30.) A több száz év óta gyógyításra alkalmazott Ringer infúzió napi 3 liter desztillált vízzel 27 gramm konyhasót, de csak 0,36 gramm káliumot juttat be a vérbe. Következésképpen nyilvánvaló egészségkárosítás a szükséges konyhasó mennyiség 1/5-nél is kevesebb konyhasót és a szükséges káliummennyiség 10-szeresénél is több káliumot „pótoltatás”.

Ezúton is felszólítjuk az állami és önkormányzati vezetőket: ne engedjék folytatni, hogy a pékek és a menzák patkányméreg kálisóval sózzák az ételt! Akkor se engedjék, ha a WHO ajánlja a csalást*!

A további bizonyítékokról lásd a www.tejfalussy.com honlapot (Videó 10. és Email könyv 1-100.).

* Egészségvédő konyhasó helyett patkányméreg kálisóval sózást ajánló hamis WHO kiadvány



Utóirat: Az élelmiszer növények és azokat fogyasztó állatok és emberek kálium túladagolással mérgezését bizonyíthatóan a Magyar Tudományos Akadémiai kutatóintézeti kutatók, például Kádár Imre hamis publikációi fedezik. Szembehazudta a káliumműtrágyáknak a nemzetközi tudományos szabadalmaim szerinti alábbi Antirandom Monitorral általam leleplezett aszálykárnövelő hatását is:

ANTIRANDOM

MEZŐGAZDASÁGI ANYAGHATÁS MÉRÉSI SOFTWARE



Kisiskolás gyerekek is el tudják végezni a fenti hatás ellenőrző mérést!

Csak kálium műtrágya mentes talajban éltek túl a növények a mesterséges aszályt!

Kálisózás nélkül egészségesebbek a növények és azok is, akik megeszik a növényeket!

Nem mezőgazdasági termésnövekedés kell, hanem fenntartható egyensúly!

Ne zsákmányold ki a földet, adj is Neki!

ALL SOFTWARE RIGHTS RESERVED!

Tejfalussy András okl. vill. mérnök feltaláló méréstani szakértő, www.tejfalussy.com
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság
Ellenőrző Központja PJT elnök, Hungary 2631Verőce, Lugosi u. 71.
tejfalussy.andras@gmail.com, + 36 20 218 1408

Kód: mezogazdasagi-anyaghatas-meresi-software

SZLOVÁK TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓINTÉZETI KUTATÓ IS PUBLIKÁLTA A KÁLISÓVAL MŰTRÁGYÁZÁS KÁRTÉKONYSÁGÁT, NÖVÉNYT, ÁLLATOT ÉS AZ EMBERT IS MÉRGEZŐ HATÁSÁT, DE SZINTE SENKI SEM VETTE ÉSZRE, MERT EGY MAGYAR NYELVŰ SZLOVÁKIAI ÚJSÁGBAN (ÚJ SZÓ) JELENTETTÉK MEG.

Újszó

17

1986. IX. 18

1988. IX. 16.

A termőterületek műtrágyázásával, illetve a terméseredmények szempontjából a keménység optimális mértékével és ennek környezeti hatásaival nem egy szakcikk, értekezés, vagy laikus eszmefuttatás foglalkozik a sajtó hasábjain. A műtrágyázás egyik különösen negatív hatásaként a zöldség-látnak és egyéb növényi termékekben fellelhető nitrógen-származékokat nevezték meg, s ezzel összefüggésben felhívják a figyelmet a nitrógentartalmú műtrágyák túlzott alkalmazására.

A Szlovák Tudományos Akadémia Kísérleti Növénykertje és Rovartani Intézetében elért legújabb eredmények azonban egy másik „bűnösre” mutatnak rá, amely részt vállal a modern mezőgazdaságban működő negatív jelenségek szinte mindegyikéből. Ez a figyelemre és főleg ellenőrzésre méltó elem – Ján Kráľovičnak, az említett intézet munkatársának véleménye szerint – a kálium, amelynek problémájával már évtizedek óta foglalkoznak.

Gond a tejjel

A probléma bevezetőjében el kell mondani, hogy a csehszlovák mezőgazdaság a műtrágya-felhasználása, a gyom és rovarirtószerek alkalmazása területén is túl van azon a határon, amit a termelés mennyisége és minősége szempontjából optimálisnak nevezhetünk. Általánosan elterjedt nézet – mivel a termékekben magas a nitrátok aránya – hogy a talaj nitrógenrel van túladagolva. A nitrátok problémája természetesen komoly és aktuális, de a legújabb eredmények arra engednek következtetni, hogy ebben is a túladagolt kálium, illetve néhány helyen foszfor hatással kell látnunk.

Köztudott, hogy viszonylag magas színvonalú nálunk a növénytermesztés, de problémáink vannak az állattenyésztésben, ahol a világ fejlett országaival való összehasonlítás nem éppen hízelgő a számunkra. Ez leginkább a lómegegyesek minőségével kapcsolatban érzékelhető. A tejtermeléshez például sokkal több erőtakarmányt használunk fel, mint más fejlett szarvasmarha-tenyésztéssel rendelkező országok, mivel lómegegyesekkel nem tudjuk elérni a kívánt teljesítményt. A szárlított lómegegyesek ugyanis nálunk 25-30 gramm káliumot is tartalmaz kilogrammonként, noha az optimális mennyiség 10-15 gramm közötti lenne. De ugyanígy probléma a burgonya keménységtartalma, illetve a cukorrépa cukortartalma, sőt még a gabona korai érése is, amely utóbbi leg-

gyebb feltételek veszélyeségeit okoz hektáronként. Minél kevesebb káliumot juttatunk a káliumtartalomra vezethető vissza.

Hiányzó mikroelemek

A kálium az az alapvető elem, amely a növényekben az ionok felvételétől függ. Bizonyos koncentrációig harmonikusan felvesz mindenféle iont, de egy határon túl blokkolni kezd a kalcium és a magnézium felvételét. Ezek az ember és az állat ásványi

kedvező körülmények alakulnak ki a káliumot korlátozó gyomok felmérése is, s ezek már nagymértékben elszaporodtak. Ha körülnézünk a földeken, ahol egyébként egyre több gyomirtót használunk, bizonyos fajta gyomok eltűnnek, mások viszont állandóan terjednek. Előfordít ugyan a kálium, amelynek nem kedvez a kálium, de van helyette libatop és parlagi tüske minden mennyiségben. Ezek ellen újra herbicidet használunk, ami gátolja a fotoszintézist, tehát megint csak elősegíti

De nemcsak a növények ellenállóképességét, illetve a mezőgazdasági termékek ásványianyag-összetételét befolyásolja, hanem közvetlen hatással van a gazdasági hasznára is. A burgonyában valamikor a halvasz évéig még 20-21 százalékos volt a keménységtartalom, amely mára 13-14 százalékra csökkent, s ugyanez a helyzet a cukorrépánál is, ahol a halvasz évéig 18-20 százalékos cukortartalmat mérhettünk, s mára az átlag 14,6 százalék. Ehhez tudnunk kell, hogy az ötvenes években a talaj káliumtartalma kilogrammonként még körülbelül 90 milligrammnyi szinten volt, s mára már 250 körül értéket is mérhettünk.

Csökkenteni kell

Ahhoz tehát, hogy a fentebb felsorolt problémákat kiküszöböljük – az SZTA Növénykertje és Rovartani Intézetének eredményei szerint – a legfontosabb feladat a talaj káliumtartalmának csökkentése. Ez nemcsak jobb terméseredményeket hozhat, hanem ami lényeges, javítja annak minőségét, és csökkentheti az egyéb műtrágyák, a növényvédők és rovarirtók szerek felhasználását is. Évek óta végzik a kálium és a nitrógen arányának a terméseredményekre való hatással vizsgáló kísérleteket. Bebizonyosodott, hogy a legnagyobb terméseredményeket akkor érik el, ha a talaj káliumtartalma 90 mg mennyiségű káliumot tartalmaz, és hogy a terméseredmények 200 milligrammál, különböző években 16-24 százalékkal is csökkenthetnek. Ez a 200 mg a jelenlegi átlagos szint.

A talaj káliumtartalmának csökkentése megoldható a nitrátproblémát is. Bebizonyosodott ugyanis a kísérletek során, hogy a nagyobb mennyiségű termés előérése érdekében magas káliumtartalom mellett háromszor-négyszer nagyobb mennyiségű nitrógen kell felvennie a növénynek. Ezen kívül a talaj káliumtartalmának csökkentése még egy fontos probléma megoldásában is segít: az egyszerűbbé válik a terméseredmények értékelése is – a mezőgazdasági letelest. Ehhez a tudományos dolgozók véleménye szerint szükséges, hogy mindenütt pontosan megállapítsák a talaj összetételét és kidolgozzák a műtrágyák szükséges adagolásának arányát. Ezeknek a méréseknek az elvégzésére az agrárművelő vállalatok minden nagyobb befektetés nélkül képesek, tehát elsősorban a mezőgazdaság dolgozóin múlik, hogyan közelítenek a felvetett problémákhoz.

(Szénási)

Túl sok a kálium


Új szempontok a műtrágyázásban

lápálékának alapelvei. Hiányuk csontlágyság, csontkiválasztás, izületi gyulladások okozhat, és manapság ezek a betegségek, az erre való hajlam már fiatal korban is sok esetben megfigyelhető. A káliumot és a magnéziumot a növényi lápokok, például a zöldség juttatják a szervezetbe, vagy a lej, de ha ezekből hiányzik, akkor természetesen más úton kellene és súlyosabb esetben kell pótolni. De az csak két elem. A talaj magasabb káliumszintje más mikroelemek felvételét is akadályozza, például a légszempontokat „törő” víz, vagy a már említett nitrátok lebontásához szükséges molibdén, mangán és cink felvételét. Ha ezek a mikroelemek ott vannak a szervezetben, akkor a nitrátokat ammóniákká bontják, és az távozik a szervezetből. Ha hiányoznak, akkor ez a szintézis nem megy végbe, csak nitrátok vagy egyéb nitrógen-származékok, például nitróaminok keletkeznek, s mivel ezek karcinogén anyagok, betegségeket idéznek elő. A talajban lévő kálium a cink felvételének blokkolásával a gazdasági átlak reprodukcióját is veszélyezteti. = MEGDÖLTÉSEZŐ ÉRTÉK (50)

Deformálja a sejteket

Mivel a kálium nem engedi meg, hogy a növény elegendő kalciumhoz és magnéziumhoz jusson, ezzel blokkolja a sejtelést, és emiatt növekszik a növények érzékenysége. A sejteket könnyen megdeformálják a mikroorganizmusok, egyéb kórokozók, s mivel a talaj sejtszerkezeti elősegíti a szabad aminosavak felvételét – így azok elszaporodnak, a növényeken betegségek jelennek meg.

Code: TuISokKalliumKarai



A burgonya keménységtartalma és a cukorrépa cukortartalma alakulása a talaj káliumtartalmának függvényében


Tegyük fel, hogy a kálium nem engedi meg, hogy a növény elegendő kalciumhoz és magnéziumhoz jusson, ezzel blokkolja a sejtelést, és emiatt növekszik a növények érzékenysége. A sejteket könnyen megdeformálják a mikroorganizmusok, egyéb kórokozók, s mivel a talaj sejtszerkezeti elősegíti a szabad aminosavak felvételét – így azok elszaporodnak, a növényeken betegségek jelennek meg.

MÉRÉSTUDOMÁNYI SZAKÉRTŐI MEGJEGYZÉS

A káliumműtrágyázás miközben gazdasági károkat, élelmisznövény minőség romlást okoz, mérgezővé teszi az anyagejtet, sejtdeformáló, rákbetegség okozó, sőt nemzőképesség rontó is!

Semmi szükség a káliumműtrágyákra ahol, mint Magyarországon 1-6% kötött kálium van a talajban, amiből automatikusan pótlódik a növények számára optimális, csupán 90 mg/kg mennyiségű vízben oldódó kálium!

Étkezésnél is irányadó a SALSOL infúziós oldat alkotóelemei élettanilag optimális (tiszta víz : tiszta konyhasó = 110) dózisaránya:



A gyógyításra alkalmazott SALSOL infúzióval minden liter tiszta víz mellé 9 grammnyi tiszta nátrium-klorid (NaCl) konyhasót pótolnak.

Iratjel: SALSOL-optimalis-desztillaltviz-konyhaso-arany-170413-SimonL

NYILATKOZAT

A Ringer oldat a testnedvekhez hasonló ionösszetételű folyadék. A Ringer oldat (0,9 % NaCl, 0,03% KCl, 0,025 % CaCl₂, 0,02 % NaHCO₃, 99 % desztillált víz) szerinti nátrium, kálium, klór és víz pótlási arány megfelelő kóros veszteségek esetén, de ugyancsak optimális a napi étkezések során is.

Budapest 2010. január 6.


Dr. Papp Lajos
ny.egyetemi tanár
akadémiai doktor

A Ringer-oldat, melynek összetétele a szív igényének legjobban megfelel:
0,9% NaCl,
0,03% KCl,
0,025% CaCl₂ és
0,02% NaHCO₃-ból áll.

AZ INFÚZÓS RINGER-OLDAT ALKOTÓELEMEI
Dr. Kiszely György és dr. Hársing László: Gyógyszerész továbbképzés Biológiai és élettan alapismeretek, 90. oldal. Medicina, 1958.

Íratkód: Ringer-oldat

EGYÉB BIZONYÍTÉKOK

A Népszabadság alábbi cikke arról szól, hogy a konyhasópótlás csökkentés és kálium túladagolás „magas vérnyomás ellen védő hatásai” elhitése hatásmérési adatok hamis átszámolásán és hamis statisztikai felmérések zavaros adatain alapuló „tudományos csaláson” alapul az USA-ban is. Ez a cikk, de több más cikk is úgy „leplezik le” a káliumtúladagolás és konyhasópótlás- csökkentés életveszélyes egészségkárosító hatását, hogy az áldozatok ne vegyék komolyan, ne hiessék el. Valószínűleg arra való, hogy a magyarok kipusztulása után bizonyítsák „milyen ostobák” voltunk!


A SÓNAK MANAPSÁG ROSSZ LETT AZ IMÁZSA. AZ ORVOSOK ÉS EGÉSZSÉGVÉDŐK ÓVA INTENÉK: AKI TÚL SOK SÓT FOGYASZT, MEGRÖVIDÍTI ÉLETÉT. ROSSZ HÍRNEVÉT A SÓ ANNAK KÖSZÖNHETI, HOGY MEGEMELI A VÉRNYOMÁST, CSÖKKENTI A VÁRHATÓ ÉLETTARTAMOT.

A „komisz” só

A magas vérnyomás megelőzésére sószegény étrendet ajánlanak. Elegendő lenne napi 0,5-1 gramm só, ennek azonban többszörösét fogyasztjuk. Pedig a só sokáig gyógyszernek számított. Vér-szegénység, erőtlenség, fejfájás és migrén orvoslására szolgált. Sós vizet adtak a légutak megbetegedésekor, emésztési panaszok, reuma-fájdalmak esetén. Gyerekkorunkból emlékezhetünk a forró sóval töltött zacskóra, amit a fülünkre tettek.

De mitől lett „komisz” a só? Az első tanulmányt Lewis Dahl írta, melyben kimutatta, hogy a patkányok vérnyomása emelkedik, ha erősen sózott éledelet kapnak. A kísérlethez használt só azonban annyi volt, hogy egy embernek naponta fél kilót kellene ennie, hogy ugyanakkora dózist vegyen magához. Egy másik kísérletben a világ minden részéről vizsgáltak embereket, az adatok feldolgozása meglepő eredményt hozott. A vérnyomás csökken, ha növekszik a sóbevitel. A legtöbb só fogyasztó népcsoportnak (napi 14 gramm) nem volt magasabb vérnyomása, mint azoknak, akik csak 6 grammot ettek. Négy csoport viszont teljesen kilógott a sorból: jóformán nem ettek sót, és a magas vérnyomást is alig ismerték. Amikor az ő értékeiket is hozzáadták a többiekéhez, csak akkor kapták meg az elvárt értéket. A tudósoknak több rendellenesség is feltűnt, ezért kérték az eredeti adatokat, de hiába. Ehelyett a szerzők újra feldolgozták azokat, új módszerekkel. Az eredmény: a só hatása a vérnyomásra negatívabb, mint gondolták valaha. Egy német kritikus „adatmasszírozásnak” hívja ezt a módszert.

Rehabilitáljake valaha vajon a só? Az amerikai Science szaklap nemrég szemrehányásokat tett a só elleni kampány



aktivistáinak. De a lapok tovább publikálják a sófogyasztás és vérnyomás közötti összefüggés eredményeit. Más tanulmányok is megmutatták, hogy a sószegény étrend nem csökkenti a vérnyomást. Azt is kimutatták, hogy a sóbevitel korlátozása növeli az elhalálozást, és elősegíti a szív- és keringési betegségeket. A vitát a jövő dönti el. Az viszont biztos, hogy a só mellőzése megemeli a koleszterinszintet, de változatlanul koleszterincsökkentő és sószegény táplálkozásra intenek minket. Ember legyen a talpán, aki felismeri, hogy épp mi problémájának okozója. Milyen tanácsot adhatunk a magas vérnyomásban szenvedőknek? Német orvosok szerint a népesség kétharmadánál a vérnyomás nem reagál a sóra. A maradék harmad egyik felénél emelt sófogyasztásnál csökken a vérnyomás, a másik felénél emelkedik. Akinek magas a vérnyomása, próbálja ki kevesebb sóval, hogy ő melyik csoport-hoz tartozik. Egyszóval, ne hagyjunk magunknak egyszerűen csak odaszógni.

Jelinek Mária

CSIPETNYI TRÜKK

A só tartósító hatása a vízkezelő tulajdonságában rejlik. Észak-Európa számos vidékén bevett eljárás volt az ősszel tömegesen vágott marha rendszeres sózása. Nálunk a sertés-húsdarabokat a szalonnával együtt sózták, füstölték.

A só megnöveli a víz forrási hőmérsékletét, a víz jobban felmelegszik, mielőtt forni kezdene. Ezért a sós vízben az élelmiszer (a tojás vagy a tészta) magasabb hőmérsékletre melegszik fel, és gyorsabban főhet.

Egy csipet sóval könnyebb felverni a tojásfehérjét. Az avas vaj ismét használható, ha kevés langyos tejjel és egy csipet sóval keverjük el. A veltő nem esik ki a csontból, ha főzés előtt mindkét végét besózzuk. A máj nem keményedik meg főzés közben, ha a még nyersen összevágott szeleteket besózzuk, majd fél órára a hűtőszekrénybe tesszük. Nem lesz csomós a rántás, ha csipetnyi sót teszünk bele. Egy késhegynyi só tisztítja a leégett lábast, eltünteti a zsírfoltot és a vörösbőr peccsétjét, kezünk-ről a hagyma és a hal szagát. Sós vízzel friss sörpecsétet, vizes sóval csokoládéfoltot távolíthatunk el.

A konyhasó nem egyéb, mint tengervízből nyert nátrium-klorid vagy bányászott kősó. A zöld só: zöldpetrezselyem, zeller zöldje, saláta, lestyán, csalán, pityang, útifülevél megszántva, porra törve, kevés sóval elkeverve. A jódozott só: pajzsmirigybetegség esetén használjuk.

A konyhasó, a tengeri só, az asztali só és egyéb elnevezésekkel forgalomban lévő sók káliumtartalma sokszor nagyobb a kívánatosnál. A túlzott káliumbevitel pedig felboríthatja a szervezet ionegyensúlyát, csökkenti a veseműködést, visszatartja a folyadékot, ezáltal megerősíti a problémákat okozhat. Megzavarja az idegrendszer és a szív működését, ritmuszavart kelt.

J. N. J.



MÉRÉSTUDOMÁNYI SZAKÉRTŐI MEGJEGYZÉS

A Népszabadság Magazin mellékletben 2002. november 13-án megjelent fenti cikke helyesen ismerteti a „Stop Só Nemzeti sócsökkentési program, Menzareformnak és Chips adó” egészségkárosító hatásait, de hitelteleníti a „magazin mellékletben” „vicces címekkel” megjelenítése.

A cikk alapján is felmerül a kérdés: ha a központi amerikai tudományos folyóirat Science szerint sokkal több lett a keringési- és szívbeteg az USA-ban amióta Lewish Dahl nagyságrendileg hamisan jelölte meg az emberre veszélyes konyhasó adagot, az USA-ban miért nem rendeltek el népirtási váddal büntetőeljárást. Továbbá ez kérdés is felmerül: miért tüntethetik fel a mai napig is egészségkárosító „túl soknak” az eddigi napi 15-25 gramm konyhasó dózist, annak ellenére, hogy egyértelműen bebizonyosodott, hogy Lewish Dahl patkánykísérleti eredményeit emberre korrektül (nem hamisan) átszámítva nem az eddigi napi 15-25 gramm konyhasó a „túl sok”, hanem csak a napi 500 grammnál több!

A cikk bonyolult fogalmazása miatt is nehéz észrevenni, hogy csak a kísérletben résztvevők **1/6**-nak csökkent a vérnyomása a korábbinál kevesebb konyhasó fogyasztás után (az is lehet, hogy mástól!), miközben a kísérletben résztvevők **5/6**-ának a vérnyomása vagy nem változott vagy megnőtt a konyhasó dózis csökkentés után.

Az is kérdés, hogy a cikk írói miért hallgatták el az 1950-ben Nobel díjat elnyert kutatók patkányokon és embereken végett (alább mellékel) konkrét konyhasó és kálium dózis variációs hatás mérési eredményeit, amelyek szerint patkányoknál és embereknél is magas vérnyomást idéz elő a kelleténél kevesebb konyhasó és/vagy kelleténél több kálium fogyasztás!

NOBEL-DÍJAS KUTATÓK MÉRÉSEI IS BIZONYÍTJÁK, HOGY SZÁMOS BETEGSÉG NAGYSÁGRENDI MEGSZAPORODÁSÁNAK A HAGYOMÁNYOS („FIZIOLÓGIÁS”) SÓZÁSSAL ELLENTÉTES ELVEKRE ALAPOZÓ „ÉTKEZÉSI SÓREFORM” A FŐ OKA

A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában, „A biológia aktuális problémái” főcím alatt található „A mellékvesekéreg biológiája” c. fejezet. Aki írta, az akadémiai nivódíjas Dr. Szabó Dezső azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek alapján Kendall, Reichstein és Hench 1950-ben Nobel-díjban részesültek „a mellékvesekéreg-hormonok és szerkezetük és biológiai hatásuk” felfedezéséért. Az összefoglalás jellegű leírás emellett további 61 tudományos publikáció mérési eredményeire is hivatkozik. (Az alábbiakban zárójelben jelzem, hogy a könyvből itt idézett megállapítások a könyv mely oldalain találhatók.)

EZEK A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK EGYBEHANGZÓAN BIZONYÍTJÁK AZT, HOGY A NÁTRIUMHIÁNYOS ÉS KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT EMBEREK ÉS PATKÁNYOK MELLÉKVESEKÉREG HORMONTERMELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A TUDOMÁNYOS KUTATÓK VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEKKEK RENDELKEZNEK (134), AMELYEK SZERINT A NÁTRIUMHIÁNYOS VAGY KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT ÁLLATOKON (PATKÁNYOKON) ÉS EMBEREKEN IS MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK BE, MIKÖZBEN A SZERVEZET ELETROLIT-HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)

Ezek későbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrövidítő, ivartalanító stb. hatások például konkrétan a következők:

1./ A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik (140)

2./ A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás alakul ki. (167)

3./ **A különböző stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)**

4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsősorban a vesesejtekénél, de a verejtékszejtekénél és az emésztőrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez ha hosszabb ideig tart, törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet:

5./ Idővel nátrium-hiány jön létre (168)

6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)

7./ Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168)

8./ **Romlik a keringés. (168)**

9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szűrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)

10./ **Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168)**

11./ A bőr és a nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)

12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)

13./ **Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is.** (169)

14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)

A káliumtúladagolás és vagy hiányos nátriumpótlás legvalószínűbb betegségei

15./ **Magas vérnyomás.** (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ **Izomgyengeség.** (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)

20./ **A vérbesűrűsödés miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést, renintermelő vesedaganatok jönnek létre.** (169)

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait is okozza („pszeudohermafroditizmus”):

21./ **Leánymagzatok nemi szerveinek a fejlődési zavarait,** pl. szeméremajkak összenövését, klitoris-megnagyobbodást. (169-170)

22./ Lánygyermeknél klitoris-megnagyobbodást, idő előtti menstruációt. (170)

23./ Felnőtt nőknél: klitoris-megnagyobbodás, test- és arcszőrösödés, kopaszodás, érdes hang, a menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)

24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erőteljes izomzat kifejlődést, a testnövekedés gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszőrzet idő előtti megjelenését, korai szakáll-növekedést, hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)

25./ **Pszeudohermafroditizmus** tünetként fiúgyermeknél és férfiaknál emlő-megnagyobbodást okoz. (170)

26./ **Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztatarák) növekedését serkenti.** (170)

Közismert, hogy egyesek ezeket a betegségeket mindenféle más okra vezetik vissza, miközben ezt a két legfőbb okot részint elhallgatják, részint ellenkező hatásúnak tüntetik fel. Az élettani optimum szerinti (fiziológiás mértékű) sópótlást, a vér elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelő étkezést „elavultnak” hazudják, pedig a fiziológiás sópótlás helyességét nem csak a tengervíz, a magzatvíz és a vér és a fiziológiás infúziós Ringer oldat azonos nátrium és kálium aránya igazolja, de az is, hogy kálium túlfogyasztás esetén torzul az EKG = romlik a szívműködés! (A könyvről általam készített fotókat, s a többi, fent említett mérési és tankönyvi dokumentumot is le lehet hívni, ki lehet nyomtatni az internetről, amihez a Google keresőbe a „mellékvesekéreg” szót kell beírni, ill. lásd: a www.aquanet.fw.hu honlapon.)



Mostanra kb. 100.000-rel lett kevesebb az éves népszaporulatunk a meddőséget is okozó, életet is rövidítő kálium sókkal "műtrágyáztatás" és "konyhasó pótlóztatás" megszervezése óta!

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani
szakértő /TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT/



HUNGARY, 2008. 02. 18.

Népartási váddal, az MTA elnök(ei) elleni feljelentésként az ORFK-nak megküldve!

Cc: EURÓPA BIZOTTSÁG, BRÜSSZEL

Verőce, 2017. május 2.

Tejfalussy András (1-420415-0215) mérnök,
volt országgyűlési és önkormányzati szakértő
Magyarország, 2621 Verőce, Lugosi u. 71.
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
www.tejfalussy.com, + 36 20 218 1408



feladó: **András Tejfalussy** <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
Ügyelet ORFK <ugyelet.orfk@orfk.police.hu>;
guzsvann@budapest.police.hu;
info@orszaggyules.hu;
címzett: Orbán Viktor <orbanviktor@orbanviktor.hu>;
Kövér László <laszlo.kover@fidesz.hu>;
webmaster@parlament.hu
másolatot kap: SANTE-CHAP@ec.europa.eu;
Elnok@kuria.birosag.hu
titkos másolat:
 dátum: 2017. május 2. 13:09
 tárgy: MTA-BŰNÖZÉS: MÉRGEZTETÉSI CSALÁS SZERVEZŐ TUDOMÁNYOS AKADÉMIA? JOGOS
VÉDELEM, MEGBÍZÁS NÉLKÜLI KÁRELHÁRÍTÁS Kód: mtabunozes170502
küldő: gmail.com