

TERRORIZMUS ELHÁRÍTÁSI TÁJÉKOZTATÁS RÉTVÁRI BENCE ÁLLAMTITKÁR RÉSZÉRE

Államtitkár Úr! Miután a Nemzeti Stop Só programjuk és a konyhasóval sózás helyett kálisóval sózás megengedése fajirtás, feljelentem, követelve a patkányméreg kálisó étkezési só helyett használatának kieszelői, végrehajtói és nyomeltüntetői elleni büntetőeljárás hivatalból elrendelését és a „Ringer dózisok szerinti” optimális étkezési víz-, konyhasó- és kálium pótlás azonnali, országos helyreállítását!

1. A vérszérumban 110 a víz:konyhasó arány és 30 a nátrium:kálium arány, ami optimális a szívnek. Ugyanilyen a dózisarány a gyógyításra több száz év óta alkalmazott fiziológiás infúziós oldatokban is. Pl. a napi **3 liter Ringer oldat, desztillált vízzel 27 gramm konyhasót, de csak 0,36 gramm káliumot juttat be a vérbe.** A Salsol és Salsola is ennyi konyhasót juttat be ennyi vízzel desztillált vízzel, de káliummentesen. Vessük össze ezzel: az ÁNTSZ a konyhasóhiányos vizet egészségjavítóként (lásd Preventa), a konyhasóval párhuzamosan fogyasztott desztillált ivóvizet pedig ”életveszélyes vízmérgezést előidézőnek” beszéli be!!!!

2. Ezeknek a természetes (vér elektrolit) komponens arányoknak az elrontása csak káros lehet. Önök napi akármennyi vízhez a legfeljebb 5 gramm konyhasó (amiben 2 gramm nátrium van) és legalább 4,7 gramm kálium (akármilyen gyors) pótlását, vagyis 30 helyett a 0,43 nátrium:kálium dózisarányt beszélnek be egészségvédelemként. Közben elhallgatják, hogy 24-szer veszélyesebb a túladagolt kálium 1 óra alatt bejuttatva, mint 24 órára egyenletesen elosztva szájon át vagy infúzióval bejuttatva. Az Önök Élelmiszer törvénye, Étkezési sószabványa, Nemzeti Stop Só Programja, Chips adója, Menzareformja konyhasópótlás csökkentési és káliumtúladagolási előírásai fajirtási célt szolgálnak.

3. Amikor az ügyet megbízott országgyűlési szakértőként vizsgáltam 1990-92. között, az OÉTI átadott egy publikációt, amiben a WHO a konyhasó 100%-os helyettesítésére is ajánlja a kálisót a gyermek étkeztetésben. Az OÉTI-sek ezzel próbálták elterelni a figyelmemet a kísérleti eredmény meghamisításukról.

4. A tiszta kálisó (Redi só) étkezési sóként kipróbálásánál az OÉTI által végeztetett klinikai hatás-mérés során, a 0,88 gramm káliumot (2 gramm kálisót) tartalmazó fél liter (desztillált) víz megivásától mindegyik felnőttnek több órán keresztül felére csökkent a vizelet kiválasztása. A kétszerennyi káliumtól (4 gramm kálisótól) meg, kb. másfél órára, szívmérgezőre növekedett a vérszéruma káliumtartalma, lásd melléklet-1.

5. Az ÁNTSZ-esek is szembehazudják a fenti kísérlet eredményeit. Napi 10 gramm kálisó fogyasztását ajánlják. Miniszterként Surján László azt írta nekem, hogy „egészségesekre veszélytelen a napi 133 grammnál kevesebb kálisót, 70 grammnál kevesebb káliumot fogyasztás”. Ezt írta az OÉTI-s Bíró György is, tőle származhat a hamis határértékezés. A „napi kálium mennyiség” előírása is csalás. Az 1 órán belül bejuttatott 1 vagy 2 grammnál több kálium mindenkinél vese és szívmérgező, s a 24 óra alatt szájon át lassan bejutó 2,2 vagy 3,5 grammnál több kálium is mindenkinél torzítja az EKG-t a tankönyvek szerint!

6. A MEDICINA ORVOSI KÖNYVKIADÓ IS KÖZZÉTETTE: 1950-BEN NOBEL DÍJAT KAPTAK KUTATÓK, AKIK PATKÁNYOKON ÉS EMBEREKEN VÉGZETT NÁTRIUM ÉS KÁLIUM DÓZIS HATÁS MÉRÉSEIKKEL KÉTSÉGGKIZÁRÓ MÓDON BIZONYÍTOTTÁK A KONYHASÓ-HIÁNYOS ÉS KÁLIUMTÚLADAGOLÓ ÉTKEZÉSRE FELBIZTATÁS, KÉNYSZERÍTÉS BETEGÍTŐ, ÉLETRÖVIDÍTŐ, IVARTALANÍTÓ, VAGYIS FAJIRTÓ HATÁSÁT, Lásd melléklet-2.

7. Az Önök ivóvíz- és sózás rontásos fajirtási módszere nem új, le van írva a Bibliában és a Talmudban. Lásd 2 Mózes 23/20-33., 5 Mózes 7/1-26., és Talmud Taanith 10 a. lap, Talmud Baba kamma 93 b. lap.

Melléklet-1: A KÉMIA TANÍTÁSA: Szervezetünk kálisó-háztartása, avagy „ingatlankiürítő neutronbomba” helyett „neuronbomba”? (Mozaik Oktatási Stúdió, V. Évfolyam 1997. január, 11-13. oldal).

Melléklet-2: BIOTERRORIZMUS, BIOKÉMIKUSOK A SEJTMEMBRÁNOK ELLEN (Tanulmány).

Iratjel: biokemikusokasejtmembranokellen160126

Melléklet-3: Mások is leleplezték az Önök által alapul vett hamis halálozási-ok-statisztikákat (A komisz só).

Melléklet-4: Közérdekű bejelentés a magyarországi maffiaállammal szemben további bizonyítékként Dr. Darák Péter Kúria legfelsőbb bíróság elnökhöz... Iratjel: EmailKonyv97-maffiaaallam-52.-oldal.



Fürstné dr.Kólyi Erzsébet → Tejfalussy (Sydo) András

Szervezetünk kálisó-háztartása avagy „ingatlankiürítő neutronbomba” helyett „neuronbomba”?

Napjainkban újból egyre több szó esik szervezetünk egészségi állapotáról, a talaj szennyező és hasznos anyagairól, az élelmiszerek életfenntartó és károsító szerepéről. A Fekurádió szeptember 18-i adásában, valamint a televízió Napközben adásában egyaránt szólt a fémionok szerepéről, így a káliumionokról is.

Egészségünk és környezetünk élővilágának védelmében nem árt ha tudjuk, hogy hazánkban minden várakozáson alul alku az átlagos életkorszak, miközben folytonosan a „betegség-megelőzésre” tett intézkedéseket hangsúlyozzák. Kérdés, hogy helyesek voltak-e ezek az intézkedések, vagy talán éppen ellenkezőleg? Példaként az egyik hazai intézkedést, az átlagos káliumion-bevitelt elemezzük, a „közvetett közegészségügyi célkitűzések”, valamint az azok alapjául szolgáló klinikai mérési eredmények TÉNYSZERŰ szembesítésével.

A hivatalos célkitűzések és intézkedések

Az átlagos káliumbevitel világszerte napi 2-8 gramm között mozog. Magyarországon ez az ajánlás 3-3,5 gramm. „Egyes közlemények szerint egy 70 kg testtömegű ember 70 gramm káliumot, vagy ennek megfelelő 133 gramm kálium-kloridot fogyaszthat el egy nap, mérgezés veszélye nélkül, mert ennyi káliumot a kóma és gyorsan eltávolító vizelethivatalozatkor a veséje”. Az International Life Sciences Institute, European Branch 1990-ben közzétett állásfoglalása szerint az ajánlott káliumbevitel-

nek célszerűen azonosnak kell lennie a ténylegesen elfogyasztott nátriumbevitellel, szerintük az ajánlott nátriumbevitel 2-3 gramm/nap és ehhez a káliumbevitel 3,9 gramm/nap, illetve az Országos Élelmezési- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) szerint a nátrium-kálium beviteli aránya akkor kedvező, „ha a hányados egy nőt van” és javasolja a lakosságunk, hogy „káliumgazdag” táplálékot fogyasszon, „a magasvérnyomás-betegség megelőzése érdekében”. Ehhez kétféle káliumos sóot hozatott forgalomba: a REDI-sót, amelynek az összetétele:

kálium-klorid 55 %,
kálium-citrát 43 %,
magnézium-glutamat 2 %.

azaz 1 gramm ilyen só elfogyasztása 0,443 g káliumion bevitelét jelent. Ezt a készítményt az OÉTI 1983-ban „gyógytápszerként” törzskönyveztte, Törzskönyvi száma: 20. A feliratai szerint „6-10 grammig gyógytápszerként hat”. A másik káliumsó 100 grammonként 24 gramm nátriumiont és 25 gramm káliumiont tartalmaz.

A növényeket kálisóval is „trágyáztatják” a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Növényvédelmi és Agrokémiai Központja javaslatára alapján. Emiatt a zöld élelmiszernövények káliumtartalma a csak a talaj által szolgáltatott káliummal táplálkozásunkhoz képest 4-5-szörösére nő.


A hivatalos álláspont szerint „a kálium fogyasztását ehhez képest nem korlátozni, hanem tovább növelni célszerű” a jelenlegi hivatalos OÉTI-s és népjóléti minisztériumi (miniszteri) álláspont szerint [1].

A KÉMIA TANÍTÁSA


1997. január

A klinikai mérések

Az OÉTI-től kikértük a REDI-só klinikai kísérleti dokumentációját (állampolgári jogon). A szérumban káliumszintje 10 egészséges emberből 10-nél meghaladta az 5 mval/litert, kb. 1 órán át, ha 4 gramm REDI-só oldatát itatták velük [2].




1. ábra
Vér-Szérumban káliumszint-változások „REDI-só”
terhelés ideje alatt
(A Pécsi Orvostudományi Egyetem 1. Számú
Belklinikai mérése: 4111/84. OÉTI [2])



2. ábra
Vizeletkiválasztás a „REDI-só”-terhelések
ideje alatt.
A vizelet kiválasztása a REDI-só hőfönbőző dő-
zisainak alkalmazása után egészséges
felnőtteken [4].

Ez a szérumban káliumszint már általános káliumos vérmérgezést jelent, amely általános izomgyengeséget, mozgáskoordinációs zavarokat okoz, hallucinogén hatása és valamennyi sejtnél durván megzavarja az anyagcseréjét. Pl. eltorzítja a szívösszehúzódásért felelős impulzust, s ez 7–10 mval/liters szint felett halált (szívmegállást) is okoz. A káliumszint növekedésével az EKG-impulzusok növekvő torzulást a mellékelt tankönyvi diagram mutatja [3].

A mérgezés oka, hogy ha 1–2 grammnál több a (fél liter) megivott víz káliumtartalma, a veseműködés (10 egészséges emberből minimális eltéréssel 10-nél!) felére romlik, és vízvisszatartás is bekövetkezik miatt [4].



3. ábra
A kálium/mmol/literérték változása
és az EKG [3]

1997. január

A KÉMIA TANÍTÁSA

Amikor a klinikán (egészséges emberek) „tablettában ettek” kálisót (kálium-klorátumot, K-R tablettát), kb. 2,56 grammot, ami kb. 8 óra alatti szívódott fel, 6 emberből 5-nek voltak töle gyomorfájdalmak, egyenél pedig gyomorgyálfajlírta-eróziót diagnosztizáltak (1983-ban, a KÁLIUM-R tablettá hatásainak a klinikai vizsgálatánál) [5].

A vesék útján káliumtúladagolás nélkül kb. napi 45 mmol távozik, azaz mintegy 0,7 gramm, ami a felszívódási veszteség (5-10 %) figyelembevételével is 0,8 grammal pótolható [2].

Egyéb hazai klinikai vizsgálatok alapján sem volt a káliumtúladagolás „vényomás-csökkenő” hatása igazolható, de amikor napi 2-4 gramm REDI-sót evett négy (enyhén) veseköves beteg, belőlük három a kezelés 3-6. napja között súlyos káliummérgezést (extrem hyperkalemiát) szenvedett (1984) [6].

A szokásos vegyes táplálékkal mindig káliumion-többletbevitel történik a tényleges veszteséghez képest, még akkor is, ha nem „trágyáznak” kálisóval, illetve nem „sózak” kálisóval.

A különböző műtrágyák kombinációjánál – az alapos hatásellenőrző méréseink szerint – a kálisó megmérgezi a növényeket és emiatt 5-10-szeres nitrogén-, foszfor- és növényvédőszer felhasználás „szükséges” ugyanannyi növényi termék előállításánál, mint a kálisó nélküli helyes trágyázásnál, amely a talaj kötött káliumkészletét (2-3 %) hasznosítja! Ezért pl. az USA kb. tízedannyi fajlagos műtrágya-felhasználással állította elő a burgonyát, mint Magyarország (1976-85-ben). [7] és a kínai, a török, arab, illetve a perzsa területeken szinte egyál-

talán nem használnak kálisót talajtrágyaként („műtrágyaként”). Ezek a mérések azt tanúsítják, hogy „túl van adagolva a kálium!”

Új tankönyveinkben – a NAT közös követelményei (környezetvédelem) is figyelembevéve – a kálium hasznossága mellett veszélyeire is fel kell hívniuk tanítványaink figyelmét, különösen a közkezdült Coca-Cola túladagolt káliumion-mennyiségére és túlzott fogyasztásának veszélyeire. Az iszított, rosszul ivó querekek „ideges” viselkedésére figyeljünk oda, mert túl sok kólát fogyasztanak. [8]

Irodalom

- [1] Dr. Surján László miniszter 34/93. sz. 1993. febr. 19-i „Állásfoglaló levele”.
- [2] [4] és [6] Országos Élelmezési és Táplálkozástudományi Intézet (REANAL) REDI-só engedélyezési dokumentáció, old. 411/84.
- [3] Varga, P. és Isi.: Az intenzív betegápolás elméletje és gyakorlata. Medicina, Budapest, 1977. 191-193. old.
- [5] „Kálium R tablettá, klinikai összefoglaló jelentés”. Pécsi Orvostudományi Egyetem, 1983.
- [7] Nemzetközi Statisztika. KSH, 1989.
- [8] Bíró György: Tápanyag táblázatok. Medicina, Bp., 1988. 227. old.
- [9] Dr. Mózsik Gyula: Klinikai-táplálkozástudományi és dietetika vizsgálatok „Redi-sóval”. Pécsi Orvostudományi Egyetem 1. Sz. Belgyógyászati Klinika 1985.



BIOTERRORIZMUS, BIOKÉMIKUSOK A SEJTMEMBRÁNOK ELLEN (Néptárs a kálisóval is szószas „menzareform”, „sómenetelés” kell!)

MINDEN emberi sejtet membrán, sejthártya vesz körül. Ezen át történik az anyagcsere és az információ csere, vagyis a sejtben belüli (intracelluláris) tér és a sejtben kívüli (extracelluláris) térrészek kapcsolattartása, „elektronikus kommunikációja”.

Elsődleges fontosságú, hogy a sejtmembrán mindig jól működjék. A sejtmembrán elektromosan vezető nátrium ionjai és kálium ionjai mindenkori arányától függ, ezáltal vezérlődik, hogy hol, mikor, miből, mennyi juthat be a sejtbe, s hogy onnan hol, mikor, miből mennyi jöhet ki. Ezt a sejtben belülről és kívülről is vezérelt „kapuzó rendszert” a kutatók „nátrium-kálium-pumpának” nevezték el. Belülről a sejt működését optimalizáló sejtszervek, kívülről a körülvevő testfolyadék által közvetített ingerek vezérlik. Az ingervezetést a sejt körüli áramvezető folyadék biztosítja, amit testelektrolitnak, **vételektrolitnak** is neveznek, s a vérben, a vérszérumban is megtalálható. **Ennek az elektrolitnak csak négy anyaga van:**

A H₂O víz, a nátriumion, a káliumion és a kloridion. Ezek aránya az élő egészséges emberben pontosan meghatározott. **Megfelel a gyógyításra már több száz év óta sikeresen használt infúziós fiziológiás Ringer oldat víz-, konyhasó- és kálium dózis arányainak:** 1 liter Ringer oldatban, 1 liter tiszta **desztillált** vízben feloldva, 9 gramm nátrium-klorid (NaCl) konyhasó és 0,3 gramm kálium-klorid (KCl kálisó) van, s ez közvetlenül bejuttatható a vérbe.

Vagyis 110 az élettanilag optimális víz:konyhasó arány, és 30 az élettanilag optimális nátrium:kálium arány. Ezen anyagok vérszérumban lévő, ennek megfelelő optimális arányát a felszívódás és a kiválasztás szabályozásával biztosítja az egészséges emberi szervezet. Hormonok segítségével (is) úgy szabályozza a vérszérum víz-, nátriumion-, káliumion és kloridion arányait, hogy ezek mindenkor optimálisak legyenek. **Olyan ember nem lehet egészséges, akinek a vérszérumában durván megváltoznak ezek az arányok (bármelyik).**

Ha túl kevés vagy túl sok a víz, ha túl kevés vagy túl sok a nátriumion, ha túl kevés vagy túl sok a káliumion, ha túl kevés vagy túl sok a kloridion, s ezek bármilyen kombinációja is, egészség károsító. **Hogy ezek mennyire károsítják az egészséget, az aránytorzulások mértékétől és időtartamától is függ.**

A „**Menzareform**” pl. „napi max. 2 gramm nátrium és min. 4,7 gramm kálium pótlást” ír elő, ami **tudatos megbetegítés** a Nobel díjat kapott kutatók (egyik fizikus kollégámnál megtalált) hatásmérései szerint. **1950-ben kitüntették őket Nobel-díjjal** (Kendall, Reichstein, Hench), „a mellékvesekéreg-hormonok és szerkezetük és biológiai hatásuk” felfedezéséért. **Miután patkányokon és embereken kísérleteztek, a hatásmérések eredményeiből megállapították, hogy az étkezési káliumtúladagolás, s hiányos nátriumpótlás is elrontja az állat és ember stressz elleni védekezőképességét, életrövidítő és ivartalanító, vagyis fajirtó hatású!**

A magyarok fokozott veszélyben vannak, ha a káliumtúladagolással és vagy nátriumhiánnyal lerontják a stressz elleni védekezőképességüket, mert részleges tisztítás után az ivóvízbázis folyókba vezetik a vírusos szennyvizet, ahová ipari és mezőgazdasági vegyszerek is bejutnak!

Az Orvosi Könyvkiadó **MEDICINA** által 1976-ban kiadott „**Technika a biológiában 8, A biológia aktuális problémái**” c. könyv „**A mellékvesekéreg biológiája**” c. fejezetéből, amit az akadémiai díjazás Dr. Szabó Dezső szerkesztett, aki a Nobel-díjasok mérési eredményei kapcsán további 62 tudományos közleményre is hivatkozik, **idézem a Menzareform tervezett várható eredményeit**, zárójelben jelezve, hogy melyik „eredménye”, melyik oldalon található:

„ A MELLÉKVESEKÉREG HORMONTERMELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A TUDOMÁNYOS KUTATÓK VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEKKEZ RENDELKEZNEK (134). NÁTRIUM-HIÁNYOS VAGY KÁLIUMTÚLADAGOLÓ DIÉTÁN TARTOTT ÁLLATOKON (PATKÁNYOKON) ÉS EMBEREKEN IS MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK BE, MIKÖZBEN A SZERVEZET ELEKTROLIT-HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK (168):

A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik (140)

A különböző stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik (167).

A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás alakul ki (167).

Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsősorban a vesesejtekénél, de a verejtéksjtekénél és az emésztőrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez ha hosszabb ideig tart, törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet:

Idővel nátrium-hiány jön létre (168).

A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe (168).

Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168).

Romlik a keringés (168).

A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szűrési (méregtelenítési) teljesítménye (168).

Idővel elégtelenné válik a veseműködés (168).

A bőr és a nyálkahártyák kóros elváltozásai (168).

Mellékvesekéreg-károsodás (168).

Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is (169).

Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki (168)."

T o v á b b i k ó r t ű n e t e k :

„ Magas vérnyomás (169), (étkezési konyhasópótlás csökkentéstől és vagy káliumbevitel növeléstől!!!!!!)

Szívélváltozások (169).

Veseelváltozások (169).

Izomgyengeség (169).

Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés (169).

A vérbesűrűsödés miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést, renintermelő vesedaganatok jönnek létre (169),

Leánymagzatok nemi szervei fejlődési zavarai, pl. szeméremajkak összenövése, klitoriszmegnagyobbodás (169-170).

Lánygyermeknél klitoriszmegnagyobbodás, idő előtti mentstruáció (170).

Felnőtt nőknél: klitoriszmegnagyobbodás, test- és arcszőrösödés, kopaszodás, érdes hang, a menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása (170).

Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodás, korábbi erőteljes izomzat kifejlődés, testnövekedés gyorsulás, a hónalj- és a szeméremszőrzet idő előtti megjelenése, korai szakáll-növekedés, hangmélyülés, hajritkulás (170).

Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermekeknél és férfiaknál emlő-megnagyobbodás (170). Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztatarák) kialakulása és gyorsabb növekedése 170). "

Budapest, 2016. január 26.

A magyarok közérdekű jogos védelemként (BTK), a bűnüldöző szervek helyett is végzett megbízás nélküli kárelhárítási ügyvitel (PTK) keretében, valamennyi magyar önvédelemre felbízattatásához, változatlan szöveggel mindenhol terjesztéshez, felelősséggel közzéteszi: (nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215, an.: Bartha Edit) okl. vill.mérnök, mérésstudományi szakértő, www.tejfalussy.com, magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com, +36 20 218 1408.

UTÓIRAT:

A BIOTERRORIZMUS MENZAREFORM LÉNYEGE: KÁLIUMMŰTRÁGYÁZÁSSAL ÉS KÁLISÓVAL „SÓZÁSSAL” MÉRGEZŐRE NÖVELT KÁLIUMTARTALMÚ ÉTELEKKEL ÉS ITALOKKAL MÉRGEZNEK, IVARTALANÍTANAK (A GYORSÍTOTT KÁLIUMBÉVITEL FOKOZOTTAN MÉRGEZŐ!), MIKÖZBEN IJESZTEGETNEK (AZ ÁNTSZ-ESEK) A MÉRGEZŐEN TÚLADAGOLT KÁLIUM ELLEN VÉDŐ TISZTA DESZTILLÁLTVÍZ, TISZTA KONYHASÓ, SAVANYÚ ÉS CUKROS ÉTELEK „MÉRGEZŐSÉGÉVEL”. **EZEK TUDATOSAN HALÁLÁBORRÁ TETTÉK MAGYARORSZÁGOT A MAGYAROK SZÁMÁRA!!!!**

NOBEL DÍJAS KUTATÓK MÉRÉSEIVEL IGAZOLT FAJIRTÁSI MÓDSZER A „MENZAREFOM”. A MAGYAROK ÉLETE LERÖVIDÍTÉSÉRE ÉS TERMÉSZETES SZAPORODÓ KÉPESSÉGE NÉHÁNY NEMZEDÉKVÁLTÁS IDEJE ALATT LENULLÁZÁSRA HASZNÁLJÁK. HA NEM LESZ UTÓDUNK, MAGYARORSZÁG INGYEN IS A HELYÜNKRE MIGRÁLÓKÉ LESZ!!!!!! **MI EZEK ELLEN A MEGVALÓSÍTHATÓ VÉDEKEZÉS?** CSAK A DESZTILLÁLT IVÓVÍZ + A RINGER-OLDAT SZERINTI (ADAGOLÁSÚ) ÉTKEZÉSI VÍZ, KONYHASÓ- ÉS KÁLIUM FOGYASZTÁS, LÁSD DR. PAPP LAJOS NY. EGYETEMI TANÁR AKADÉMIAI DOKTOR SZÍVSEBÉSZ ÍRÁSOS SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYÉT, ÉS SZÓBELI MAGYARÁZATÁT! YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=TvDYzBr0I4M>

NYILATKOZAT

A Ringer oldat a testnedvekhez hasonló ionösszetételű folyadék. A Ringer oldat (0,9 % NaCl, 0,03% KCl, 0,025 % CaCl₂, 0,02 % NaHCO₃, 99 % desztillált víz) szerinti nátrium, kálium, klór és víz pótlási arány megfelelő kóros veszteségek esetén, de ugyancsak optimális a napi étkezések során is.

Budapest 2010. január 6.


Dr. Papp Lajos
ny.egyetemi tanár
akadémiai doktor

SZEMÉLYES VÉDEKEZÉSEDHEZ AJÁNLOTT ESZKÖZÖK: LÁSD A WWW.TISZTASO.HU ÉS A WWW.TEJFALUSSY.COM HONLAPON, EZ UTÓBBI HONLAPRÓL SZÁMOS VIDEÓ, EMAIL-KÖNYV, KÁRELHÁRÍTÓ INTÉZEDÉS (MEHNMAM) ÉS A BIOTERRORISTÁKAT LELEPLEZŐ TUDOMÁNYOS MÉRÉSEINKET ISMERTETŐ „KORÁBBI HONLAPOK” IS LETÖLTHETŐK! **TERJESSZÉTEK!!!!!!!!**



Közzétéve a www.tejfalussy.com honlapon, a www.tisztaso.hu honlapon, a Facebook-on és a YouTube-on


A „komisz” só

A fiziológus napi szükséglet valójában 15-25 gramm, lásd a fiziológiás (pl. Salsola vagy Ringer) infúziós oldatokkal beadagolt napi konyhasó mennyiségét!

A magas vérnyomás megelőzésére sószegény étrendet ajánlanak. Elegendő lenne napi 0,5-1 gramm só, ennek azonban többszörösét fogyasztjuk. Pedig a só sokáig gyógyszernek számított. Vér-szegénység, erőtlenség, fejfájás és migrén orvoslására szolgált. Sós vizet adtak a légutak megbetegedésekor, emésztési panaszok, reuma-fájdalmak esetén. Gyerekkorunkból emlékezhetünk a forró sóval töltött zacskóra, amit a fülünkbe tettek.

De mitől lett „komisz” a só? Az első tanulmányt Lewis Dahl írta, melyben kimutatta, hogy a patkányok vérnyomása emelkedik, ha erősen sózott edelt kapnak. A kísérlethez használt só azonban annyi volt, hogy egy embernek naponta fél kilót kellene ennie, hogy ugyanakkora dózist vegyen magához. Egy másik kísérletben a világ minden részéről vizsgáltak embereket, az adatok feldolgozása meglepő eredményt hozott. A vérnyomás csökken, ha növekszik a sóbevitel. A legtöbb só fogyasztó népcsoportnak (napi 14 gramm) nem volt magasabb vérnyomása, mint azoknak, akik csak 6 grammot ettek. Négy csoport viszont teljesen kilógott a sorból: jóformán nem ettek sót, és a magas vérnyomást is alig ismerték. Amikor az ő értékeiket is hozzáadták a többiekéhez, csak akkor kapták meg az elvárt értéket. A tudósoknak több rendellenesség is feltűnt, ezért kérték az eredeti adatokat, de hiába. Ehelyett a szerzők újra feldolgozták azokat, új módszerekkel. Az eredmény: a só hatása a vérnyomásra negatívabb, mint gondolták valaha. Egy német kritikus „adatmasszírozásnak” hívja ezt a módszert.

Rehabilitálják-e valaha vajon a sót? Az amerikai Science szaklap nemrég szemrehányásokat tett a só elleni kampány



Amerikában is leplezték, hogy nem ún. „összeesküvés-elmélet” az élelmiszerek eltorzított sóarányaival élettróvidítés, hanem tudományos (kalibráláló mérési) csalásokkal is fedezett tudatos népiirtás! (Mózes II. 23. 20-33. és V. 7. 2. 22. szerinti nemzsidótlantás!)

aktivistáinak. De a lapok tovább publikálják a sófogyasztás és vérnyomás közötti összefüggés credményeit. Más tanulmányok is megmutatták, hogy a sószegény étrend nem csökkenti a vérnyomást. Azt is kimutatták, hogy a sóbevitel korlátozása növeli az elhalálozást, és elősegíti a szív- és keringési betegségeket. A vitát a jövő dönti el. Az viszont biztos, hogy a só mellőzése megemeli a koleszterinszintet, de változatlanul koleszterincsökkentő és sószegény táplálkozásra intenek minket. Ember legyen a talpán, aki felismeri, hogy épp mi problémájának okozója. Milyen tanácsot adhatunk a magas vérnyomásban szenvedőknek? Német orvosok szerint a népesség kétharmadánál a vérnyomás nem reagál a sóra. A maradék harmad egyik felénél emelt sófogyasztásnál csökken a vérnyomás, a másik felénél emelkedik. Akinek magas a vérnyomása, próbálja ki kevesebb sóval, hogy ő melyik csoport-hoz tartozik. Egyszerűen, ne hagyjunk magunknak egyszerűen csak odaszólni.

Jelinek Mária

ÉLETTRÓVIDÍTÓ A TÚL KEVÉS KONYHASÓ, DE A TÚL SOK KÁLIUM EVÉS BEBESZÉLÉSIS!
(Népszabadság 2002. 11. 15.)

CSIPETNYI TRÜKK

A só tartósító hatása a vízelvonó tulajdonságában rejlik. Észak Európa számos vidékén bevett eljárás volt az ősszel tömegesen vágott marha rendszeres sózása. Nálunk a sertés-húsdarabokat a szalonnával együtt sózták, füstölték.

A só megnöveli a víz forrási hőmérsékletét, a víz jobban felmelegszik, mielőtt forni kezdene. Ezért a sós vízben az élelmiszer (a tojás vagy a tészta) magasabb hőmérsékletre melegszik fel, és gyorsabban főhet.

Egy csipet sóval könnyebb felverni a tojásfehérjét. Az avas vaj ismét használható, ha kevés langyos tejjel és egy csipet sóval keverjük el. A vőző nem esik ki a csontból, ha főzés előtt mindkét végét besózzuk. A máj nem keményedik meg főzés közben, ha a még nyersen összevágott szeleteket besózzuk, majd fél órára a hűtőszekrénybe tesszük. Nem lesz csomós a rántás, ha csipetnyi sót teszünk bele. Egy késhegynyi só tisztítja a leégett lábast, eltünteti a zsírfoltot és a vörösbőr pecsétjét, kezünk-ről a hagyma és a hal szagát. Sós vízzel friss sörpecsétet, vizes sóval csokoládéfoltot távolíthatunk el.

A konyhasó nem egyéb, mint tengervízből nyert nátrium-klorid vagy bányászott kősó. A zöld só: zöldpetrezselyem, zeller zöldje, saláta, lestyán, csalán, pitypang, útifülevél megszáritva, porrá törve, kevés sóval elkeverve. A jódozott sót pajzsmirigybetegség esetén használjuk.

A konyhasó, a tengeri só, az asztali só és egyéb elnevezésekkel forgalomban lévő sók káliumtartalma sokszor nagyobb a kívánatosnál. A túlzott káliumbevitel pedig felboríthatja a szervezet ionegyensúlyát, csökkenti a veseműködést, visszatartja a folyadékot, ezáltal megrege-tenítési problémákat okozhat. Megzavarja az idegrendszer és a szív működését, ritmuszavart kelt.

J. N. J.

Kapja: A Nemzeti Nyomozó Iroda (fax: 443-5573, 426-9278)

Feljelentem a fent leírt élettróvidítő, vagyis NÉPIRTÓ sóhasználati és kalibrálási csalást!

A bizonyítékokat lásd az interneten, a www.AQUANET.fw.hu honlapon.

Budapest, 2006. jan. 13. Tejfalussy András (1036 Bp., Lajos u. 115.)

Az EmailKönyv97-maffiaaallam-52.-oldal másolata:

Közérdekű bejelentés a magyarországi maffiaállammal szemben további bizonyítékként Dr. Darák Péter Kúria legfelsőbb bíróság elnökhöz


A mezőgazdasági miniszter által, a belügyminiszter az ügyészségi vezetők segítségével ellenem szervezett, orvosi, jegyzői stb. csalásokra alapozó „gondnokság alá helyezettési” perbeli tárgyalás előtt engem összeverető Kautzné Schneider Margit Erika váci bíró és az összeverető rendőrök elleni közérdekű bejelentést szembehazudták a Göncz Árpád által készítettett X-398/1998. ikt. számú hamis köztársasági elnöki válasszal. Az érvényben tartásával Göncz Árpád és utódai, Áder János is, állandóan rontják a tudományos szakértői tekintélyemet és feltalálói szerzői jog érvényesítési lehetőségeimet, folytatólagos rágalmazást, becsületsértést folytatnak. Közben megváltoztatták – a jogosítvány hosszabbításom alkalmával derült ki - a Belügyminisztérium adatnyilvántartójában a személyi számomat. A személyi számom ugyanis bizonyította, hogy nem lehetek gondnokság alá helyezve, miután folyamatos a választójogom. A maffiaállami csalást azzal folytatták, hogy Göncz Árpádék közérdekű bejelentés elutasító hazug levelét és ezzel az összeveretést is, Pataki Árpád fővárosi bíró jogosnak nyilvánította. Egyéb **maffiaállami** bűncselekmények: az OTP-sek a veretés idején leloptak az általam kezelt számláról félmillió Ft-ot, s ezt az I-XII. Ker. Ügyészség vezetője hamis irata 1998 óta fedezi. A miniszteri kitüntetéses, kutatásgyorsító nemzetközi méréstudományi szabadalmaim szerzőinek tüntetve fel magukat, Roska Tamás és Furka Árpád akadémikusok Nobel-díjra is pályáztak. A közgazdász feleségemnek súlyos balesetet okoztak (1992. november 19.), majd eltüntették a rendőrségi helyszínelési jegyzőkönyvet, ezzel akadályozva meg a baleset okozói elítélését. Autóbalesetet is okoztak. Megpróbáltak leszorítani az útról. A helyszínelő rendőrök hamis helyszínrajza fedezte a balesetokozót. Mindezek további hiteles bizonyítékai is megtalálhatók az **EmailKönyv 11.**-ben a www.tejfalussy.com honlapon, és azon belül elérhető www.aquanet.fw.hu honlapon, lásd: www.tejfalussy.com/regiweboldalok/www.aquanet.fw.hu/szoveg/breznysyevess.htm,

Kérem a közérdekű bejelentés kivizsgálását és a magyar állam peren kívül kártérítésre kötelezését.

Budapest, 2016. december 12.

Jogos önvédelemként és jogos védelemként:

Tejfalussy András



Büntetőfeljelentésként kapja a becsületsértő „maffiaaállamfő” Áder János ellen az ORFK Titkárság.
Cc.: Köztársasági Elnöki Hivatal, valamint a Magyarok Szövetsége

feladó: **András Tejfalussy** <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>

címzett: Elnok@kuria.birosag.hu

orfktitkarsag@orfk.police.hu;

"ugyfelkapu@keh.hu" <ugyfelkapu@keh.hu>;

másolatot kap: Magyarok Szövetsége Központi Titkárság <msz.kozpont@gmail.com>;

Magyarok Szövetsége Tagozatszervezés <msz.tagozat@gmail.com>

titkos másolat: . . .

dátum: 2016. december 12. 12:42

tárgy: Közérdekű bejelentés a magyarországi maffiaállammal szemben további bizonyítékként Dr. Darák Péter Kúria legfelsőbb bíróság elnökhöz

küldő: gmail.com

feladó: **András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy** <magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
"Központi Ügyfélszolgálati Iroda (EMMI)" <ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu>;
címezett: lu <lu@mku.hu>;
orfktitkarsag@orfk.police.hu
CIP@emmi.gov.hu;
másolatot kap: integritas@emmi.gov.hu;
sajto@emmi.gov.hu
titkos másolat: . . .
dátum: 2016. december 14. 0:02
tárgy: TERRORIZMUS ELHÁRÍTÁSI TÁJÉKOZTATÁS RÉTVÁRI BENCE ÁLLAMTITKÁR
RÉSZÉRE
küldő: gmail.com